

† Richard Picbauer:

Addenda ad floram čechoslovakiae mycologicam.

X.

Quae in praefatione Addendorum priorum dixeram, etiam in his Addendis valet. De ea re mihi scribendum esse non arbitror. Solum puto dom. directori Ignatio Zavřeli, qui fungos hos magno cum studio legit, gratias agere meum esse. Deinde abbreviationes lectoris in memoriam reducere puto: Z = Zavřel, sine nota legit auctor, ceteri lectores nomine commemorati. Species stella signatae adhuc in terris nostris non observatae harum omnino XCV enominatae sunt.

Myxomycetes

Badhamia panicea Rost. Ad corticem *Abietis albae* in silva inter Adamov et Blansko (leg. Ing. C. Blahušek).

Arcyria ferruginea Sauter. Ad caudicem putrescentem in colle Kelčský Javorník.

Phycomycetes

Cladochytrium butomi Büsg. ad scapos foliaque *Butomi umbellati* in silva Pohansko ad Břeclav.

Cladochytrium sparganii ramosi Büsg. ad folia *Sparganii erecti* in ripa Moštěnka flum. ad Turovice (Z).

Synchytrium mercurialis Fuck. ad folia *Mercurialis perennis* in collibus Branisko Slovakiae.

**Synchytrium sanguineum* Schröt. ad folia *Cirsii palustris* in ripa Břestový potok ad Staré Hamry Moraviae orient. (Z).

Albugo candida Pers. ad herbam *Coronopi procumbentis* ad Vel. Němčice (Fr. Šmarda). *Sisymbrii sophiae* ad flum. Bystřička ad Lipová (Z).

Albugo lepigoni D. B. ad herbam *Spergulariae marginatae* ad Vel. Němčice (Fr. Šmarda). *Albugo portulacae* (DC.) Kuntze ad herbam *Portulacae oleraceae* ad Bagota pr. St. Ďala Slovakiae. (Baudyš).

Plasmopara epilobii (Rbh.) Schröt. ad folia *Epilobii hirsuti* in ripa flum. Moštěnka ad Turovice (Z).

Plasmopara densa Schröt. ad folia *Odontitis rubrae* in agro ad Dol. Lipová (Z).

Peronospora polygoni (Halsted) Alfr. Fisch. ad folia *Polygoni avicularis* ad Turovice (Z).

Peronospora minor (Gaspar.) Gäum. ad folia *Atriplicis nitentis* in ripa fluvil Moraviae ad Kroměříž (Z).

Peronospora arenariae (Berk.) Tul. ad folia *Arenariae serpyllifoliae* loco Na bařinách ad Rychlov (Z).

Peronospora brassicae Gäum. ad folia *Sinapis albae* in agro ad Dřevohostice ad septentr. (Z).

Peronospora berteroeae Gäum. ad folia *Berteroeae incanae* in ripa fl. Radkovka ad Lhota Radkova pr. Bystrice p. Host. (Z).

Peronospora erysimi Gäum. ad folia *Erysimi cheiranthoidis* in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora dentariae Rbh. ad folia *Cardaminis impatientis* in silva ad Zlín ad merid. (Z).

Peronospora barbareae Gäum. ad folia *Barbareae vulgaris* ad pedes montis Smrk ad Čeladná (Z).

Peronospora nesleae Gäum. ad folia *Vogeliae paniculatae* in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora potentillae D. B. ad folia *Potentillae aureae* in summo montis Král. Sněžník (Z).
Peronospora trifolii repentis S y d. ad folia *Trifolii montani* inter Šatov et Devět mlýnů.
Peronospora trifolii hybridi G ä u m. ad folia *Trifolii spadicei* in prato sphagnali ad Sulov et Bílý Kříž in mont. Beskydy (Z).

Peronospora pratensis S y d. ad folia *Trifolii medii* in prato in occid. declivitate montis Jehelník in mont. Hostýnské kopce (Z).

Peronospora meliloti S y d. ad folia *Meliloti albi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).

Peronospora Mayorii G ä u m. ad folia *Viciae cracca* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice. (Z).

Viciae angustifoliae in agro ad Dřevohostice (Z).

Peronospora viciae (Berk.) G ä u m. ad folia *Viciae hirsutae* Gray in finibus agri ad Dřevohostice (Z).

Peronospora galii F u c k. ad folia *Galii molluginis* in ripa rivi Kozrál a Lišná ad merid.

Peronospora aparinis (D. B.) G ä u m. ad folia *Galii aparinis* in ripa rivi ad Blazice (Z).

Peronospora tanacetii G ä u m. ad folia *Tanacetii vulgaris* in ripa fluvii Moravae ad Kroměříž (Z).

Ascomycetes

Protomyces macrosporus U n g. ad nervos foliorum *Heraclei sphondylii* ad Lhota Radkova (Z).

Protomyces kreuthensis K ü h n ad folia *Leontodontis danubialis* in margine silvae convallis rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).

Taphrina minor S a d. ad folia *Pruni fruticosae* loco olium munito supra Předmostí ad Přerov (Z).

Otidea auricula (S c h ä f f.) R e h m. Humi in silva coniferina in convalli Babia dolina ad pedes mont. Bielské Tatry. Ascis 346×15.7 , sporis $23-27 \times 11.5 \mu$.

Lachnum nidulus (S c h m i d t et K u n z e) K a r s t. ad scapos siccos *Polygonati multiflori* in silvula Na Kamenici dicta a Turovice ad merid. (Z).

Coryne sarcoides (J a c q.) T u l. ad incisuram *Fagi silvaticae* in colle Kelčský Javorník.

Pseudopeziza bistortae (L i b.) F u c k. ad folia *Polygoni bistortae* summo monte Vozka in mont. Jeseníky (Z).

Fabraea astrantiae R e h m ad folia *Astrantiae maioris* in margine silvae in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).

Pyrenopeziza nigrella F u c k. ad caules *Galeopsidis grandiflorae* in silva ad Dřevohostice (Z).

Scleroderma ribesia (P e r s.) K a r s t. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z).

**Cryptodiscus pallidus* (P e r s.) ad lignum fagale in colle Kelčský Javorník.

Lophodermium arundinaceum (S c h r a d.) C h e v. var. *actinothyrium* (F u c k.) R e h m ad culmos *Moliniae arundinaceae* S c h r k. loco exstirpationis in silva Ochozy ad occid. supra vicum Lipová ad Bystřice p. Host. (Z).

Hypomyces viridis (A l b. et S c h w.) B. et Br. ad fungos *Russulae* sp. ad Zad. Zhorec pr. Vel. Meziříčí.

Nectria ditissima T u l. ad corticem *Fagi silvaticae* in colle Kelčský Javorník.

Nectria cinnabarina (T o d e) F r. ad corticem *Aesculi hippocastani* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).

Nectria ribis (T o d e) O u d. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z). Ascis $80 \times 12 \mu$, sporis $22 \times 7 \mu$.

**Pleonectria berolinensis* S a c c. ad ramos *Ribis aurei* in Dřevohostice (Z).

Polystigma ochraceum S a c c. ad folia *Pruni padi* a Dol. Lipová ad septentr. (Z).

Claviceps microcephala (W a l l r.) T u l. in ovariis *Calamagrostidis epigeios* ad viam na Pulčinách dictam a Vsetín ad merid. (Z).

Plowrightia ribesia (P e r s.) S a c c. ad ramos *Ribis rubri* in horto in Dřevohostice (Z).

Dothidea thoraella S a c c. ad folia *Sedi marimi* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).

Phyllachora bromi F u c k. ad folia culmosque *Bromi erecti* infra vivarium ad Dřevohostice (Z).

Chaetomium comatum (T o d e) F r. ad stramentum secalinum ad Radkov (Z).

Venturia geranii (F r.) W i n t. ad folia *Geranii silvatici* in montibus Bielské Tatry.

Mycosphaerella hederacola (D e s m.) L i n d a u as folia *Hederae helicis* in colle Sivec ad Margecany.

Mycosphaerella tirolensis (A u e r s w.) M a g n. ad folia *Polypodii vulgaris* in convalli ad Macocha locum praeruptum (Bílý). Sporibus adhuc immaturis, unicellularibus, 16μ longis ac 4μ latis, ascis 45μ longis ac $8-11 \mu$ latis.

Leptosphaeria derasa (B. et Br.) A u e r s w. ad caules *Senecionis nemorensis* in Kamenice pr. Turovice (Z).

Leptosphaeria eustoma (Fr.) S a c c. ad culmos *Deschampsiae caespitosae* ad Dřevohostice (Z). Ascis $60 \times 10 \mu$, sporis $23 \times 5 \mu$.

Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. et De Not. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad viam ad Dřevohostice (Z).

Leptosphaeria dolioloides (A u e r s w.) K a r s t. ad caules *Chrysanthemi vulgaris* in ripa Bečvae fl. ad Val. Meziříčí (Z). Ascis 100×14 , sporis $48 \times 35 \mu$.

Leptosphaeria ogilviensis (B. et Br.) Ces. et De Not. ad caules *Cimicifugae foetidae* in convalli Pustý žleb ad Macocha, locum praeuptum. In Slovenia adhuc ignota.

Pleospora media Niessl ad scapos *Plantaginis maioris* in confinio a Turovice ad merid. (Z); ad caules *Phyteumatis spicati* ad Mor. Knínice pr. Tišnov. Ascis 88×23 , sporis $26.9 \times 11.5 \mu$.

**Pleospora meliloti* R b h. ad caules *Meliloti albi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).
Pleospora herbarum R b h. ad scapos *Allii cepae* in Dřevohostice (Z). Sporis $20 \times 13-14 \mu$;
ad caules *Brassicae napi oleiferi* in agro ad Radkov (Z);

Cichorii intybi in silva Kamenice ad Turovice (Z).

Pleospora vulgaris Niessl ad caules *Dauci carotae* in Dřevohostice (Z).

Pleospora vagans Niessl ad culmos *Dactylis glomeratae* in silva in Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z).

Pyrenophora peltita (Fr.) S a c c. ad caules *Papaveris somniferi* in ripa fl. Moštěnka ad Turovice (Z).

Pleospora Spegazziniana S a c c. ad pedunculos *Catalpae* sp. in Praha (Paelt).

Ophiobolus tenellus (A u e r s w.) S a c c. ad caules *Cardui crispi* in silva ad Dřevohostice (Z).

Ophiobolus acuminatus (S o w.) D u b y ad caules *Cardui crispi* in fruticeto in ripa rivi a Žákovice ad septentr. (Z).

Ophiobolus compressus R e h m. ad caules *Cirsii arvensis* ad viam a Dřevohostice ad merid. (Z). Ascis $130 \times 10 \mu$, sporis $90 \times 4 \mu$.

Valsa ambiens (Pers.) Fr. ad ramos *Rosae polyanthae* in horto in Dřevohostice (Z).

Valsa cincta Fr. ad ramos *Pruni armeniaca* in horto in Dřevohostice (Z).

Valsa salicina (Pers.) Fr. ad ramos *Salicis capreae* in silva Kamenice ad Turovice (Z).

Pseudovalsa irregularis (D. C.) S c h r ö t. ad ramos *Robiniae pseudacaciae* in Kruhy ad Tučapy (Z).

**Diaporthe dryophila* (Niessl) S a c c. ad ramos *Quercus sessilis* in silvula Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

**Metasphaeria Bellynckii* S a c c. ad caules *Polygonati multiflori* in silvua Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Basidiomycetes

Ustilagineae

Anthracoidea subinclusa (K ö r n.) B r e f. in ovariis *Caricis gracilis* in paludibus in silva Kančí obora ad Břeclav.

Ustilago utriculosa (Nees) U n g e r in ovariis *Polygoni persicariae* ad Lanžhot.

**Ustilago spermophora* Berk. et Curtis in ovariis *Eragrostidis minoris* in ripa Bečvae fl. ad Přerov (Z).

Ustilago striaeformis (West.) Niessl in foliis *Holci lanati* in ripa graminosa Bystrčíckae fl. ad Lípová (Z).

Ustilago calamagrostidis (F u c k.) C l i n t. in foliis *Calamagrostidis epigeios* in declivitate Kruhy ad Tučapy (Z).

Ustilago panici glauci (W a l l r.) W i n t. in ovariis *Setariae glaucae* in agris circa collem Dreveník et ad vicum Dubrava pr. Spišské Podhradie.

Ustilago coronariae L i r o in antheris *Lychnidis flos cuculi* in silva Kozrál a Lišná pr. Přerov ad merid. (Z).

Ustilago scabiosae W i n t. in antheris *Kautiae silvaticae* in margine silvae Kozrál a Lišná ad merid. pr. Přerov (Z).

Tubercina anemones (Pers.) L i r o in foliis *Anemonis nemorosae* ad Lanžhot.

Tubercina colchici (Schlecht.) L i r o in foliis *Colchici autumnalis* in summo collis Pouzdřanské kopce ad Hustopeče.

Tubercina agropyri (P r e u s s) L i r o in foliis *Agropyri repentis* in colle Zobor ad Nitra.

Ustilago violacea T u l. in antheris *Dianthi Carthusianorum* ad fodinam Kukla pr. Oslavany copiose.

Tolyposporium leptideum S y d. in ovariis *Chenopodii albi* in et ad Strážnice.

Entyloma hieracii S y d. in foliis *Hieracii inuloidis* in summo montis Králický Sněžník (Z).
Entyloma dahliae S y d. in foliis *Dahliae variabilis* in Val. Mezíříč.
Entyloma crepidicola Trotter in foliis *Crepidis tectorum* in agro a Dřevohostice ad septentr. (Z).
Entyloma bellidiastri Maire in foliis *Bellidiastri Michelii* in convalli rivi Reglany potok in montibus Bielské Tatry.

Uredinales

Uredinopsis filicina (Niessl) Magn. ad folia *Phegopteridis polypodioidis* ad rivum Reglany potok in Bielské Tatry.
Pucciniastrum Goepfertianum (Kühn) Kleb. ad famulos *Vaccinii vitis idaeae* in silvis ad Žďár ad merid., ad Bílek pr. Chotěboř.
Melampsora larici-epitea Kleb. ad folia *Salicis retusae* in Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Cronartium asclepiadeum (Wild.) Fr. ad ramos *Pini silvestris* in Josefské údolí pr. Adamov, in colle Květnice ad Tišnov.
Coleosporium daronici Namysl. ad folia *Daronici austriaci* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Endophyllum euphorbiae silvaticae (DC.) Wint. ad folia *Euphorbiae amygdaloidis* in mont. Bielské Tatry rare.
Thekopsora galii (Lk.) De Toni ad folia *Galii silvatici* in montibus Bielské Tatry satis disseminata.
Thekopsora vaccinatorum Karst. ad folia *Vaccinii vitis idaeae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. a Staré Hamry ad septentr. (Z).
Uromyces Kabatianus Bub. ad folia *Geranii pyrenaici* ad Jaroslavice pr. Znojmo.
Uromyces behenii Ung. ad folia *Silenis vulgaris* in declivitate fruticosa supra Dol. Lipová (Z).
Uromyces ranunculi-festuca Jaap. ad folia *Festucae heterophyllae* Lam. in silva ad Dřevohostice (Z).
Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Wint. ad folia *Cytisi nigricantis* in deolivi collis Hostýn (Z).
Uromyces striatus Schröt. ad folia *Trifolii campestris* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
Uromyces Fischeri Eduardi P. Magn. ad folia *Viciae cracca* in prato Na Bařinách dicto ad Rychlov (Z).
Uromyces veratri D. C. ad folia *Veratri Lobeliani* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Uromyces cristatus Schröt. ad folia *Viscaria vulgaris* in margine silvae in colle Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Uromyces thapsi (Opiz) Bub. ad folia *Verbasci phlomoidis* ad fodinam Gabriela in Karvinná (Z), ad Král. Pole anno 1948 copiose.
Uromyces alchemillae (Pers.) Wint. ad folia *Alchemillae alpestris* in montibus Bielské Tatry disseminata.
Puccinia thesii (Desv.) Chaill. ad folia caulesque *Thesii linophylli* in pratis Mandáty dictis ad Radějov prope Strážnice ad merid. (Pbr et Z).
Puccinia Zopfii Wint. ad folia *Calthae palustris* in convalli Ostravice fl. ad Staré Hamry (Z), in ripa rivi Golias in mont. Bielské Tatry.
Puccinia soldaneliae (DC.) Wint. ad folia *Soldanelae carpathicae* in convalli rivi Babin potok, in pratis Široké pole infra montem in mont. Bielské Tatry.
Puccinia prenanthes purpureae (Pers.) Liro ad folia *Prenanthis purpureae* in convalli rivi Reglany potok Ždiar mont. Bielské Tatry.
Puccinia mulgedii Syd. ad folia *Mulgedii alpini* in convalli Reglany potok ad Ždiar in mont. Bielské Tatry.
Puccinia asperulae cynanchicae Wurtth. ad folia *Asperulae cynanchicae* ad Dřevohostice ad septentr. (Z).
Puccinia gentianae Strauss ad folia *Gentianae cruciatae* in collibus Branisko pr. Spišské Podhradie.
Puccinia bromina Eriks. ad folia *Bromi inermis* ad Dřevohostice (Z). Aecidia ad folia *Symphyti tuberosi* et *officinalis* in pratis ad Pavlov pr. Radějov ad Strážnice copiosissime (Pbr et Z).
Puccinia ariae (Lgh.) Cruch. et Mayor ad folia *Deschampsiae caespitosae* in boreali declivitate collis Bukovina in collibus Hostýnské kopce (Z).
Puccinia perplexans Plowr. ad folia *Alopecuri pratensis* a Turovice ad merid. (Z).

- Puccinia graminis* Pers. ad folia *Festucae giganteae* in silva ad Dřevohostice (Z).
Puccinia coronata Corda ad folia *Holci mollis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Puccinia silvatica Schröt. ad folia *Caricis Schreberi* ad Oslavany.
Puccinia firma Diet. Aecidia ad folia *Bellidii Michellii* in convalli rivi Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Puccinia obscura Schröt. ad folia *Luzulae luzulinae* in silva colle Javorník a Vel. Karlovice ad merid. (Z).
Puccinia polygoni vivipari Karst. ad folia *Polygoni vivipari* in pratis ad Tatranská Kotlina, in pratis Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Puccinia veratri Duby ad folia *Veratri nigri* in convalli fl. Ostravice a Staré Hamry ad septentr. (Z).
Puccinia Komarovii Tranzsch. ad folia *Impatiens parviflorae* in hortis collis Petřín in Praha (Z).
Puccinia acetosae Körn. ad folia *Rumicis acetosae* in declivitate boreali montis Kněhyně in mont. Beskydy (Z).
Puccinia pyrethri Rbh. ad folia *Chrysanthemi corymbosi* ad Tatranská Kotlina et in prato Široké pole infra montem Vidla in mont. Bielské Tatry.
Puccinia Schirajewskyi Tranzsch. ad folia *Serratulae lycopifoliae* in pratis Mandáty dietis a Radějov pr. Strážnice ad merid.
Puccinia absinthii D. C. ad folia *Artemisiae absinthii* in Margecany.
Puccinia echinopsis D. C. ad folia *Echinopsis sphaerocephali* ad Medláňky pr. Brno.
Puccinia carlinae Jacky ad folia *Carlinae acaulis* in collibus Branisko ad Dubrava pr. Spiš. Podhradie.
**Puccinia Passerinii* Schröt. ad folia *Thesii linophylli* in pratis Mandáty dietis a Radějov pr. Strážnice (Pbr. et Z).
Puccinia millefolii Fuck. ad folia *Achilleae millefolii* ad Brněnské Ivanovice et ad Soběšice pr. Brno.
Puccinia valantiae Pers. ad folia *Galii verni* in margine silvae ad Dřevohostice (Z), in colle Dreveník ad Spiš. Podhradie.
Puccinia arenariae (Schum.) Wint. ad folia *Melandryi silvestris* in margine silvae ad rivum Kozrál pr. Lišná ad Přerov (Z).
Puccinia Volkartiana E. Fisch. ad folia *Androsaces chamaejasmis* in convalli rivi Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart. aecidia ad folia *Sorbi ariae* in declivitatibus collis Branisko ad Spiš. Podhradie.
Phragmidium fusiforme Schröt. ad folia *Rosae pendulinae* in colle Branisko pr. Spiš. Podhradie.
Triphragmium ulmariae (Schum.) Wint. ad folia caulesque *Spireae ulmariae* ad rivum Chlébský potok pr. Nedvědice, in convalli rivi Golias potok in mont. Bielské Tatry.
Uredo poae sudeticae West. ad folia *Poeae Chairii* in summo montis Král. Sněžník.

Hymenomycetes

- Achroomyces tiliae* (Lasch.) v. H. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Bilek pr. Chotěboř.
Gyrocephalus rufus (Jacq.) Bref. humi in ripa rivi Babin potok in mont. Bielské Tatry.
Exobasidium vaccinii uliginosi Boud. ad folia *Vaccinii vitis idaeae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. a Staré Hamry ad septentr.
Typhula filiformis (Bull.) Fr. ad folia deiecta in colle Hády ad Brno.

Fungi imperfecti

- Phyllosticta atriplicis* Desm. ad folia *Atriplicis roseae* in Prosek ad Praha (Z);
Chenopodii boni Henrici in vico Maršovice ad Mor. Krumlov.
Phyllosticta chenopodii Sacc. ad folia *Chenopodii bonus Henricus* in Radňovice pr. Nové Město na Mor.
Phyllosticta typhae (Pass.) Allesch. ad folia *Typhae latifoliae* in uliginosis ad Dřevohostice ad orient. (Z).
Phyllosticta populina Sacc. ad folia *Populi tremulae* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
**Phyllosticta ranunculacearum* Sacc. et Speg. ad folia *Ranunculi lanuginosi* in ripa rivi ad Slavkov in collibus Hostýnské kopce (Z).
Phyllosticta apetala Allesch. ad folia *Aceris campestريس* supra laterum ductum in vico Předmostí ad Přerov (Z).

Phyllosticta filipendulina Sacc. et Speg. var. *ulmariae* Sacc. ad folia *Spireae ulmariae* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta variabilis* Peck. ad folia *Rubi ambifarii* P. J. Müller in confinio fruticoso Břečtany dicto a Dřevohostice ad merid. (Z).

Phyllosticta argillacea Bres. ad folia *Rubi caesii* ad marginem silvae Kozrál ad Lišná pr. Přerov (Z).

**Phyllosticta grandimaculans* Bub. et Krieg. ad folia *Fragariae vescae* in margine silvae in colle Stolečný in mont. Javorníky (Z).

**Phyllosticta cathartici* Sacc. ad folia *Rhamni cathartici* in declivitate supra Dol. Lípová ad merid. (Z). E Moravia ignota, in Slovenia advenit ad Bratislava.

**Phyllosticta mahoniana* (Sacc.) Allesch. ad folia *Mahoniae aquifolii* in Dřevohostice (Z).

Phyllosticta adventa Pass. ad folia *Robiniae pseudacaciae* in ripa Bečvae fl. a Přerov ad orient. (Z).

Phyllosticta viciae (Lib.) Cook. ad folia *Viciae sepium* in hortis Michalov in Přerov (Z);

Viciae villosae in agro in declivitate Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Phyllosticta cytisi Desm. ad folia *Genistae tinctoriae* in silva ad Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta cytisella* Sacc. ad folia *Cytisi capitati* in margine silvae Kostecký les ad Pacetluky pr. Holešov (Z).

**Phyllosticta epilobii* Brun. ad folia *Epilobii montani* in silva ad Dřevohostice rare (Z).

**Phyllosticta calystegiae* Sacc. ad folia *Calystegiae sepium* in margine silvae Kostecký les ad Lišná pr. Bystrice p. Host. (Z).

**Phyllosticta ovalifolii* Brun. ad folia *Ligustri vulgaris* in declivitate Polomsko supra Rajnochovice (Z).

Phyllosticta syringae West. ad folia *Syringae vulgaris* in horto in Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta eleagni* Sacc. ad folia *Eleagni angustifoliae* in horto Podzámecká zahrada in Kroměříž (Z).

Phyllosticta Kriegeriana Bres. ad folia *Melampyri nemorosi* in silva Žebračka ad Přerov (Z).

**Phyllosticta verbasci* Sacc. ad folia *Verbasci phlomoidis* ad fodinam Gabrielae in Karvinná (Z).

**Phyllosticta orbicularis* Ell. et Ev. ad folia *Cucurbitae peponis* in horto in Dřevohostice (Z).

**Phyllosticta campanulae* Sacc. et Speg. ad folia *Campanulae trachelium* in convalli Suchý žleb ad Macocham, locum praeruptum. Spor. $77 \times 2.6-3 \mu$.

Phyllosticta sonchii Sacc. ad folia *Sonchii arvensis* in agro in Gruň-Staré Hamry (Z).

Phoma urticae (Pers.) Berk. ad caules *Urticae dioicae* in ripa fl. Bystříčka a Dřevohostice ad merid. (Z), ad Bílek pr. Chotěboř. Spor. unicellularibus 7.7×3 , bicellularibus $11.5 \times 3.8 \mu$

Phoma oblonga Desm. = *Ph. eres* Sacc. ad ramos *Ulmii montanae* in silvula ad Dřevohostice (Z).

Phoma nebulosa (Pers.) Mont. ad caules *Solani tuberosi* in agro ad Dřevohostice (Z).

**Phoma sambucina* Sacc. ad ramulos *Sambuci nigrae* in declivi Kamenice ad Turovice et in silvula a Blažice ad septentr. (Z).

**Phoma solidaginis* Cooke ad caules *Solidaginis serotinae* in ripa Bečvae fl. ad Val. Meziríčí (Z).

Phoma acuta Fuck. ad caules *Scrophulariae nodosae* in ripa Moštěnka fl. ad Turovice (Z).

Phoma melaena (Fr.) Mont et Dur. ad caules *Silenis nutantis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z);

Turritis glabrae in silva ad Dřevohostice (Z);

Medicaginis falcatae in confinio a Dřevohostice ad merid. (Z);

Chenopodii albi in ripa Moštěnka fl. ad Dřevohostice (Z);

Viciae silvaticae in silva ad Dřevohostice (Z);

Silenis vulgaris Garcke. in clivo Kamenice ad Turovice (Z). Spor. maioribus $8 \times 3 \mu$.

Phoma ramealis Desm. ad ramulos *Evonymi vulgaris* in fruticeto a Turovice ad merid. (Z). Spor. $9 \times 3 \mu$.

**Phoma epilobii* Preuss. ad caules *Epilobii hirsuti* ad paludem in silva ad Dřevohostice (Z). Spor. ovatis $8 \times 4 \mu$.

Phoma herbarum West. f. *dianthi* Fragoso ad caules *Dianthi superbi* in margine boreali silvae Ochozy a Dřevohostice ad merid. (Z).

Phoma polygramma (Fr.) Sacc. var. *plantaginis* Sacc. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad Turovice (Z).

Phoma herbarum West. ad caules *Convolvuli sepium* in silva ad Dřevohostice (Z).

Phoma Zopfiana Allesch. ad caules *Ononidis spinosae* ad Dřevohostice (Z).

- **Phoma Durandiana* Sacc. et Roum. ad caules *Rubi obtusifolii* in ripa rivi a Žákovic pr. Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
- Phoma rosae* Schulz. et Sacc. ad ramos *Rosae polyanthae* in Dřevohostice (Z).
- **Phoma barbarae* Cooke ad ramulus *Lycii barbarum* ad castellum in Jaroslavice ad Znojmo.
- **Phoma betonicae* Sacc. ad caules *Betonicae officinalis* in margine silvae Ochozy supra pagum Lípov (Z).
- Phoma polygramma* (Fr.) Sacc. ad caules *Ballotae nigrae* in Lípová (Z).
- Phoma achilleae* Sacc. ad caules *Achilleae millefolium* in declivitate Kamenice ad Turovice (Z).
- Phoma podagrariae* Bres. ad caules *Aegopodii podagrariae* in declivitate Kamenice ad Turovice (Z).
- **Phoma torilis* Syd. ad caules *Torilis anthriscus* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Phoma laserpitii* Fautr. ad caules *Laserpitii archangelicae* in colle Ožínák in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Phoma glandicola* Lé v. ad glandes *Quercus sessilis* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Dothiorella Berengiana* Sacc. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Havlíčkův Brod.
- Cytospora cincta* Sacc. ad ramos siccos *Pruni armeniaca* in Dřevohostice (Z).
- Cytospora coenobiotica* Sacc. ad corticem *Alni incanae* in ripa Bystřické fl. ad Lípová (Z).
- Cytospora carphosperma* Fr. ad ramos *Tiliae cordatae* in silvula ad Blazice (Z).
- Cytospora pinastri* Fr. ad acus *Taxi baccatae* in horto in Všechnovice pr. Bystřice p. Host. (Z).
- Sporonema campanulae* (DC.) Petr. ad folia *Campanulae trachelium* in convalli Zadielská dolina ad Turna n. B.
- **Placosphaeria coronillae* Sacc. ad folia *Coronillae variae* ad Chromeč pr. Šumperk (Baudyš).
- Asteroma padi* Grev. ad folia *Pruni padi* in declivi supra Lípová ad septentr. (Z).
- Ascochyta graminicola* Sacc. ad folia *Echinochloae crus galli* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
- Ascochyta humuli* Kab. et Bub. ad folia *Humuli lupuli* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta aquilegiae* (Rbh.) v. H. ad folia *Aquilegiae vulgaris* in hortis castellanis in Vsetín (Z).
- **Ascochyta violae* Sacc. et Speg. ad folia *Viola mirabilis* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta viciae* Lib. ad folia *Viciae cracca* in hortis Michalov in Přerov (Z).
- Ascochyta viciae pisiformis* Bub. ad folia *Viciae pisiformis* in silva in ruina arcis Křídla in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Ascochyta impatientis* Bres. ad folia *Impatientis parviflorae* in Petřín in Praha (Z).
- **Ascochyta diplodina* Berl. et Bres. ad folia *Hederae helix* ad Rajnochovice (Z).
- **Ascochyta staphyleae* Syd. ad folia *Staphyleae pinnatae* in hortis Podzámecká zahrada in Krončříž (Z).
- Ascochyta telepii* Vesterg. ad folia *Sedi maximi* in clivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
- Ascochyta imperfecta* Peck. ad folia *Medicaginis sativae* in agro ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta medicaginis* Bres. ad folia *Medicaginis falcatae* in occidentali declivitate collis Hostýn (Z).
- Ascochyta altheina* Sacc. et Bizz. ad folia *Althaeae officinalis* in ripa Radkovic fl. ad Dřevohostice (Z).
- Ascochyta evonymicola* Allesch. ad ramos *Evonymi europaeae* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- **Ascochyta heraclei* Bres. ad folia *Heraclei sphondylii* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- **Ascochyta Feuilleuboisiana* Sacc. et Roum. ad folia *Rubi saxatilis* ad rivum Golias potok in mont. Bielské Tatry.
- **Ascochyta viburni* (Roum.) Sacc. ad folia *Viburni lantanae* in silva ad Radějov pr. Strážnice ad merid. (Z).
- **Ascochyta lamiorum* Sacc. ad folia *Lamii albi* in horto in Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta valerianae* Smith et Ramsb. ad folia *Valerianae sambucifoliae* in silva ad Rejviz Silesiae (Z).
- Ascochyta sambuci* Sacc. ad folia *Sambuci nigrae* in horto in Dřevohostice (Z).
- **Ascochyta hieracii* Lasch. ad folia *Hieracii pilosellae* in declivitate Skalný in collibus Hostýnské kopce (Z).
- **Ascochyta cirsii* Died. ad folia *Cirsii cani* in prato humido in Kamenice ad Turovice (Z).
- Cirsii oleracei* in pratis ad Lhota Radkova (Z).

Diplodina medicaginis O u d. ad caules *Medicaginis sativae* in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).

Diplodina pimpinellae H o l l ó s ad caules *Pimpinellae magnae* in silvula Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Diplodina anthrisci B a u d y š ad caules *Torilis anthrisci* in ripa rivi a Žákovice ad septentr. (Z).

**Diplodina erigerontis* (O p i z) K u p k a ad caules *Erigerontis canadensis* in silva ad Dřevohostice (Z).

**Diplodia ribis* S a c c. ad ramos *Ribis rubri* in Dřevohostice (Z).

**Diplodia morina* S y d. ad ramos *Mori nigrae* in horto in Dřevohostice (Z).

Septoria caricis P a s s. ad folia *Caricis piluliferae* in pratis Vojšické louky ad Radějov pr. Strážnice (Z);

Caricis pendulinae in silva ad Radějov pr. Strážnice (Z). Spor. 20—27 × 1.9 μ.

**Septoria agropyri* E l. et E v. ad folia *Agropyri repentis* in declivitate supra laterum ductum in Předmostí ad Přerov (Z).

**Septoria molinae* S y d. ad folia *Moliniae serotinae* in sphagneto in monte Kepník in mont. Jeseniky (Z).

Septoria salicicola (F r.) S a c c. ad folia *Salicis fragilis* in clivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).

Septoria dubia S a c c. et S y d. ad folia *Quercus roboris* in silvula Na Pálenici dicta a Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).

Septoria gladioli P a s s. ad folia *Gladioli communis* in hortis Michalov in Přerov (Z).

Septoria melandryi P a s s. ad folia *Melandryi silvestris* in summo montis Králický Sněžník, in ripa rivi ad Sulov in mont. Beskydy (Z).

**Septoria arabidis* S a c c. ad folia *Arabidis sp.* in montibus Bielské Tatry. In montibus Tatransibus a Rouppert in finibus Poloniae lecta.

Septoria alni S a c c. ad folia *Alni rotundifoliae* in ripa Moštěnkae fl. ad Přerov (Z).

Septoria staphyleae P a s s. ad folia *Staphyleae pinnatae* in hortis Podzámecká zahrada in Krončtíz (Z).

Septoria hyperici D e s m. ad folia *Hyperici acuti* M n e h. in fonte infra Pulčanské skály a Vsetín ad merid. (Z).

Septoria expansa N i e s s l ad folia *Geranii sanguinei* in declivitate Polomsko supra Rajnochovice (Z).

Septoria geranii R o b e r t. ad folia *Geranii pusilli* in ripa Říka ad Lhota Chvalčova (Z).

Septoria ficariae D e s m. ad folia *Ranunculi ficariae* in silva ad Dřevohostice (Z).

Septoria menyanthis D e s m. ad folia *Menyanthis trifoliatae* in sphagneto Hutě in convalli Ostravice fl. ad Staré Hamry (Z).

Septoria anthyllidis S a c c. ad folia *Anthyllidis vulnerariae* ad speluncam ad Tatranská Kotlina.

Septoria curvata S a c c. ad folia *Robiniae pseudacaciae* in silva ad Dřevohostice (Z).

**Septoria lupinicola* D e a r n e s s ad folia *Lupini polyphylli* in margine silvae in cole Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).

Septoria hederæ D e s m. ad folia *Hederæ helicis* in horto in Dřevohostice (Z).

**Septoria silvestris* P a s s. ad folia *Lathyri silvestris* in declivitate supra Dol. Lípová (Z).

Septoria aegopodina S a c c. ad folia *Pimpinellae saxifragae* in margine silvae in convalli rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).

Septoria ribis D e s m. ad folia *Ribis grossulariae* in convalli rivi Babin potok in mont. Bielské Tatry.

**Septoria asperulae* B ä u m l. ad folia *Asperulae odoratae* in margine silvae in clivo Stolečný (Postaši) (Z). Nota solum a Přenčov, ubi Kmet legit.

Septoria agrimoniae eupatoriae B o m m. et R o u s s. ad folia *Agrimoniae eupatoriae* in declivitate boreali clivis Kyčera in mont. Javorníky (Z).

**Septoria Toševi* B u b. ad folia *Gentianae sp.* in prato ad Švajgrovka in declivitate collis Hostýn (Z). A Bubák ex Bulgaria descripta.

**Septoria menthicola* S a c c. et L e t e n d r e ad folia *Menthae aquaticae* ad ripam rivuli in silva ad Dřevohostice (Z).

Septoria stachydis R o b. et D e s m. ad folia *Stachydis silvaticae* in silva Kančí obora ad Břeclav.

Septoria lamii P a s s. ad folia *Lamii albi* in silva Dolina rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).

Septoria cruciatae R o b. et D e s m. ad folia *Galii Schultesii* in silva Polomsko ad Rajnochovice (Z).

Septoria Brissaceana S a c c. et L e t e n d r e ad folia *Lythri salicariae* ad Rychlov (Z).

- Septoria cirsii* Niessl ad folia *Cirsii arvensis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Cirsii eriophori in declivitate montis Javorník in mont. Javorníky (Z).
Cirsii erythralis ad Tatranská Kotlina et in mont. Bielské Tatry.
 **Septoria Muraei* Trotter = *S. taraxaci* Syd. ad folia *Taraxaci officinalis* in ripa rivi ad Dol. Lípová (Z).
 **Septoria virgaureae* Desm. ad folia *Solidaginis serotinae* in ripa Bečvae fl. a Přerov ad orient. (Z).
Septoria senecionis West. ad folia *Senecionis Fuchsii* in monte Král. Sněžník (Z).
Senecionis fluviatilis in ripa Rusavae fl. in silva Zámeček a Kroměříž ad orient. (Z).
Septoria borealis Bub. et Kab. ad folia *Galii borealis* in prato in declivitate orientali collis Hostýn (Z).
Septoria tinctoriae Brun. ad folia *Seratulae tinctoriae* in merid. declivi Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Phlyctaena lappae (Karst.) Sacc. ad caules *Lappae* sp. in clivo Kamenice a Turovice ad merid. (Z).
 **Stagonospora Jaapii* Die. ad folia *Caricis leporinae* in via silvatica Pálenice versus a Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
Stagonospora gigaspora (Niessl) Sacc. ad folia *Caricis leporinae* in silva in Clivo a Sulov ad orient.
Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc. ad folia *Moliniae coeruleae* in prato humido ad Dol. Lípová (Z).
Stagonospora carpathica Bäuml. ad folia *Meliloti officinalis* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
Rhabdospora betonicae Sacc. et Briard ad caules *Betonicae officinalis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Rhabdospora pachyderma Kab. et Bub. ad scapos *Plantaginis lanceolatae* ad viam pr. Rychlov ad Bystřice p. Host. (Z).
 **Rhabdospora coriacea* Bub. ad caules *Centaureae oxylepis* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Rhabdospora pleosporoides Sacc. ad caules *Rumicis obtusifolii* ad rivum ad Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z);
 var. *Bosciana* Sacc. ad caules *Eupatorii cannabii* ad Dřevohostice (Z).
 **Rhabdospora campanulae cervicariae* Vesterg. = *Jahniella* c. c. Petr. ad caules *Campanulae rotundifoliae* ad Mor. Knínice pr. Tišnov.
 **Camarosporium laburnicum* Sacc. ad ramos *Cytisi laburni* in publico sepulcrorum loco in Kroměříž (Z).
Camarosporium laburni (West.) Sacc. ad ramos *Cytisi laburni* in Kruhy ad Tučapy (Z).
Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc. ad folia *Alni glutinosae* in ripa Juhyně fl. ad Podhradní Lhota in collibus Hostýnské kopce (Z).
 **Leptostroma eupatorii* Allesch. ad caules *Eupatorii cannabii* in silva ad Dřevohostice (Z).
 **Discella carbonacea* (Fr.) B. et Br. ad ramos *Salicis capreae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z). Adhuc a Levoča solum nota.
 **Gloeosporium Fuckelii* Sacc. ad folia *Fagi silvaticae* in silva Na Bukovině in collibus Hostýnské kopce (Z).
Gloeosporium betulinum West. ad folia *Betulae pubescentis* in silva ad Dřevohostice (Z).
Gloeosporium tremulae Pass. ad folia *Populi tremulae* in declivitate meridionali clivis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
Gloeosporium platani (Mont.) Oud. = *Gloeosporidium* p. v. H. ad folia *Platani orientalis* in hortic. Květná zahrada in Kroměříž (Z).
 **Gloeosporium fragariae* (Lib.) Mont. ad folia *Potentillae argenteae* in declivitate meridionali clivis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z);
Fragariae collinae in margine silvae ad Radějov pr. Strážnice (Z).
Gloeosporium caulivorum Kirch. ad folia caulesque *Trifolii medii* in cole Skalný in collibus Hostýnské kopce (Z).
Marssonina iuglandis Lib. Sacc. ad folia *Juglandis nigrae* in silva Zámeček ad Kroměříž (Z).
Marssonina Sennenii Gonz. Frag. ad folia *Sanguisorbae officinalis* in ripa Radkovice fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).
Marssonina Delastreii (De Lacer.) Sacc. ad folia *Silenis armeriae* in horto in Dol. Lípová (Z);
Melandryi albi ad stationem viae ferreae Kúty infra Praděd (Z);
Cucubali bacciferi in margine silvae ad Dřevohostice (Z).

**Naemospora tiliae* Delacr. in ramo *Tiliae cordatae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).

**Naemospora microspora* Desm. ad ramos *Carpini betuli* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (Z).

Septogloeum fragariae v. H. ad folia *Fragariae vescae* in declivitate orientali collis Hostýn (Z);

Fragariae collinae in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).

Septogloeum laserpitii (Bres.) Magn. ad folia *Laserpitii latifolii* in pratis Vojčické louky ad Radějov pr. Strážnice (Z et Pbr).

Scoleosporium typhae (Oud.) v. H. ad folia *Typhae latifoliae* in paludi ad Turovice (Z).

**Libertella syringae* Oud. ad ramos *Syringae vulgaris* in Dřevohostice (Z).

Kabatia mirabilis Bub. ad folia *Lonicerae xylostei* in margine silvae supra Dol. Lípová (Z).
Cylindrosporium ficariae Berk. ad folia *Ranunculi ficariae* ad molas Devět mlýnů ad Znojmo.

**Cylindrosporium niveum* B. et Br. ad folia *Calthae palustris* in pratis inter Drnovice et Val. Klobouky.

Ovularia bistortae (Fueck.) Sacc. ad folia *Polygoni bistortae* in monte Vozka in montibus Jeseníky (Z).

Ovularia haplospora Speg. ad folia *Alchemillae vulgaris* in silvula Břečtany a Dřevohostice ad merid. (Z).

Ovularia Schröteri (Kühn) Sacc. ad folia *Alchemillae vulgaris* in declivitate collis Benešek in Hor. Bečva (Z).

**Ovularia caduca* Voss. ad folia *Circaeae lutetianae* in silva ad Dřevohostice (Z).

**Ovularia stellariae* (Rbh.) Sacc. ad folia *Stellariae nemorum* in declivitate occidentali montis Kěhyně in mont. Beskydy (Z).

**Ovularia sphaeroidea* Sacc. ad folia *Loti uliginosi* in sphagneto in convali rivi Břestový potok ad Staré Hamry (Z).

**Ovularia ovata* Fueck. ad folia *Salviae pratensis* in declivitate olim munita supra Předmostí ad Přerov (Z).

**Ovularia carneola* Sacc. ad folia *Scrophulariae alatae* in fossa a Hor. Újezd ad septentr. (Z).

Ovularia gnaphalii Syd. ad folia *Gnaphalii norvegiici* in declivitate orientali montis Šerák in mont. Jeseníky (Z);

Gnaphalii uliginosi et *silvatici* in silva ad Dřevohostice (Z).

Ovularia Vossiana (Thüm.) Sacc. ad folia *Cirsii lanceolati* in silva ad Dřevohostice (Z).

Botrytis parasitica Cav. var. *colchici* Vogl. ad folia *Colchici autumnalis* in prato a Osíčko ad orient. pr. Bystřice p. Host. (Z).

**Fusoma Feurichii* H. et P. Sydow ad folia caulesque *Lathyri silvestris* in declivitate orient. collis Hostýn et montis Smrk (Hubertka) in mont. Beskydy (Z).

Ramularia macularis (Schröt.) Sacc. ad folia *Chenopodii boni Henrici* in Radňovice pr. Nové Město na Mor.

**Ramularia decipiens* El. et Ev. ad folia *Rumicis obtusifoliae* in declivitate collis Hostýn (Z).

Ramularia pratensis Sacc. ad folia *Rumicis arifolii* in margine silvae collis Stolečný in collibus Hostýnské kopce (Z).

Ramularia lychnicola Cooke ad folia *Melandryi albi* in Dol. Lípová (Z).

Ramularia monticola Speg. ad folia *Aconiti* sp. in mont. Bielské Tatry.

**Ramularia biflorae* Magn. ad folia *Violae biflorae* in declivitate infra Vřesová studánka in mont. Jeseníky (Z).

Ramularia calthae Lindr. ad folia *Calthae palustris* ad Turovice (Z).

Ramularia erodii Bres. ad folia *Erodii cicutarii* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).

Ramularia lactea (Desm.) Sacc. ad folia *Violae odoratae* in hortis castellanis in Vsetín (Z).

Ramularia agrestis Sacc. ad folia *Violae tricoloris* in Dřevohostice (Z).

Ramularia arcensis Sacc. ad folia *Potentillae anserinae* in Dol. Lípová (Z).

**Ramularia ulmariae* Cooke ad folia *Filipendulae ulmariae* ad silvam Ochozy propius Lípová (Z).

Filipendulae vulgaris in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orient. (Z).

**Ramularia malvae* Fueck. ad folia *Malvae neglectae* in vico Lišná (Z).

Ramularia geranii (Fueck.) West. ad folia *Geranii silvatici* in silvae margine collis Stolečný Portáš in mont. Javorníky (Z).

Ramularia punctiformis (Schlecht.) v. H. ad folia *Epilobii palustris* infra Vřesová studánka in mont. Jeseníky (Z).

- Ramularia loticola* Mass. ad folia *Loti uliginosi* in fossa in silva Podolanky a Staré Hamry ad occidentem. (Z).
- **Ramularia levistici* Oud. ad folia *Levistici officinalis* in horto in Sulov et in Dol. Lípová (Z).
- Ramularia cortusae* Petr. ad folia *Cortusae Mathioli* in convalli Babin potok et in aliis convallibus montium Bielské Tatry disseminata. Semper in forma *Ovularia cortusa* Pbr.
- Ramularia primulae* Thüm. ad folia *Primulae hybridae* in horto in Dřevohostice (Z).
- Ramularia evanida* Sacc. ad folia *Gentianae asclepiadeae* in mont. Bielské Tatry.
- **Ramularia Harioti* Sacc. ad folia *Brunellae vulgaris* in silva Kozrál a Lišná ad merid. (Z).
- **Ramularia lamicola* Mass. ad folia *Lamii maculati* in summo collis Hostýn (Z).
- Ramularia scrophulariae* Fautr. et Roumeg. ad folia *Scrophulariae alatae* in ripa Kozrál fl. a Lišná ad merid. (Z).
- **Ramularia melampyryna* Mass. ad folia *Melampyri arvensis* in silvula collis Kamenice ad Turovice (Z).
- Ramularia exilis* H. et P. Syd. ad folia *Lamii lutei* in silva Kozrál a Lišná ad merid. (Z).
- Ramularia menthicola* Sacc. ad folia *Menthae longifoliae* in ripa Bystřičkae fl. ad Lípová ad Bystřice p. Host. et ad Dřevohostice (Z).
- Ramularia valerianae* (Speg.) Sacc. ad folia *Valerianae tripteris* in convalli Divoká dolina infra montem Praděd (Z).
- Ramularia macrospora* Fres. ad folia *Campanulae trachelii* in silvula Kamenice a Turovice ad merid. (Z);
- Campanulae persicifoliae* in silva ad Bzenec (Z);
- Campanulae rapunculoidis* in colle Hoblík ad Louny, ad Pajštún pr. Stupava;
- Campanulae* sp. in collibus Kováčovské kopce Sloveniae merid.
- var. *trachelii* Sacc. ad folia *Campanulae trachelii* ad pedes collis Kobyla ad Děvín.
- **Ramularia eximia* Bub. ad folia *Crepidis tectorum* in agro ad Dřevohostice (Z);
- Crepidis* sp. in mont. Bielské Tatry.
- Ramularia picridis* Fautr. et Roum. ad folia *Picridis hieraciiifoliae* in ripa rivi Kozrál a Lišná ad merid. pr. Přerov (Z).
- Ramularia hypochoeridis* Magn. ad folia *Hypochoeridis radicatae* ad Dol. Lípová (Z).
- Ramularia lampasanae* Desm. ad folia *Lampasanae communis* in silva supra Dětrichov in mont. Jeseníky (Z).
- Ramularia conspicua* Syd. ad folia *Hieracii nigriti* in monte Vozka in mont. Jeseníky (Z).
- Ramularia corontica* Kab. et Bub. ad folia *Hieracii vulgati* in margine silvae ad Sulov (Bílý kříž) (Z). Spor. $50 \times 3 \mu$.
- Ramularia hamburgensis* Lindau ad folia *Hieracii vulgati* eodem loco (Z).
- Ramularia variegata* Ell. et Holw. var. *petasitis officinalis* Allesch. ad folia *Petasitis officinalis* ad rivum Babin potok in mont. Bielské Tatry.
- Ramularia filaris* Fres. var. *hieracii* Bäuml. ad folia *Hieracii laevigati* in declivitate meridionali collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Ramularia senecionis* (B. et Br.) Sacc. ad folia *Senecionis subalpini* ad rivum Reglany potok in mont. Bielské Tatry.
- Senecionis rivularis* in fonte infra summum montis Praděd in mont. Jeseníky (Z).
- Senecionis fluviatilis* ad ripam Rusavae fl. in silva Zámeček ad Kromčíz (Z).
- Ramularia centaureae* Lindr. ad folia *Centaureae rhénanae* ad Heroltice pr. Tišnov (Z);
- Centaureae cyanus* ad Dřevohostice (Z).
- Ramularia cirsii* Allesch. ad folia *Cirsii palustris* in declivitate boreali collis Hostýn (Z).
- Ramularia cardui* Karst. ad folia *Cardui crispi* in silva Žebračka ad Přerov (Z).
- Ramularia knautiae* (Mass.) Bub. ad folia *Knautiae arvensis* in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
- Ramularia tricherae* Lindr. ad folia *Knautiae arvensis* in declivitate merid. collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Septocylindrium ranunculi* Peck. ad folia *Ranunculi acris* in paludosis ad Rychlov (Z).
- **Cercospora veratri* Peck. ad folia *Veratri albi* in margine silvae a Rožnov ad merid. (Z).
- **Cercospora Magnusiana* Allesch. ad folia *Geranii silvatici* in mont. Bielské Tatry.
- **Cercospora rhaetica* Sacc. et Wint. ad folia *Laserpitii pruthenici* in silvula Na Pálenici dicta a Bystřice p. Host. ad septentr. (Z).
- **Cercospora septorioides* Sacc. ad folia *Adenostylis alliariae* in devitate loci depressioris Vel. Kotlina in mont. Jeseníky (Z).
- Cercospora virgaureae* (Thüm.) Allesch. ad folia *Solidaginis alpestris* infra Ždiarská Vidla.
- Coniosporium arundinis* (Corda) Sacc. ad culmos *Phragmitis communis* ad Rychlov (Z).

- Coniosporium punctiforme* Maire et Sacc. ad folia vetera *Scirpi silvatici* in ripa Bečva fl. a Val. Meziříčí ad septentr. (Z).
- Coniosporium amentaceum* Corda ad corticem *Salicis auritae* ad Bílek pr. Chotěboř.
- Camptoum curvatum* (Kunze) Lk. ad folia *Scirpi lacustris* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Fusicladium depressum* (B. et Br.) Sacc. ad folia *Angelicae silvestris* in silva Roztoky ad Rusava (Z).
- Fusicladium radiosum* Lib. ad folia *Populi albae* in ripa Bečvae fl. ad Přerov (Z).
- Fusicladium saliciperdu* (Alb. et Schw.) Lind. ad folia *Salicis capreae* in declivitate occidentali collis Hostýn (Z).
- Fusicladium orbiculatum* Thü m. ad folia *Sorbi aucupariae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- **Fusicladium praecox* Rbh. ad folia *Tragopogonis orientalis* in prato ad rivum ad Lhota Radkova (Z).
- Fusicladium aronici* Sacc. ad folia *Doronici austriaci* ad rivum Reglany potok ad Ždiár, infra montem Vidla, in prato Široké pole in mont. Bielské Tatry.
- Passalora bacilligera* Mont. et Fr. ad folia *Alni glutinosae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Scolicotrichum graminis* Fuck. ad folia *Anthoxanthi odorati* ad marginem silvae in monte Šerák in mont. Jeseniky (Z).
- **Cladosporium macrocarpum* Preuss. ad *Brassicam oleraceam capitatam* in Drahonín ad Tišnov.
- Cladosporium acidicola* Thü m. ad *Coleosporium senecionis* ad folia *Senecionis Fuchsi* in colle Holý kopec in collibus Hostýnské kopce (Z);
- ad aecidia ad folia *Tragopogonis orientalis* ad Radkov (Z);
- ad aecidia *Tussilaginis farfarae* in silva Roztoky ad Rusava (Z).
- Heterosporium echinulatum* Cooke ad folia caulesque *Dianthi Carthusianorum* in declivitate merid. collis Chlum in collibus Hostýnské kopce (Z).
- Heterosporium alli* El. et Mart. ad folia *Allii sibirici* in Vel. Kotlina in montibus Jeseniky (Z).
- **Heterosporium graminum* Rostr. ad folia *Dactylis glomeratae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
- Macrosporium cladosporioides* Desm. ad caules *Arctii lappae* in Lípov (Z).
- Alternaria brassicae* Berk. (Sacc. ad folia *Amaranthi retroflexi* in ripa Bečvae fl. in Přerov (Z).
- Roripae amphibiae* in ripa Radkovkae fl. a Dřevohostice ad orientem (Z).
- Alternaria tenuis* Nees. ad folia *Thalictri angustifolii* in fossa ad Turovice (Z).
- Cercospora dubia* (Riess) ad folia *Atriplicis nitentis* in Radňovice ad Nové Město na Mor.;
- Chenopodii albi* in Jaroslavice ad Znojmo.
- Cercospora nasturtii* Pass. ad folia *Roripae amphibiae* in ripa Radkovka fl. ad Dřevohostice (Z).
- Cercospora violae* Sacc. ad folia *Violae sp.* in saxis Pulčinské skály ad Vsetín (Z).
- **Cercospora violae tricoloris* Briosi et Cavara ad folia *Violae tricoloris* in horto in Dřevohostice (Z).
- Cercospora cerasella* Sacc. ad folia *Pruni fruticosae* in declivitate Hradisko supra Předmostí ad Přerov (Z).
- **Cercospora loti* Hollós ad folia *Loti uliginosi* ad Sulov (Bílý kříž) in mont. Beskydy (Z).
- Cercospora zebrina* Pass. ad folia *Trifolii medii* ad Lišná pr. Přerov (Z).
- **Cercospora Davisii* Ell. et Ev. ad folia *Meliloti officinalis* et *albi* in ripa Moštěnka fl. ad Turovice (Z).
- Cercospora lythri* West. (Niessl) ad folia *Lythri salicifolii* in margine silvae Kozrál a Lišná ad merid. (Z).
- Cercospora campi silii* Speg. ad folia *Impatientis nolli tangere* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Cercospora chaerophylli* v. H. ad folia *Charophylli aromatici* in margine silvae Kostelecký les ad Kozrál pr. Holešov (Z).
- **Cercospora echii* Syd. ad folia *Echii vulgaris* in Hradisko supra Předmostí ad Přerov (Z).
- **Cercospora olivacea* O t t h. ad folia *Artemisiae absinthii* in clivo ad Heroltice pr. Tišnov (Z).
- **Cercospora streptopi* Dearn. et Barth. ad folia *Streptopi amplexifolii* in silva in declivitate meridionali montis Král. Sněžník (Z).
- Graphium pallescens* (Fuck.) Magn. ad folia *Stellariae nemorum* in margine silvae Sulov (Bílý kříž) in mont. Beskydy (Z).
- Tubercularia mutabilis* Nees. ad ramos *Mori albae* in Dřevohostice (Z).
- Tubercularia granulata* Pers. ad ramos *Aceris pseudoplatani* in silva ad Dřevohostice (Z);
- Tiliae cordatae* in silva ad Dřevohostice (Z).
- Tubercularia confluens* Pers. ad ramos *Carpini betuli* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
- **Thyrsidinea carneominiata* v. H. ad corticem *Aceris pseudoplatani* ad Bílek pr. Chotěboř.

- Tuberculina persicina* (Ditm.) Sacc. in *aecidiis Petasitidis* in mont. Bielské Tatry.
Exosporium tiliae Lk. ad ramos *Tiliae cordatae* ad Havlíčkův Brod.
Vermicularia heterochaeta Pers. ad folia Muscari comosi in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia telephii Karst. ad folia *Sedi maximi* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia saponariae Allesch. ad caules *Saponariae officinalis* in ripa Moštěnkae fl. ad Turovice (Z).
Vermicularia dematium (Pers) Fr. var. *fennica* Karst. ad caules *Aegopodii podagrariae* in clivo Kamenice ad Turovice (Z).
Vermicularia dematium (Pers.) Fr. ad folia *Iridis pseudoacori* in margine silvae ad Dřevohostice (Z).
Vermicularia oligochaeta Bub. et Kab. ad ramos emortuos in silvula Kamenice ad Turovice (Z).
Sclerotium rhizodes Auersw. ad folia *Poaе Chaixi* in declivitate occident. montis Radhošť (Z);
Holci lanati in silva Ochozy ad Dřevohostice (Z);
Glyceriae plicatae ad Švajgrovka in declivitate orient. collis Hostýn (Z).
Sclerotium leiodermum Rob. ad caules *Fagopyri dumetorum* in ripa Bystřické fl. ad Lípová (Z).

Nové knihy:

- Guttenberg, H.: Lehrbuch der allgemeinen Botanik. 4 rev. A. — 1955, 637 Abb., 7 Taf., 708 stran, cena 25 DM.
- Vogel, S.: Blütenbiologische Typen als Elemente der Sippengliederung. — Fischer, Jena 1954, 177 Abb., 338 stran, cena 40 DM.
- Christiansen, W.: Pflanzenkunde von Schleswig-Holstein. 2 rev. A. — 1955, 122 Abb., 180 stran, cena 14,80 DM.
- Lüdi, W. u. And.: (Ed.): Probleme (Aktuelle) der Pflanzensoziologie. — Bern 1954, 104 stran, cena 10,70 DM.
- Runge, F.: Die Flora Westfalens. — 1955, stran 574, cena 22 DM.
- Ainsworth, G. and Bisby, G.: A Dictionary of the Fungi. 4th ed. — 1954, 139 Fig., 455 stran, cena 16,40 DM.
- Hylander, N.: Vascular Plants of the Scandinavian Countries. — 1954, illus., 392 stran, cena 55 DM.
- Bailey, I. W.: Contributions to Plant Anatomy. — Chron. Bot. 15, 1/6, 1954, 28 illus., 262 stran, cena 7,50 \$.
- Erdtman, G.: Introduction to Pollen Analysis. Second impression. — N. S. Pl. Sci. Books 12, 1954, 46 pl., 239 stran, cena 6 \$.
- Goodspeed, T. H.: The Genus Nicotiana. — Chron. Bot. 16, 1/6, 1954, 536 stran, cena 12,50 \$.
- Funder, S.: Practical Mycology. Manual for identification of fungi. — Broggers Boktr. Forlag, Oslo 1954, 1. vol., 146 stran.
- Wardlaw, C. W.: Embryogenesis in Plants. — Methuen & Co. Ltd, London 1955, 83 fig., stran I—XI + I + 381.
- Wright, R. C. M. - Hort, N. D.: Plant Propagation. — Ward Lock & Co. Ltd., London 1955, 22 tab., 192 stran.