

Oldřich P o t ů č e k:

Příspěvek ke květeně okresu Stod.

V roce 1953 jsem služebně pobýval na stodském okrese, kde jsem měl příležitost sledovat místní květenu od časného jara až do podzimu. Můj příspěvek není zdaleka úplný, protože doba necelého jednoho roku je příliš krátká pro podrobný průzkum jen ve volných sobotách a nedělích. Na svých vycházkách jsem prošel poměrně malé území v okolí Holýšova. Na severu je ohraničeno údolím potoka Hořina od Hradišťan ke Hradci, na východě vrchem Trný (též Trní) a polesím Vytůň (též Výtoň neb Vytouň), na jihu a západě pak čarou od lesního střediska Vytůň přes Horní a Dolní Kamenici na Kvíčovice, Neuměř a přes Všekary ke Hradišťanům. Geologicky je toto území, ležící s výjimkou vrcholku Trného (502 m n. m.) v pahorkatině, charakterisováno algonkickými břidlicemi; Trný je tvořen amfibolovou břidlicí, mezi ním, Holýšovem a Vytouní vystupují karbonské pískovce, u pily v Holýšově pak spilit. Území tvoří část kotliny protékané Radbuzou a chráněné na severu a na východě táhlými vyvýšenými hřbety, které jsou pokryty smíšenými neb borovými lesy. Díky této výhodné poloze se zde udržela řada teplomilných druhů, které se sem šířily zejména podle řeky a potoků a v novější době též podle železniční trati.

Botanicky nejzajímavějšími lokalitami jsou vrch Trný a bor na jeho jižním svahu až ke zbořené výtoňské hájovně, údolí Radbuzy a potoka Hořina se skalami a suchými stráněmi. V uvedeném území jsem zaznamenal na 600 druhů, z nichž tu uveřejňuji jen významnější nálezy.

Děkuji prom. biol. V l. S k a l i c k é m u a Dr J. H o u f k o v i za cenné pokyny a prom. biol. J. M o r a v c o v i za revisi rodu *Carex*. Zkratka H. znamená Holýšov.

Acer negundo L. — všude (i v lesích) dosti často vysazovaný a běžně zplaňující.

Achillea collina Becker ssp. *eurollina* D o s t. — na slunných místech roztroušeně.

Achillea ptarmica L. — v údolí potoka Hořina roztroušeně cca 350 m n. m.

Achyrophorus maculatus (L.) S c o p. ssp. *eumaculatus* D o s t. — na kamenitých loukách roztroušeně.

Agrimonia eupatoria L. ssp. *officinalis* (L a m.) G a m s — v příkopech, na lesních okrajích a na světlinách roztroušeně.

Agrostemma githago L. — poměrně vzácný polní plevel.

Alyssum saxatile L. ssp. *arduini* (F r i t s c h) H a y. — na „Vysoké skále“ na pr. bř. Radbuzy pod Holýšovem hojně, 380 m n. m.

Amaranthus retroflexus L. — na rumišťích roztroušeně.

Anthemis cotula L. — Holýšov (dále jen H.), u Nového dvora roztroušeně, 354 m n. m.

Anthemis tinctoria L. — H., u silnice za pilou hojně, 360 m n. m.

Anthericum liliago L. — na suchých stráních a skalách podél Radbuzy a Hořiny hojně.

Arctium lappa L. — na ruder. místech roztroušeně.

Arnica montana L. — v boru v lese Hořina vlevo od silnice do Honezovic vzácně, 380 m n. m.

Podle M a l o c h a (Květena v Plzeňsku, 1913) hojná; byla pravděpodobně vyhubena kořenářkami.

- Asplenium ruta-muraria* L. — viděl jsem pouze pěstované v hrnku (!) za oknem v Holýšově, na přirozených stanovištích jsem je nenalezl.
- Avenastrum pubescens* (Huds.) Opiz — H., v lese nad lomem u Hamerského mlýna roztroušeně, 370 m n. m.
- Berberis vulgaris* L. — H., před Hamerským mlýnem na břehu vysázený spolu s mahonií, 350 m n. m.
- Brassica rapa* L. em. Metz g. — Všekary, na polích zplanělá, 450 m n. m.
- Butomus umbellatus* L. — H., na mělčině v Radbuze nad Hamerským mlýnem vzácně, 348 m n. m.
- Calamintha clinopodium* Spenner — na lesních okrajích velmi roztroušeně.
- Callitriche verna* L. — v lesním potůčku blízko levého břehu Radbuzy vzácně, 350 m n. m.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull. — v borech všude hojný, na suchých stráních nad potokem Hořina tvoří souvislé porosty, v nichž se ojediněle vyskytuje i v bělokvěté formě.
- Calystegia sepium* (L.) R. Br. — H., vzácně v silničním příkopě v ulici Politických vězňů, 355 m n. m.
- Camelina microcarpa* Andr. — v lese Hořina u cest ojediněle zavlečený plevel, 380—400 m n. m.
- Campanula glomerata* L. — v lese a na jeho okraji nad železniční tratí JŽ od Hradce roztroušeně, 370 m n. m.
- Cardaria draba* (L.) Desv. — H., na rud. místech roztroušeně.
- Carduus acanthoides* L. — na suchých mezích a pasekách roztroušeně.
- Carduus crispus* L. — v lese pod Trným vzácně, cca 450 m n. m.
- Carduus nutans* L. — na suchých stráních a loukách roztroušeně až hojně.
- Carex montana* L. — ve světlých borových lesích hojně.
- Carex umbrosa* Host — ve světlých lesích na vlhkých místech dosti vzácně.
- Carlina vulgaris* L. ssp. *typica* (Beck) Dost. — na suchých stráních a ve světlých lesích roztroušeně až hojně.
- Carpinus betulus* L. — ve smíšených lesích roztroušeně.
- Centaurea scabiosa* L. ssp. *euscabiosa* Gugl. — na jižním okraji lesa Hořina vzácně, 350 m n. m.
- Centaurea stoebe* (L.) Sch. Thell. ssp. *rhenana* (Borb.) Gugl. — na skalnatých a suchých stráních hojně.
- Centaurium minus* Moench ssp. *typicum* (Witt.) Ronn. — v borech a na pasekách roztroušeně.
- Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce — v lese Hořina pod „Bakovnou“ vzácně, 380 m n. m.
- Cerastium viscosum* L. — H., nad lomem u Hamerského mlýna na okraji lesa hojně, 370 m n. m.
- Chaenorrhinum minus* (L.) Lge. — u cesty na jižním a jihovýchodním okraji lesa Hořina vzácně, 350 m n. m.
- Chaerophyllum aromaticum* L. — na lukách a zvláště na lesních okrajích roztroušeně.
- Chaerophyllum bulbosum* L. — v lese podél Radbuzy pod Holýšovem roztroušeně, 350 m n. m.
- Chamaebuxus alpestris* Spach — v borech roztroušeně až hojně.
- Chrysanthemum corymbosum* L. ssp. *typicum* (Posp.) Dost. — H., v lomu u Hamerského mlýna roztroušeně, na Trném vzácně.
- Cichorium intybus* L. — na mezích a sušších loukách roztroušeně.
- Cirsium acaule* (L.) Scop. — na suchých stráních u Hradce roztroušeně, 360 m n. m.
- Conium maculatum* L. — na kompostu u zeleně značené turistické stezky v lese „V hanovkách“ blízko potoka Hořina vzácně, 360 m n. m.
- Consolida ajacis* (L.) Schur em. Gáy. — v lese Hořina u silnice nad Hamerským mlýnem zplanělá, 370 m n. m.
- Cornus sanguinea* L. — v listnatých lesích a na lesních okrajích roztroušeně.
- Corylus avellana* L. — v borových a listnatých, někdy i smíšených lesích jako podrost, na suchých stráních nad potokem Hořina tvoří řídké porosty s břízou a borovicí.
- Crataegus monogyna* Jacq. ssp. *eumonogyna* Dost. — v lesích vzácně.
- Crataegus oxyacantha* L. — v lesích roztroušeně.
- Crepis biennis* L. — na vlhkých loukách roztroušeně.
- Crepis mollis* (Jacq.) Asch. ssp. *succisifolia* (All.) Jáv. — na vlhkých loukách roztroušeně.
- Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers. — na skalách v údolí Radbuzy pod Holýšovem hojně.
- Daphne mezereum* L. — v lese Hořina roztroušeně, zvláště v listnatých hájích, 380 m n. m.
- Epilobium hirsutum* L. — u cesty na jihovýchodním okraji lesa Hořina roztroušeně, 350 m n. m.
- Epilobium parviflorum* Schreb. — H., u železniční trati nad pilou roztroušeně, 360 m n. m.
- Epipactis latifolia* (L.) All. — v lesích roztroušeně až hojně.
- Erica carnea* L. — v boru na jihovýchodním úpatí Trného až ke zbořené výtoňské hájovně roztroušeně až hojně, asi 450 m n. m.
- Euonymus europaea* L. — v listnatých nebo smíšených lesích a zvláště na okrajích roztroušeně.
- Euphorbia cyparissias* L. — na mezích, podél cest a na sušších místech roztroušeně.
- Fagus sylvatica* L. — v lesích hojně vysazovaný, sotva původní.

- Filipendula vulgaris* Moench. — Jako velmi hojnou udává v okolí Maloch, našel jsem však jediný exemplář na vlhké loučce na okraji lesa jižně od ústí potoka Hořina.
- Fragaria moschata* Duch. — v příkopech a v lomu nad Hamerským mlýnem vzácně.
- Fragaria viridis* Duch. — v borech vzácně.
- Gagea arvensis* (Perr.) Dum. — na suchých místech a v polích vzácně; nad lomem u Hamerského mlýna jsem našel bohatě kvetoucí exemplář, který měl v květenství 7 květů normálních — $P\ 3 + 3\ A\ 3 + 3\ G\ (3)$ — a 3 květy s pomnoženými částmi květními. Prvý z nich měl tetramerický perigon — $P\ 4 + 4\ A\ 3 + 3\ G\ (3)$ —, druhý měl tetramerické gynoeceum — $P\ 3 + 3\ A\ 3 + 3\ G\ (4)$ — a třetí pak byl dokonce hexamerický a v gynoeceu heptamerický — $P\ 6 + 6\ A\ 6 + 6\ G\ (7)$.
- Galeopsis pubescens* Bess. — v lese „V hanovkách“ na kompostu u zeleně značené turistické stezky blízko potoka Hořina vzácně, 360 m n. m.
- Galium cruciata* (L.) Scop. — na levém břehu Radbuzy nad Hradcem hojně, 345 m n. m.
- Galium ochroleucum* Wolff. (*G. mollugo* $\times$ *verum* - Schultz) — H., u silnice za elektrárnou roztroušeně, 350 m n. m.
- Galium scabrum* L. — v lese Hořina vzácně, 390 m n. m.
- Galium silvaticum* L. — ve světlých lesích vzácně až roztroušeně.
- Genista germanica* L. — u školky pod „Bakovnou“ jižně od bývalé hájovny v lese Hořina roztroušeně, 380 m n. m.
- Geranium columbinum* L. — H., u cesty mezi lomem a Hamerským mlýnem roztroušeně, 350 m n. m.
- Geranium dissectum* Jusl. — v holýšovském poleší vzácně.
- Geranium palustre* Torner — na jižním okraji lesa Hořina roztroušeně, 350 m n. m.
- Geranium pratense* L. — podél cest a na lukách hojně.
- Gnaphalium luteo-album* L. — na skalce při výtoku potoka Hořina z lesa vzácně, 345 m n. m.
- Hedera helix* L. — H., u závodního klubu na bříze, 360 m n. m.
- Hierochloë australis* (Schrad.) Roem. Sch. — v doubravě na Trném roztroušeně, 500 m n. m.
- Humulus lupulus* L. — v pobřežních křovinách a v lese podél Radbuzy hojný, druhotně vysazovaný k plotům.
- Hypericum hirsutum* L. — na světlých místech v lese Hořina vzácně, 380 m n. m.
- Hypericum montanum* L. — na suchých stráních u Hradce vzácně, 360 m n. m.
- Inula britannica* L. — v lese Hořina u silnice asi 200 m SZ od „Bakovny“ roztroušeně, 380 m n. m.
- Juncus compressus* Jacq. — na lesních cestách roztroušeně.
- Juniperus communis* L. ssp. *eucommunis* Briq. — v borech jako podrost roztroušeně až hojně.
- Knutia silvatica* (L.) Duby — v lese Hořina velmi roztroušeně, 380 m n. m.
- Lactuca serriola* (L.) Torn. — na kamenitých místech a náspech roztroušeně.
- Lathyrus silvester* L. ssp. *platyphyllus* (Retz.) Dost. — v Hradišanech u lesní školky, jakož i jinde v holýšovském poleší vzácně až roztroušeně, u bývalé hájovny v lese Hořina pospolitě.
- Lathyrus tuberosus* L. — Hradec u Stoda, u železniční trati u strážního domku nad potokem Hořina jediná rostlina, 350 m n. m.
- Leonurus cardiaca* L. — H., u JZD roztroušeně, 350 m n. m.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. — na polích jako plevel roztroušeně.
- Ligustrum vulgare* L. — pěstované v živých plotech.
- Lilium maritagon* L. — v doubravě na Trném vzácně, 500 m n. m.
- Lonicera xylosteum* L. — v lese na levém břehu Radbuzy mezi H. a Hradcem roztroušeně, 345 m n. m.
- Lotus uliginosus* Schkuhr — H., na vlhké louce za elektrárnou hojně, 350 m n. m.
- Malva alcea* L. — H., u lomu nad Hamerským mlýnem vzácně, 350 m n. m.
- Matricaria chamomilla* L. — ojedíněle na návších.
- Melilotus albus* Desr. — na rumišťích podél cest hojně.
- Melilotus officinalis* (L.) Lam. — na stejných místech roztroušeně.
- Mentha arvensis* L. ssp. *agrestis* (Sole) Briq. — v polích a na lesních okrajích vzácně.
- Mercurialis perennis* L. — v doubravě na Trném hojně, 500 m n. m.
- Myosotis discolor* Pers. — v lese Hořina v bývalé školce za „Bakovnou“ roztroušeně, 380 m n. m.
- Myosotis hispida* Schlecht. — tamtéž vzácně.
- Myosotis silvatica* (Ehrh.) Hofm. — v borech velmi roztroušeně.
- Myosotis sparsiflora* Mikanf. — na pravém břehu Radbuzy před „Vysokou skálou“ roztroušeně, 350 m n. m.
- Onobrychis viciifolia* Scop. ssp. *sativa* (Lam. et DC.) Thell. — podél železniční trati roztroušeně.
- Ononis repens* L. — H., na úhorech a u cesty u lesíka nad pilou roztroušeně, 390 m n. m.
- Onopordum acanthium* L. — H., u vodárny vzácně, 350 m n. m.

- Orchis maculata* L. ssp. *helodes* (Gris.) Cam. — v lese Hořina mezi „Bakovnou“ a lesní školkou velmi roztroušeně na pasece, 370 m n. m.
- Orchis majalis* Rehb. — H., na vlhké louce za elektrárnou hojně, 350 m n. m.
- Orchis morio* L. — H., na suché rovině nad skálou u pily mezi vršesem hojně, na suchých stránkách nad pravým břehem Radbuzy u Hradce vzácně.
- Oxalis stricta* L. — na rud. místech vzácně (na př. u bývalé hájovny v lese Hořina).
- Papaver strigosum* (Boen.) Schur — H., u silnice k Novému dvoru vzácně, 350 m n. m.
- Pastinaca sativa* L. ssp. *eusativa* Briq. — H., u elektrárny roztroušeně, 350 m n. m.
- Petasites albus* (L.) Gaertn. — u lesní silnice pod „Bakovnou“ v lese Hořina vzácně, 370 m n. m.
- Peucedanum cervaria* (L.) Lap. — H., nad lomem u Hamerského mlýna roztroušeně, 370 m n. m.
- Phacelia tanacetifolia* Benth. — H., u závodního klubu roztroušeně.
- Phegopteris robertiana* (Hoffm.) A. Br. — v holýšovském polesí na kamenné zídce asi 100 m na sever od „Bakovny“ vzácně, 390 m n. m.
- Pirus communis* L. ssp. *piraster* (L.) Hegi — H., nad lomem u Hamerského mlýna roztroušeně 370 m n. m.
- Pirus communis* L. ssp. *sativa* (Lam. et DC.) A. Gr. — často pěstovaný strom, v lese Hořina ojediněle zplnělý.
- Platanthera bifolia* (L.) Rich. — v holýšovském polesí na světlých místech vzácně.
- Platanthera chlorantha* (Cust.) Rehb. — na stejných místech roztroušeně.
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce — H., nad lomem u Hamerského mlýna roztroušeně, 370 m n. m.
- Populus alba* L. — v lese Hořina na vlhkých místech ojediněle vysázený.
- Populus nigra* L. — v lese Hořina dosti hojně vysázený, zvláště kolem „Bakovny“ [i v ssp. *italica* (Duroi) Dost.].
- Potentilla argentea* L. — na suchých stránkách, podél cest, na lesních okrajích a skalách u Radbuzy roztroušeně až hojně.
- Potentilla fruticosa* L. — H., u Hamerského mlýna vysázeno několik statných keřů až 1,5 m vysokých na břehu náhonu, 350 m n. m.
- Potentilla heptaphylla* L. ssp. *rubens* (Cr.) Hegi — u silnice v lese Hořina ojediněle, 380 m n. m.
- Potentilla reptans* L. — na lukách, v příkopech i jinde roztroušeně.
- Primula elatior* (L.) Hill ssp. *genuina* Pax — na březích lesních potoků roztroušeně.
- Primula veris* L. em. Huds. ssp. *genuina* (Pax) Lüdi var. *typica* Pax — v doubravě na Trném roztroušeně, 500 m n. m.
- Quercus petraea* (Mattusch.) Liebl. — v lesích řídce vysazovaný, na vrcholku Trného. tvoří zbytek původní doubravy s lípou malolistou.
- Quercus robur* L. — v lesích roztroušeně vysazovaný, místy tvoří menší ± čisté porosty (nejvýš s *Acer platanoides* L.), na př. okraj lesa Hořina proti Novému dvoru — snad zbytek původních doubrav.
- Ranunculus breynius* Cr. — v lese Hořina na stinných místech roztroušeně.
- Ranunculus bulbosus* L. — na suchých loukách vzácně.
- Raphanus raphanistrum* L. — Všekary, na polích jako plevel vzácně, 450 m n. m.
- Reseda lutea* L. — H., na nádraží a podél trati roztroušeně až hojně, 360 m n. m.
- Rosa gallica* L. — na lesních okrajích, na mezích a podél cest roztroušeně.
- Rosa rubiginosa* L. — H., nad lomem u Hamerského mlýna i jinde na skalnatých místech roztroušeně.
- Salix purpurea* L. — podél Radbuzy dosti hojně, 350 m n. m.
- Salvia pratensis* L. — Hradec u Stoda, na loukách hojně, 360 m n. m.
- Sanguisorba minor* Scop. ssp. *dictyocarpa* (Spach) Rouy et Cam. — H., na kamenitých místech podél silnice za elektrárnou hojně, 350 m n. m.
- Sanicula europaea* L. — v lesích zvláště listnatých, roztroušeně.
- Saponaria officinalis* L. — v houštinách na levém břehu Radbuzy, ale též podle cest roztroušeně, v plnokvětě formě pěstovaná i porůznu zplnělá.
- Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. Koch — u silnice v lese Hořina blízko Hamerského mlýna vzácně, 370 m n. m.
- Scabiosa ochroleuca* L. — na suchých stránkách, kamenitých místech a podél trati roztroušeně až hojně.
- Sedum rupestre* L. — H., v lomu nad Hamerským mlýnem roztroušeně, 360 m n. m.
- Sedum sexangulare* L. ssp. *boloniense* (Lois.) Fenzl — H., u silnice za elektrárnou roztroušeně, 350 m n. m.
- Sedum spurium* M. B., — v lese Hořina zplnělé na kamenné zídce asi 100 m na sever od „Bakovny“, 390 m n. m.
- Sedum telephium* L. ssp. *maximum* (L.) Rouy et Cam. — Hradec u Stoda, na suchých stránkách roztroušeně, 370 m n. m.

Senecio nemorensis L. ssp. *Fuchsii* (Gmel.) Dur. — na vlhčích lesních místech roztroušeně.
Teucrium chamaedrys L. — H., u silnice k Novému dvoru vzácně, 350 m n. m.
Thlaspi perfoliatum L. — hojnější než *Thl. arvense* L. na ruder. místech a sušších loukách.
Tilia cordata Mill. — na Trném jako druhá složka doubravy, jinak roztroušeně po lesích a často podle cest i jinde vysazovaná.
Tilia platyphylloides Scop. ssp. *euplatyphylloides* C. K. Schn. — v lesích vzácně.
Tragopogon pratensis L. ssp. *eupraticus* Thell. — H., u Nového dvora vzácně, 354 m n. m.
Trifolium montanum L. — Hradec u Stoda, na suchých stráních na břehu Radbuzy vzácně.
Verbascum collinum Schrad. (*V. nigrum* × *thapsus* Hay.) — v lese Hořina na náspu přes roklinu za „Bakovnou“ 1 kus, 370 m n. m.
Verbascum lychnitis L. — na suchých kamenitých stráních roztroušeně.
Verbascum nigrum L. — v lese Hořina roztroušeně.
Verbascum schiedeanum Koch (*V. lychnitis* × *nigrum* Focke) — tamtéž poněkud hojnější.
Verbascum thapsiforme Schrad. — ve světlejších lesích a na pasekách roztroušeně.
Verbascum thapsus L. — H., u železniční trati roztroušeně, 360 m n. m.
Veronica agrestis L. — H., v příkopu u silnice za elektrárnou roztroušeně, 350 m n. m.
Veronica dillenii Cr. — H., nad lomem u Hamerského mlýna hojně, 370 m n. m.
Veronica prostrata L. — na louce na jižním okraji Hradce roztroušeně, 350 m n. m.
Vicia pannonica Cr. ssp. *typica* (Beck) Dost. — na okraji lesa Hořina vlevo od silnice od Nov. dvora vedoucí vzácně, 350 m n. m.
Vicia sativa L. ssp. *angustifolia* (L.) Gaud. — na louce jižně od Hradce vzácně, 360 m n. m.
Vicia villosa Roth ssp. *euvillosa* Cav. — v lese u Hamerského mlýna roztroušeně, 370 m n. m.
Viola hirta L. — v silničním příkopu na okraji lesa Hořina roztroušeně, 350 m n. m.
Viola odorata L. — na lesních okrajích vzácně, hojněji pěstovaná v zahrádkách.

V. Horák — V. Chán :

Nová lokalita ožanky čpavé (*Teucrium scorodonia* L.) v Čechách.

Tento zajímavý západní (atlantský) typ, jak píše K. Cejp ve Vědě přírodní, roč. 19, p. 18, je v Čechách velmi vzácný. Uvádí se dosud hlavně ze západní a severozápadní oblasti Čech, Čelákovský se zmiňuje o výskytu na Šumavě — na bavorské straně (Prodromus p. 362).

Objevíli jsme novou lokalitu na Chrudimsku v podhůří Železných hor, a to na mytíně v polesí Hůra u Slatiňan, asi 2 km jihovýchodně od t. zv. Švýčárny. Roste zde velmi hojně na výslunném okraji borového lesa v nadmořské výši 360—370 m (okraje lokality směrem k lesní cestě, spojující Slatiňany s Trpišovem, jsou cca 300 m n. m.) s borůvkou v porostu nízkých plazivých ostružiníků. Hojná je i na okraji nedalekého smrkového mlází. Celá lokalita, kde tato ožanka dominuje, je asi 20 × 30 m veliká a tvoří menší nebo větší výběžky v okruhu asi 50—100 m. Jeden trs východně od této lokality rostl při lesní cestě ještě asi 400 m daleko.

Lokalitu jsme zjistili v červenci 1953. Na výsluní kvetla ožanka během července, ve stínu ještě v první polovině srpna. R. 1955 byla koncem srpna i na výsluní v plném květu. Herbářové doklady jsou uloženy jednak v přírodovědeckém oddělení pardubického musea, jednak v botanickém ústavu Karlovy university a v našich herbářích.

Za dva roky od doby nálezů se lokalita ožanky značně zvětšila. Dnes měří již 30 × 50 m a jednotlivé rostliny se nacházejí ve všech směrech odtud, místy až ve vzdálenosti 600 m. Ožanka jeví značnou agresi; *Vaccinium myrtillus* v jejím sousedství úplně mizí, ustupují před ní i trávy (*Calamagrostis epigeios* a j.) a zdá se, že i ostružiníky.

Teucrium scorodonia nebylo dosud na Chrudimsku ani Pardubicku (podle sdělení J. Hadače) zaznamenáno. Nejblíže lokalita je v lese u Chocně (Novák F. A.: Ožanka čpavá, *Teucrium scorodonia* L., u Chocně, Čs. bot. listy, 3 : 5, 1950) a u Nového Města nad Metují (Dostál J.: Květena ČSR, Praha 1950).

O původnosti této lokality se zatím nevyslovujeme. Celé polesí, v němž se nachází, jeví značné umělé zásahy lidské (rozšíření *Castanea sativa* severně i východně odtud a kulturní smrkové lesy v okolí).