

Jan Gregor:

Príspevek ke květeně Žďárských vrchů

Při své diplomové fytoecenologické práci, konané na dářských rašeliništích, jsem podnikl r. 1954 a 1955 několik exkursí do Žďárských vrchů a jejich okolí za účelem obohacení floristických nálezů z tohoto dosud celkem nemnoho probádaného území. Uvádím zde méně běžné druhy, jejichž lokality jsou pro Žďárské vrchy vesměs nové. Doklady sběrů jsou uloženy v mém herbáři.

Achillea ptarmica L.: paseka při „Černé silnici“ jihovýchodně od Ranských jezírek; severovýchodní břeh rybníku „Starý“ u Krejcaru severozápadně od Svatky.

Aconitum variegatum L.: Ranská jezírka.

Actaea spicata L.: olšina východně od Ranských jezírek; karasínská bučina severovýchodně od Bystřice n. Pernšt.; smrkové lesy na Štarkovu východně od Sněžného; lesní údolí Kaňásky jihovýchodně od Rokytna.

Alopecurus aequalis S o b o l.: obnažený východní břeh rybníku Doubravníka jihozápadně od Radostína; obnažený jihozápadní břeh rybníku Sykovce jihovýchodně od Tří Studní; vypuštěné Malé Dářsko.

Alopecurus geniculatus L.: dno vypuštěného rybníka Utopence, západně od Vortové; rašelinná louka na okraji Padrtn pod radostínským kopcem jižně od Radostína; severní břeh Matějovského rybníka u Nového Veselí.

Asplenium trichomanes L. em. H u d s.: na balvanech ve smrčíně západně od vrcholku Babylonu; Peperek; Rozštípená skála v údolí Sázavy u Najedku.

Blasmus compressus (L.) P a n z.: severovýchodní břeh Malého Dářska; horní okraj Štírova dolu v údolí Doubravky u Křížové.

Cardamine impatiens L.: lesní louka jižně od Račina; druh ve Žďárských vrších velmi roztroušený.

Carex brizoides L.: olšina pod Brožovou skalkou u Skleného.

Carex buxbaumii W a h l b. ssp. *hartmanii* (C a j.) D o m.: těsně pod silnicí Radostín—Vepřová na západním konci radostínského rašeliniště jihozápadně od Radostína (v místech, kde stávala bývalá hájenka).

Carex chordorrhiza E h r h.: na dářských rašeliništích, a to na okraji Padrtn jižně od Radostína (přesnější vymezení: v úzkém pásu na přechodu z lesní do luční rašeliny, dlouhém asi 200 m, začínajícím asi 150 m západně od polnícké cesty a pokračujícím odtud dále na západ).

Carex pauciflora L i g h t f.: rašeliniště Březina východně od Radostína.

Carex pendula H u d s.: bučina severně od silnice Staré Ransko—Borová.

Carex umbrosa H o s t.: smrčina severně od silnice Staré Ransko—Borová.

Circaea alpina L.: bažiny západně od vrcholku Babylonu.

Dentaria enneaphyllos L.: olšina východně od Ranských jezírek; bučina severovýchodně od Ranských jezírek; karasínská bučina severovýchodně od Bystřice n. Pernšt.

Drosera rotundifolia L.: ve Žďárských vrších na vlhkých a rašelinných lukách dosti hojný druh. Objevil jsem jej na těchto lokalitách: Dářská rašeliniště; Šaratky u Pohledce; vlhké louky u Tatíčkovy lesa jihovýchodně od Rokytna; louka „Mlynářky“ jižně od Račina; louka „Maštálky“ jižně od Račina; bezejmenná lesní louka jižně od Račina; louka severně od Račina; louka při Novém rybníku u Račina; břehy rybníka Lejnárky severozápadně od Žďáru n. Sáz.; břehy druhého menšího rybníka u Lejnárky; vlhká lesní louka při cestě mezi Peperkem a Lejnarkou; luční cesta asi 200 m vých. od břehů rybníka Zlámance u Vortové; jižní břeh rybníka Zlámance u Vortové; rašelinné louky severně od Skleného; Ranská jezírka (u největšího jezírka na výběžku s pokřivenou borovicí proti chatě); louka západně od lesa „Bratranovská“ u Lhotky; břehy rybníka východně od Rovného u silnice Nové Město na Mor.—Bystřice n. Pernšt.; rašelinná louka u Světnova; svahové zamokřené louky jihovýchodně od Skleného; Nový rybník u Fryšavy; lesní rybníček mezi Rokytnem a Vlachovicemi; vlhká louka v údolí mezi Rokytnem a Vlachovicemi; rašelinná louka „Amerika“ u Henzlíčky jihovýchodně od Borové; severní cíp Pílského

rybníka; rybník „Starý“ u Krejcaru severozápadně od Svatky; louka na jižním okraji Cikháje; na holé rašelině odumřelého vrchoviště mezi Košinovem a Zalíbeným.

Eriophorum vaginatum L.: lesní louka jižně od Račina.

Galeopsis speciosa Mill.: při „Černé silnici“ jihovýchodně od Ranských jezírek; bažiny západně od vrcholku Babylonu.

Galium scabrum L.: bučina pod vrcholkem Peperku; bučina sev. od silnice Staré Ransko—Borová.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: travnatý úval na severním svahu Štírova dolu; na vlhké louce asi 50 m západně od silnice Radostín—Vepřová na okraji lesa jihozápadně od Radostína. *Gypsophila muralis* L.: obnažený jihozápadní břeh rybníka Sykovce jihovýchodně od Tří Studní.

Heleocharis pauciflora (Lightf.) Link: louka na východním břehu rybníka Řeky u Křížové.

Juncus squarrosus L.: jihovýchodní břeh Malého Dářska; severovýchodní břeh Malého Dářska.

Lilium bulbiferum L. ssp. *eubulbiferum* Holub: na jediné lokalitě ve Ždárských vrších ve velkém množství (r. 1954 v jetelovém poli, r. 1955 v žitném poli tento druh částečně vytlačen) u polní cesty v poloviční vzdálenosti mezi Rokytnem a Vlachovicemi; velmi pravděpodobně ovšem zplanělý druh.

Lycopodium selago L.: rulová ssut pod vrcholem Dráteníčků u Blatin.

Myosotis micrantha Pall.: u cesty v karasínské bučině severovýchodně od Bystřice n. Pernšt.

Narcissus poeticus L. ssp. *majalis* (Curt.) Dost.: zavlečen v jediném trsu na louce na západním okraji radostínského rašeliníště pod radostínským kopečkem jižně od Radostína. *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Duby: na plovoucích rašeliníkových kobercích u Panské Bídy východně od Radostína; na poloviční vzdálenosti mezi Malým Dářskem a Štírovým dolem v údolí Doubravky u klenového keře; v lesnatém údolí Doubravky u Hluboké v řečišti mezi balvany na jižním konci lesa.

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: v bučině severovýchodně od Ranských jezírek.

Oxyccoccus quadripetalus Gilib ssp. *vulgaris* (Blytt) Br. - Bl.: dářská rašeliníště; rašeliníště mezi Košinovem a Zalíbeným; rašelinná louka „Amerika“ u Henzličky jihovýchodně od Borové.

Peplis portulaca L.: obnažený břeh rybníka Sykovce jihovýchodně od Tří Studní; břeh Pílského rybníka; vypuštěné Malé Dářsko.

Plantago major L. ssp. *pleiosperma* Pilger: obnažené dno Malého Dářska; nový druh pro Ždárské vřehy.

Poa remota Fors.: olšina pod Brožovou skalkou u Skleného; olšina na západním úpatí Žakovy hory.

Ranunculus breyninus Cr.: na příkopě při „Černé silnici“ jihovýchodně od Ranských jezírek.

Ranunculus lanuginosus L.: olšina severovýchodně od Ranských jezírek; na okraji smrkové houštiny západně od silnice Radostín—Vepřová, jihozápadně od Radostína.

Ranunculus sceleratus L.: obnažený břeh rybníka Medlova, jihovýchodně od Tří Studní; vypuštěné Malé Dářsko; Pílský rybník; Matějovský rybník u Nového Veselí; rybníky východně od Budeje.

Sagina nodosa (L.) Fenzl.: vlhká louka v údolí Doubravky před jejím vtokem do Štírova dolu; rybník Lejznarka severozáp. od Ždaru n. Sáz.; druh ani ne tak řídký, jako spíše přehlížený.

Salix repens L. ssp. *rosmarinifolia* (L.) Chrtm.: na rašelinné louce pod radostínským kopečkem jižně od Radostína.

Stellaria graminea L.: olšina nad Hudeckou skalkou; rybník Zlámanec jižně od Vortové; druh ve Ždárských vrších dosti řídký.

Thalictrum aquilegifolium L.: na vlhké louce asi 100 m od jižních břehů rybníka Řeky u Křížové.

Trichophorum alpinum (L.) Pers.: rašelinné louky severně od Skleného; louka v údolí mezi Rokytnem a Vlachovicemi.

Veronica montana Jusl.: okraj karasínské bučiny severovýchodně od Bystřice n. Pernšt.; ve Ždárských vrších pouze roztroušeně rostoucí druh.