

Věroslav Šimeček:

Příspěvek ke květeně dolního Posázaví.

Na podnět p. prof. J. Dostála jsem se pokusil v letech 1949—1950 prozkoumat oblast dolního Posázaví po stránce sociologické i floristické. Protože však tato disertační práce ani výtah z ní nebyly dosud publikovány a od floristického výzkumu z doby Čelakovského (1, 2) a Rohleny (3, 4) uplynulo již hodně času, takže rozšíření jednotlivých druhů se změnilo a souborná práce o této oblasti uveřejněna nebyla (kromě několika menších příspěvků, na př. 7—10), uveřejňuji dodatečně výtah z floristické části této práce. Pořadí rostlin je podle Květeny ČSR (5).

Uvádím vesměs rostliny teplomilné, které náležejí teplé pannonské oblasti (kotlina pražská, středočeská), sahající ze středních Čech údolím Vltavy k jihu a odbočující na východ údolím Sázavy až téměř k řece Blanici. Západní část této oblasti bývá označována jako dolní Posázaví (přibližně Davle—Čerčany). Protože však současně probíhal výzkum sázavského přítoku Blanice, rozšířil jsem oblast výzkumu až k ústí Blanice do Sázavy.

Základem pro výběr rostlin byla příručka pro rostlinné mapování v NDR (11), která je vhodná i pro území naší republiky. Její seznam byl rozšířen o zmíněné rostliny teplomilné, dále na př. o rostliny horské, splavené až do této oblasti a o některé další významnější rostliny.

Pro přehled uvádím nejčastější lokality (viz orientační mapku) a současně i jejich nadmořské výšky v rozmezí, ve kterém se vyskytuje většina rostlin, z těchto míst uváděných.



Orientální mapka dolního Posázaví

1. Okrouhelský revír sev. od Pikovic: 300—320 m n. m.
2. Zahofánské údolí v Okrouhelském revíru: 240 m n. m.
3. Hornopožárský revír sev. od Kamenného Přívozu: 360—380 m n. m., sev. od Prosečnice: 380—485 m n. m.
4. Hradečnice sev. od Zbořeného Kostelce: 300—390 m n. m.

5. Čapík jižně od Stříbrné Skalice: 300—360 m n. m.
6. Davidka severozáp. od Sázavy města (vých. od Stříbrné Skalice): 360—420 m n. m.
7. Jestřáb vých. od Sázavy města: 300—320 m n. m.
8. Sekanka u ústí Sázavy: 230—260 m n. m.
9. Medník: 360—410 m n. m.
10. V Koláči záp. od Lešan (již. od Kamenného Přívozu): 295—330 m n. m.
11. Větrov jihozáp. od Nespek: 350—370 m n. m.
12. Zálušní les záp. od Dubska (severových. od Čerčan): 300—380 m n. m.
13. Vrážský vrch již. od Chocerad: 400—470 m n. m.
14. Spálený vřeh vých. od Dojetřic (záp. od Sázavy města): 400—460 m n. m.
15. Maní hora jihozáp. od Ledečka: 400—470 m n. m.
16. Šrámota vých. od Vestce: 390—460 m n. m.
17. Ďábel sev. od Petrova: 360—390 m n. m.
18. Lutov záp. od Poříčí: 300—340 m n. m.
19. V zahrádkách záp. od Luk pod Medníkem: 380—400 m n. m.
20. Komorní Hrádek jihozáp. od Chocerad: 300—330 m n. m.
21. Radličník sev. od Drahňovic: 380—430 m n. m.
22. Sázava u ústí do Vltavy: 195 m n. m.
23. Blanice u ústí do Sázavy: 304 m n. m.
24. Zahořanský potok: 220—240 m n. m.
25. Čakovický potok: 280—290 m n. m.
26. Mnichovka: 284—300 m n. m.
27. Vlkánčický potok: 290—315 m n. m.
28. Vodslivský potok: 300—450 m n. m.
29. Křešický potok: 340—360 m n. m.

Lycopodium clavatum L.: sušší smrčina V jestřábu vých. od města Sázavy.

Equisetum silvaticum L.: sestupuje údolím Sázavy k Blanici a Vodslivskému potoku.

Phegopteris polypodioides F é é: vlhká smrčina Okrouhelský revír nad Zahořanským potokem, severně od Pikovic.

Asplenium septentrionale H o f f m.: nevápencové skály u Pikovic, Luk pod Medníkem, Petrova, Borové, Ledečka, Sázavy m., Stříbrné Skalice, Č. Šternberka, na Medníku.

Asplenium germanicum W e i s s.: silikátové skály mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem.

Asplenium ruta-muraria L.: vápencové skály u Pikovic, Borové, Samopše, Zbořeného Kostelce.

Abies alba M i l l.: pěkné staré exempláře na Maní hoře u Ledečka, Vrážském kopci u Chocerad, v Okrouhelském revíru.

Juniperus communis L. subsp. *eucommunis* B r i q.: skalnaté svahy u Sázavy města, Jílového, v Okrouhelském revíru, vápencová skála u Borové, ojediněle i v borech a dubinách.

Actaea spicata L.: sestupuje údolím Sázavy až téměř k ústí, les Šrámota u Vestce, Okrouhelský revír, sev. od Prosečnice.

Consolida segetum G r a y subsp. *arvensis* S o ó: v dolní části asi po Lešany; polní plevel u Lešan a Samopše.

Myosurus minimus L.: pole u tratě a u silnice Týnec — Zbořený Kostelec.

Ranunculus arvensis L.: jako polní plevel v okolí Davle, Pikovic, Zbořeného Kostelce a Samechova.

Ranunculus lanuginosus L.: vlhká smrčina v Okrouhelském revíru, nad Zahořanským potokem.

Adonis aestivalis L.: polní plevel u Davle, Luk pod Medníkem, Týnce nad Sázavou.

Papaver dubium subsp. *turbinatum* (DC.) D o s t.: plevel, řídce u Davle, Jílového a Zbořeného Kostelce.

Papaver argemone L.: polní plevel, u cest, na mezích a potahových cestách, řídce v okolí Davle, Petrova a Samopše.

Lepidium campestre R. B r.: skály u Sázavy města.

Lepidium densiflorum S c h r a d.: potahová cesta u Davle.

Thlaspi alpestre L. subsp. *silvestre* (J o r d.) G i l l. et M a g n e: skála v okolí Borové a Ledečka.

Thlaspi perfoliatum L.: vápencová skála u Stříbrné Skalice.

Alyssum saxatile L. subsp. *arduinii* H a y.: skála Sekanka u ústí Sázavy, Davidka u Sázavy města, silikátové skály mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem, u Stříbrné Skalice.

Alyssum montanum L. subsp. *eumontanum* (B a u m g.) T h e i l.: skály mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem.

Alyssum calycinum L.: na výslunných skalách vých. od Davle, u Přívlak, Čapík u Stříbrné Skalice, vzácně a ojediněle jako plevel u Petrovic a Sázavy města.

Berteroa incana D c.: na výslunných místech u cest, na návších, potahových cestách a úhorech u Davle, Pikovic, Petrova, Hradištka.

- Dentaria bulbifera* L.: bukové lesy na Medníku, v Hornopožárském revíru, na Spáleném vrchu u Dojetřic.
- Cardamine amara* L.: luční bažina u Lešan, břeh Sázavy u Sázavy města, vlhké břehy Křešického, Vodslivského, Čakovického potoka, u ústí Blanice, Mnichovska u Senohrab, na Medníku a u Luk pod Medníkem.
- Cardaminopsis arenosa* H a y e k.: v celé oblasti hlavně na skalách, méně v lesích, tak u Pikovic, Borové, Ledečka, Stříbrné Skalice, Přívlak, Samechova, Sázavy města, Prosečnice, Č. Šternberka.
- Arabis alpina* L.: zplanělý na skále na levém břehu Sázavy proti Lukám pod Medníkem a násep tratě mezi Hradištěm a Zlenicemi sev. od Čerčan.
- Turritis glabra* L.: roste u cest, v lesích, hlavně ale na skalách na Medníku, u Samechova, Mrače, Stříbrné Skalice a Sázavy města.
- Erysimum hieracifolium* J u s l.: z dolního Povltaví; skály u ústí Sázavy.
- Camelina microcarpa* A n d r.: plevel, u cest a na stránkách asi po Samopše, roztroušeně.
- Reseda lutea* L.: ruderalní a plevelová rostlina u Davle, Petrova, Prosečnice, Týnce nad Sáz., Čerčan.
- Reseda luteola* L.: vzácně u Pikovic a Lešan na kamenitých úhorech.
- Helianthemum nummularium* Mill. subsp. *ovatum* S c h. Th.: na výslunných kamenitých úhorech a stránkách u Lešan, Mrače, Čerčan, Kamenného Přívozu.
- Viola mirabilis* L.: v lesích u Poříčí nad Sáz., Ledečka, Sázavy, Dojetřic, skály u Č. Šternberka.
- Viola canina* L. subsp. *eucanina* B r. - B l.: v křovinách u cest a na okrajích lesů v okolí Luk pod Medníkem, Čakovice, Stříbrné Skalice, Vráže a Drahňovic.
- Viola hirta* L.: suché světlé lesy u Nespek, Ledečka, Lutov u Poříčí nad Sáz., Davidka u Sázavy města, Okrouhelský revír.
- Arenaria serpyllifolia* L. subsp. *leptocladus* O b o r n y: na mezích a u cest na stránkách v dolní části asi po Zbořený Kostelec.
- Stellaria holostea* L.: listnaté lesy na Medníku, sev. od Pikovic, již. od Samopše, břehy Mnichovky.
- Scleranthus annuus* L. subsp. *eu-annuus* Th e l l.: plevel v obilí, výslunná a skalnatá místa v okolí Větrova, Poddubí, Chocerad, Zbořeného Kostece, Týnce.
- Viscaria vulgaris* B e r n h.: v lesích, hlavně listnatých, sev. a již. od Ledečka, již. od Stříbrné Skalice, vých. od Sázavy města, sev. od Pikovic, na Medníku, Zahořanské údolí, V zahrádkách veselezáp. od Luk pod Medníkem, Ďábel u Petrova, skály u Luk, Hradištka, Samopše, Iváně, Přívlak.
- Gypsophila muralis* L.: suché okraje cest podél Sázavy u Krhanic, Poříčí, Chocerad, Ledečka, většinou ojedinele, na písčité na břehu řeky sev. od Č. Šternberka ve velkém množství.
- Tunica prolifera* S c o p. subsp. *euprolifera* A s c h. G r.: na výslunných skalách u Stříbrné Skalice (Čapík), úhor u Hradištka, skály u okolí Přívlak.
- Amaranthus retroflexus* L.: náves v Ledečku, Čerčanech, Davli.
- Chenopodium rubrum* L.: bývalý rybník u Filipova mlýna již. od Č. Šternberka.
- Chenopodium bonus-henricus* L.: na návších, hlavně u zdí, v celé oblasti.
- Atriplex nitens* S c h k u h r.: násep trati u Ledečka, v Lukách pod Medníkem, břeh potoka u Žampachu.
- Atriplex rosea* L.: v Ledečku u trati před nádražím a na návsi u řeky.
- Atriplex oblongifolia* L.: náves v Samopši, potahová cesta před Pikovicemi, hojná v Čerčanech.
- Rumex maritimus* L.: bývalý rybník u Filipova mlýna již. od Č. Šternberka.
- Urtica urens* L.: ruderalní druh, nejčastější na návších a u zdí, v celé oblasti Davle—Č. Šternberk.
- Sedum rupestre* L.: v dolní části asi po Zbořený Kostelec; skála u okolí Pikovic, V zahrádkách severozáp. od Luk pod Medníkem, Kamenného Přívozu, Prosečnice, Týnce, Zbořeného Kostece, Hradištka, na Medníku, výše méně hojný: u Drahňovic, Sázavy města, Dubská a Nespek.
- Sedum album* L.: hlavně na skalách (iniciální stadia), též na náspech; Luka pod Medníkem, Pikovice, Přívlaky, Davidka u Stříbrné Skalice, Samopše, Zbořený Kostelec, Sázava město, Ledečko, Sekanka u ústí, Medník, Č. Šternberk. — Forma bělokvětá i růžovokvětá rostou společně v celé oblasti v poměru asi 2 : 1.
- Sedum sexangulare* L. subsp. *boloniense* F e n z l.: na skalách a na ssuti u Petrova (Ďábel), Samopše, nad Čakovickým potokem, v okolí Č. Šternberka.
- Sempervivum soboliferum* S i m s.: vzácně na skalách u Zbořeného Kostece.
- Ribes alpinum* L.: světlé lesy a keřnaté stráně na Medníku a u Luk pod Medníkem.
- Aruncus vulgaris* R o f i n.: sestupuje od horských potoků podél Vltavy a Sázavy až k ústí; Sekanka u ústí, Okrouhelský revír, smrčiny (podél potoků nejčastější) vých. od Čerčan, u Vodslivského potoka.

- Filipendula hexapetala* Gilib.: na suchých výslunných místech, hlavně na vápenné půdě; pastviny u Podlešan, keřnaté stráně u Č. Šternberka, Kamenného Přívozu, Netvořic, Přestavlk, Peceraď, Leděčka, Sázavy města, Samechova, Žampachu, nad Blanicí a Vlkančickým potokem.
- Rubus suberectus* Anders.: vyhybá se váp. půdě; v lesním podrostu a hojně na okraji lesů v Okrouhelském revíru.
- Rubus tomentosus* Borkh.: kamenité stráně a skály mezi Pikovicemi a Lukami, u Petrova a V zahrádkách severozáp. od Luk.
- Rubus discolor* W. Nees.: dubina V zahrádkách severozáp. od Luk.
- Potentilla canescens* Bess.: hojná na výslunných místech v okolí Drahňovic severozáp. od Č. Šternberka, ojedinele na Medníku.
- Potentilla recta* L.: skalnatá místa v okolí Pikovic a Luk.
- Agrimonia eupatoria* L. subsp. *officinalis* Gam s.: pastviny u Podlešan a Lešan, kamenité výslunné stráně u Zbořeného Kostelce.
- Sanguisorba minor* Scop. subsp. *dictyocarpa* Gam s.: výslunná skalnatá místa v okolí Luk, Pikovic, Samopše, Přívlak, Leděčka, Sázavy města, Zbořeného Kostelce, Obory.
- Aphanes arvensis* L.: hojnější na úhorech a okrajích polí u Lešan, Krhanic a Týnce, jinde ojedinele.
- Rosa tomentosa* Sm.: výslunné strážky u Svárova, Čerčan a Č. Šternberka.
- Cotoneaster integerrima* Medik.: výslunné skály Sekanky u ústí, mezi Petrovem a Pikovicemi a V zahrádkách severozáp. od Luk.
- Pirus communis* L. subsp. *piraster* Hegi.: výslunná skalnatá místa na Medníku, nad Posázavskou stezkou a V zahrádkách severozáp. od Luk pod Medníkem.
- Sorbus torminalis* L.: keřnaté stráně mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem, dubina V zahrádkách a nad Čakovickým potokem.
- Sorbus aria* (L.) Cr.: výslunná váp. stráž V zahrádkách, mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem, Medník a Malý Medník.
- Malus silvestris* Mill. subsp. *acerba* Mansf.: Carpinetum na Medníku.
- Sarothamnus scoparius* Wimm. et Koch.: na keřnatých stráních, skalách a v borech jižně od Mrače, v okolí Čerčan, Samopše a Leděčka.
- Cytisus nigricans* L.: na suchých stránkách a skalách v okolí Luk, Pikovic, Leděčka, Č. Šternberka, Přívlak, Krhanic, Sázavy města, Drahňovic, Dojetřic, vzácněji v podrostu listnatých lesů u Dubska, v Zahořanském údolí, v dubině V zahrádkách, a j.
- Medicago minima* Grufb.: úhor u Leděčka, Nespek a keřnaté stráně u Zbořeného Kostelce.
- Trifolium campestre* Schreb.: na stránkách a úhorech u Lešan, Mrače, Čerčan, Leděčka, keřnaté stráně u Zbořeného Kostelce a na Malém Medníku.
- Trifolium strepens* Cr.: velmi hojný v dubině V zahrádkách.
- Trifolium montanum* L.: dosti hojný v boru již. od Zbořeného Kostelce.
- Vicia dumetorum* L.: houštiny na Medníku, Sekanka u ústí, ústí Blаницe, dubina V zahrádkách.
- Vicia silvatica* L.: vlhká bučina na Medníku, na Maní hoře u Leděčka, les mezi Samechovem a Vestcem a u Chocerad.
- Vicia lathyroides* L.: teplomilný prvek na pastvinách, úhorech, v celé oblasti roztroušeně.
- Vicia sepium* L.: na různých stanovištích kromě lesů, v okolí Čakovice, Týnce, Chocerad, Leděčka, Mrače, Samechova, Zbořeného Kostelce, Čerčan, na Medníku, v Zahořanském údolí, Okrouhelském revíru.
- Vicia tetrasperma* Schreb.: teplomilný element na suchých stránkách a úhorech v okolí Čerčan, Nespek, Hradištka, Kamenného Přívozu, Samopše, Lešan, Chocerad, Dubska, Leděčka, dubina V zahrádkách a na Medníku.
- Lathyrus silvestris* L. subsp. *platyphyllus* (Retz.) Dostál.: světlé lesy vých. od Stříbrné Skalice, sev. a již. od Leděčka, mezi Samechovem a Vestcem, skály již. od Č. Šternberka a u Vodslivského potoka.
- Lathyrus vernus* Bernh.: humosní les na Medníku, Maní hoře u Leděčka, Šrámota vých. od Vestce, Iván u Č. Šternberka.
- Lathyrus niger* Bernh.: světlá bučina na Medníku, sev. od Prosečnice, dubina V zahrádkách a Carpinetum sev. od Luk.
- Carpinus betulus* L.: tvoří Carpineta, podrost dubin a borů; v celé oblasti, v dolní části však hojnější.
- Corylus avellana* L.: teplomilná křovina, iniciační stadia, keřnaté stráně, na skalách, ssutích, podrost u Carpinetu, dubinách, zřídka v ostatních lesích; v celé oblasti.
- Quercus robur* L. em. Simek.: dubiny V zahrádkách u Luk, Hradečnice u Zbořeného Kostelce, sev. od Leděčka, Komorní Hrádek u Čerčan, již. od Mrače, na Medníku, mezi Pikovicemi a Petrovem, v Zahořanském údolí, Záušní les u Dubska, Lutov u Poříčí, sev. od Prosečnice, u Hvězdonic; jako příměs i v ostatních porostech.

- Quercus petraea* L i e b l.: dubina nad Mnichovkou u Senohrab, u Stříbrné Skalice, na Medníku, sev. od Luk, u Nespek, V zahrádkách, Šrámta u Vestce, Okrouhelský revír, mezi Ledečkem a Talmberkem, často společně s předcházejícím. Také jako příměs v ostatních porostech.
- Quercus rosacea* B e c h s. = *Q. petraea* × *Q. robur*: řídce; Sekanka u ústí, Medník, dubina V zahrádkách.
- Salix fragilis* L.: břeh Vodslivského, Čakovického a Křešického potoka, ojediněle břehy Sázavy.
- Salix repens* L. subsp. *eurepens* S e e m.: břeh Svárovského rybníka již. od Nespek.
- Salix purpurea* L.: rybník u Podlešan.
- Geranium sanguineum* L.: výslunné stráně a skály vých. od Davle, Čapík u Stříbrné Skalice, Zbořený Kostelec, nad Mnichovkou, okolí Č. Šternberka, Přestavlk, Iváně, Samechova, louka podél Čakovického potoka, dubina V zahrádkách.
- Geranium pyrenaicum* L.: zdivočelý na břehu Sázavy u Přívlak.
- Mercurialis annua* L.: jako plevel v poli u Větrova, Týnce nad S. a Čerčan.
- Mercurialis perennis* L.: v humosních bučinách na Spáleném vrchu u Dojetřic, na Maní hoře u Ledečka, na Medníku a na Malém Medníku.
- Euphorbia exigua* L.: plevel v poli sev. od Větrova a severových. od Týnce nad Sázavou.
- Euonymus europaea* L.: hojnější v dolní části, dále řídce; v humosních lesích Jestřábu u Sázavy města, v okolí Luk pod Medníkem, u Ledečka, Iváně, na Medníku, nad Posázavskou stezkou.
- Impatiens parviflora* D e.: doprovází lidskou činnost v lesích (smřiny), i na jiných stanovištích; roztroušeně u Pikovic, Samechova, Sázavy města, Stříbrné Skalice, Poříčí, na Medníku a jinde.
- Acer pseudoplatanus* L.: ssutový les na Spáleném vrchu u Dojetřic, Komorní Hrádek, Šrámta u Vestce, již. od Chocerad, Okrouhelský revír vých. od Jílového, Malý Medník, v zahrádkách, alej podél cesty Komorní Hrádek—Bělčice, v Zádušním lese sev. od Dubska, u Mrače.
- Acer platanoides* L.: pozorován jen v oboích ve stromoradiích a na návších.
- Acer campestre* L. subsp. *hebecarpum* D e.: výslunné stráně a skály na Medníku a sev. a vých. od Pikovic.
- Rhamnus cathartica* L.: na výslunných kamenitých a křovinatých stráních na Medníku.
- Tilia cordata* M i l l.: jako součást listnatých lesů a keřnatých stráni nad Blanicí, Mnichovkou (Senohraby), sev. od Pikovic a Luk pod Medníkem, vysazována i do stromoradií, na př. Komorní Hrádek—Bělčice, v Okrouhelském revíru a j.
- Tilia platyphyllos* S c o p. subsp. *euplatyphyllos* C. K. S c h n.: příměs stinných lesů nad Blanicí, na Maní hoře u Ledečka, na Medníku, vysazována ve stromoradiích, na př. Zádušní les u Dubska.
- Malva alcea* L.: na keřnatých výslunných stráních a na potahových cestách zcela ojediněle asi po Sázavu město.
- Hypericum humifusum* L.: pastviny u Lešan a Podlešan, břeh rybníka u Lešan, prosvětlený les Radličniku mezi Drahovicemi a Bělokozlami.
- Hypericum montanum* L.: humosní světlé lesy, hlavně listnaté; Lutov u Poříčí, Borová u Ledečka, Medník, Malý Medník, nad Posázavskou stezkou, Maní hora u Ledečka, V zahrádkách, Jestřáb u Sázavy města, podél Vodslivského potoka, vých. od Iváně, u Hvězdonic, Pikovic, mezi Samechovem a Stříbrnou Skalicí, již. od Dubska, v okolí Luk pod Medníkem, Krhanic.
- Oenothera biennis* L.: hojnější u Nového Dvora, Samopše, Sázavy města, roztroušeně i jinde u cest, na březích Sázavy a na potahových cestách.
- Circaea lutetiana* L.: bučina na Spáleném vrchu u Dojetřic, ve velkém množství.
- Sanicula europaea* L.: humosní les mezi Dubským hradem a Poddubím.
- Eryngium campestre* L.: hojná u Davle, Petrova, Pikovic, Jílového, Prosečnice, Pyšel, Zbořeného Kostelce, výše jenom ojediněle; na výslunných místech u cest, na mezích a stráňkách.
- Bupleurum falcatum* L. subsp. *eufalcatum* W o l f.: na výslunných skalách u Přívlak, vých. od Davle, sev. od Pikovic, v okolí Luk, Samopše, Medník, Malý Medník, nad Posázavskou stezkou.
- Fulcaria vulgaris* B e r n h.: skály vých. od Davle, u Luk, Pikovic, Prosečnice, Týnce, Pyšel, Senohrab, dosti hojně, jinak v celém území porůznu, často hromadně napadena rzí.
- Seseli osseum* C r. subsp. *devenyense* T h e l l.: výslunné skály nad Posázavskou stezkou, na Medníku, v okolí Pikovic a Luk nad řekou, Čapík u Stříbrné Skalice, pak až nad tunelem u Ledečka, výše nepozorován.
- Peucedanum oreoselinum* M o e n c h.: na výslunných místech, úhor u Ledečka, u Borové, bor již. od Čerčan.
- Peucedanum cervaria* L e p e y r.: keřnaté stráně V zahrádkách, skalnaté svahy nad Sázavou proti Medníku.

- Torilis arvensis* Link. subsp. *divaricata* Thell.: kamenitá stráň nad Sázavou vých. od Davle.
- Chaerophyllum aromaticum* L.: roztroušeně po pobřeží Sázavy v okolí Sázavy města.
- Chaerophyllum hirsutum* L.: křovinné porosty na březích Čakovického (v lese), Vodslivského a Křešického potoka.
- Cornus mas* L.: lesostepní stráně na Medníku a na Maní hoře jihozáp. od Leděčka.
- Primula veris* L.: roztroušeně v lesích a u cest nad Blanicí, v okolí Chocerad, u Vodslivského potoka.
- Anagallis arvensis* L. subsp. *phoenicea* Sch. Kell.: plevel v obilí u Větrova, Týnce, Lešan.
- Ligustrum vulgare* L.: výslunné stráně a Carpineta v oblasti Pikovice—Luka, Medník, Malý Medník, dubina V zahrádkách.
- Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers.: teplomilný prvek, rostoucí hlavně na výslunných skalách až po Č. Šternberk; Jestřáb u Sázavy města, V zahrádkách, Medník a Malý Medník, Sekanka u ústí, okolí Jílového, skály nad řekou u Luk, Pikovic, Samechova, Přívlak, Stříbrné Skalice, Leděčka, Č. Šternberka, nad Čakovickým potokem.
- Cynoglossum officinale* L.: výslunné kamenité úhory u Obory a Chocerad.
- Lithospermum arvense* L.: vesměs jako plevel v polích, hojnější v dolní části; sev. od Pikovic, Jílové, Větrova, Týnce, Zbořený Kostelec, výše u Sázavy města.
- Lycopsis arvensis* L. subsp. *occidentalis* K u s n e z.: na suchých výslunných stránkách a v obilí jako plevel v okolí Nového Dvora, Samopše a Krhanic.
- Pulmonaria officinalis* L. (obě subsp.): humósní lesy (hlavně listnaté) na Medníku a Malém Medníku, Maní hoře u Leděčka, Šrámota u Vestce, Zahořanské údolí, lesy v okolí Hradištka a Leděčka.
- Verbena officinalis* L.: v celé oblasti až po Č. Šternberk roztroušeně, u cest, na náběhích často hromadně, na př. v Hradištku.
- Melittis melissophyllum* L.: pouze Carpinetum na Medníku.
- Galeopsis pubescens* Bess.: na různých stanovištích v celé oblasti obecná.
- Galeopsis speciosa* Mill.: v listnatých lesích na Medníku, u Iváně, mezi Samechovem a Vestcem, vých. od Davle, u Žampachu, na březích (křovinné porosty) Vodslivského, Čakovického a Křešického potoka.
- Lamium amplexicaule* L.: plevel v obilí mezi Týncem a Zbořeným Kostelcem a v okolí Krhanic.
- Stachys recta* L. subsp. *eurecta* M a l y : na výslunných skalách a ssutích v okolí Pikovic, Přívlak, Samopše, v Zahořanském údolí, Sekanka u ústí, Čapík již. od Stříbrné Skalice.
- Stachys annua* L.: plevel v bramborovém poli u cesty sev. od Týnce nad Sázavou, sev. od Větrova.
- Salvia pratensis* L. subsp. *vulgaris* (Rchb.) Briq.: roztroušeně na úhoru u Leděčka.
- Calamintha clinopodium* Moris.: hlavně na skalnatých výslunných místech; u Davle, Pikovic, Samopše, Přívlak, Lukova, Petrova, Stříbrné Skalice, Leděčka, Sázavy města, Poříčí, Iváně, Č. Šternberka, na Medníku; celkem dosti hojná.
- Calamintha acinos* (L.) Clairv.: na podobných místech jako předcházející; Čapík u Stříbrné Skalice, Borová u Leděčka, Jestřáb u Sázavy města, Sekanka u ústí, V zahrádkách vých. od Davle, Davidka severozáp. od Sázavy města, skály v okolí Pikovic, Přívlak, Mrače, Č. Šternberka; většinou společně s *C. clinopodium*.
- Origanum vulgare* L.: na výslunných skalách a v lesostepních porostech; Čapík již. od Stříbrné Skalice, Davidka vých. od Stříbrné Skalice, u Přívlak, Pikovic, Zbořeného Kostelce, Luk, Davle, Leděčka, Petrova, nad Posázavskou stezkou, na Medníku, v okolí Sázavy města.
- Thymus glabrescens* Willd.: na výslunných místech, nejčastěji na výhřevných skalách; mezi Kamenným Přívozem a Netvořicemi hojná na žule; okolí Nového Dvora, Samopše, Přívlak, Zbořeného Kostelce, Komorního Hrádku, Hvězdonic a Č. Šternberka.
- Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl. et Mansf.: kamenitý břeh Sázavy proti Vraníku jihozáp. od Samopše, záp. od Leděčka.
- Verbascum phlomoides* L.: výslunné kamenité stráně mezi Zbořeným Kostelcem a Nespekami.
- Verbascum spurium* Koch.: vzácně na skalách u Petrova a Luk.
- Chaenorhinum minus* (L.) Lange.: kamenitá stráň vých. od Davle, Čapík již. od Stříbrné Skalice.
- Veronica triphyllos* L.: v obilném poli a na úhorech mezi Týncem a Zbořeným Kostelcem.
- Veronica prostrata* L.: výslunné stráně mezi Poříčím a Čerčany.
- Veronica persica* Poir.: vzácně na okraji polí a na stránkách u polí sev. od Pikovic, již. od Pyšel a v okolí Stříbrné Skalice.
- Veronica teucrium* L. subsp. *pseudochamaedrys* Ny m.: na výslunných místech v vlastním údolí Sázavy u Třebšína, Pyšel, Vestce a Stříbrné Skalice.
- Digitalis grandiflora* Mill.: světlé listnaté lesy; Hornopožárský revír sev. od Prosečnice, vých. od Stříbrné Skalice, v okolí Leděčka, Iváně, na Medníku, na Maní hoře u Leděčka, nad Blanicí u Čejkovic.

- Melampyrum cristatum* L.: Carpinetum na Medníku, dubina sev. od Přívlak.
- Euphrasia nemorosa* Pers.: pastviny u Lešan, úhor vých. od Davle, záp. od Ledečka a záp. od Č. Šternberka.
- Asperula odorata* L.: podrost hojný v bučinách na Spáleném vrchu u Dojetří, na Medníku, Komorní Hrádek již. od Hvězdonic, Šrámota u Vestce, sev. a již. od Chocerad.
- Asperula glauca* (L.) Bess.: skála Sekanka u ústí, kamenité svahy nad Sázavou mezi Davlí a Pikovicemi.
- Asperula cynanchica* L. subsp. *eucynanchica* Béguin.: na stepních stráních a výslunných skalách; Sekanka u ústí, Davidka u Stříbrné Skalice, v okolí Petrova, Pikovic a Luk, žulový lom u Mrače.
- Galium cruciata* (L.) Scop.: na vlhkých březích potoků Čakovického, Vodslivského, Vlkanečického, Blance, Mnichovky, vlhké louky u Žampachu a Pecerad.
- Galium silvaticum* L.: v listnatých lesích, hlavně Carpineta, vlhké zarostlé břehy potoků; Medník, nad Posázavskou stezkou, Jestřáb vých. od Sázavy města, Maní hora jihozáp. od Ledečka, V zahrádkách, Zahořanské údolí, u Blance, Čakovického potoka, Vodslivského potoka, sev. od Luk, u Iváně.
- Sambucus racemosa* L.: ve stinných lesích, nejčastěji ve smrčínách; u Nespek, Ledečka, Iváně, Luk, Komorní Hrádek u Dojetří, Spálený vrch již. od Sázavy města, Koláč u Kamenného Přívozu, Okrouhelský revír a Zahořanské údolí.
- Lonicera xylosteum* L.: bučina na Medníku, u Komorního Hrádku, dubina nad Posázavskou stezkou, v Zahořanském údolí, sev. od Luk, smrčina v Okrouhelském revíru, u Iváně a u Hvězdonic.
- Valerianella ramosa* Batsl.: kamenité stráně u Zbořeného Kostelce, u ústí Čakovického potoka, v Zahořanském údolí, úhor u Obory.
- Scabiosa ochroleuca* L.: na výslunných stráních a na skalách v okolí Luk, Davle, Přívlak, Samopše, Byliny, Mrače, Čerčan, Č. Šternberka.
- Campanula glomerata* L.: kamenitá stráň V zahrádkách.
- Campanula persicifolia* L.: roztroušeně ve světlých lesích na Maní hoře u Ledečka, V zahrádkách, Okrouhelském revíru, mezi Samechovem a Vestcem, mezi Stříbrnou Skalí a Samechovem, u Blance (Čejkovic), Mnichovky (Senohraby), již. od Sázavy města, u Ledečka, Iváně.
- Phytolacca spicata* L.: roztroušeně v listnatých lesích na Spáleném vrchu u Dojetří, vých. od Lštění, vých. od Čerčan.
- Crepis paludosa* (L.) Moench.: vlhká louka vých. od Č. Šternberka, již. od Soběšína a u Malovid.
- Crepis setosa* Hall. F.: výslunné úhory u Hradištka a Davle.
- Hieracium pallidum* Biv. subsp. *bivonae* Zahner.: skála Sekanka u ústí, výslunné skály mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami.
- Hieracium sabaudum* L. subsp. *autumnale* Zahner.: Carpinetum na Medníku a vých. od Pikovic, smrčina mezi Vestcem a Samechovem.
- Lactuca serriola* (L.) Torner.: výslunné skály Čapík u Stříbrné Skalice, Davidka, vých. od Pikovic, v okolí Mrače, Čerčan, Sázavy města; také ojediněle na návších v Davlí, Čerčanech (tam velmi hojná u cest a plotů).
- Lactuca viminea* (L.) Presl.: skály vých. od Davle, u Petrova, Pikovic, Luk, u Přívlak, Čapík u Stříbrné Skalice.
- Prenanthes purpurea* L.: bučina na Spáleném vrchu, na Medníku, ssutový les u Komorního Hrádku, smrčiny v okolí Dubska, Samechova a Vestce.
- Hypochoeris glabra* L.: na suchých místech, hlavně u cest a na stránkách u Davle, Hvězdonic, Zbořeného Kostelce, Kamenného Přívozu, Samopše, Davidka u Stříbrné Skalice, Komorní Hrádek, hojně na březích Vlkanečického potoka.
- Scorzonera hispanica* L.: zplaněle ve vlhké smrčíně v Okrouhelském revíru.
- Filago germanica* L.: vesměs na úhorech; u Hradištka, Lešan, Luk a pod Medníkem.
- Antennaria dioica* (L.) Gaertn.: roztroušeně v dubinách, vyhýbá se vápenci; V zahrádkách, Zahořanské údolí, Dábel u Petrova, Hornopožárský revír, Koláč u Kamenného Přívozu, sev. od Zbořeného Kostelce, okolí Prosečnice a Ledečka, již. od Sázavy města.
- Inula conyzifolia* Dc.: na okrajích lesů a na lesních světlinách na Medníku, V zahrádkách, mezi Lukami a Pikovicemi, u Borové a Sázavy města.
- Bidens tripartita* L.: břehy Sázavy proti Žampachu, břeh rybníka u Podlešan.
- Bidens radiatus* Thunberg.: bývalý rybník u Filipova mlýna již. od Č. Šternberka, náves ve Vranově u Čerčan.
- Bidens frondosa* L.: šíří se údolím Labe, Vltavy a Sázavy; břehy Sázavy u Davle, Petrova, Luk, Jílového, nejdále pozorován u Žampachu.
- Bidens cernus* L.: rybník u Podlešan, Lešan, břeh Sázavy u Žampachu.
- Galinsoga parviflora* Cav.: v Ledečku u cesty.

- Tagetes erectus* L.: zplanělý na potahové cestě u Davle.
- Anthemis tinctoria* L.: na výslunných úhorech a stráňkách u cest, často hromadně; okolí Davle, Petrova, Pikovic, Leděčka, na Medníku, nad Blanicí u cesty na Čejkovice.
- Anthemis austriaca* J a c q.: na výslunných úhorech a skalách mezi Oborou a Choceřady, Čapík u Stříbrné Skalice, Dubsko, okolí Sázavy města.
- Matricaria discoides* D c.: na potahových cestách u Sázavy, na mezích, většinou však na návších v Davli, Petrově, Pikovicích, Prosečnici, u Žampachu.
- Chrysanthemum corymbosum* L. subsp. *typicum* D o s t á l: v listnatých lesích, hlavně habrových a dubových na Medníku, V zahrádkách, v Záušním lese u Dubska, nad Blanicí, Mnichovku, v okolí Stříbrné Skalice, Leděčka, Sázavy města, Komorního Hrádku, Hvězdonic, Samechova, Pikovic.
- Artemisia absinthium* L.: na váp. půdách, druh nitrofilní, u cest, na návších a u obydlí; Davle, Petrov, Pikovice, Luka, V zahrádkách (na prosvětlených místech), Hradištko, Leděčko.
- Artemisia campestris* L. subsp. *eucaempstris* B r i q. et C a v.: skály vých. od Davle, kamenité stráně nad řekou u Pikovic, Davle, Petrova, na Medníku, v okolí Zbořeného Kostelce.
- Senecio nemorensis* L. subsp. *Fuchsii* (G m e l.) D u r.: sestupuje s hornatých krajin do nížin; Medník, Maní hora u Leděčka, Záušní les u Dubska, Šrámta u Vestce, Spálený vrch u Dojetřic, Jestřáb u Sázavy, Zahořanské údolí, Komorní Hrádek, Radličník u Drahnovic, nad Blanicí, vých. od Luk, mezi Talmberkem a Leděčkem, v okolí Hvězdonic, Sázavy města, Samechova, Vestce, dosti rozšířen ve smrčínách, méně v ostatních porostech.
- Arctium tomentosum* M i l l.: na březích Sázavy u Žampachu.
- Carduus nutans* L. subsp. *eunutans* G u g l.: hojný na pastvinách u Lešan a Podlešan.
- Carduus acanthoides* L.: na úhorech a u cest; Davle, Hradištko, Lešany, nad Posázavskou stezkou, Luka, Přívlaky, Mrače, Sázava město, Leděčko.
- Carduus orthocephalus* W a l l r. (*C. acanthoides* × *C. nutans*): pastviny u Lešan a vých. od Prosečnice.
- Serratula tinctoria* L. subsp. *eutinctoria* B r. - B l.: výslunné lesní světliny a okraje lesů na Medníku a V zahrádkách.
- Centauria stoebe* (L.) S c h. - T h e l l. subsp. *rhenana* (B o r.) G u g l.: na výslunných skalách, stepních stráňkách; Čapík u Stříbrné Skalice, skály u Luk, Přívlak, Petrova, Pikovic, Zbořeného Kostelce, Davle, v Zahořanském údolí, pastviny u Podlešan, Šamopše a Nespek, okolí Č. Šternberka, Mrače, dubina V zahrádkách.
- Centauria jacea* L. subsp. *angustifolia* (S c h r a n k.) G u g l.: na výslunných místech u Davle, Mrače, Kamenného Přívozu, Leděčka, Šamopše, dubina V zahrádkách, pastviny u Lešan a Podlešan.
- Echinops sphaerocephalus* L.: ojediněle na břehu Sázavy u Sázavy města a u Č. Šternberka.
- Butomus umbellatus* L.: okraj meandru Sázavy u Přívlak.
- Potamogeton lucens* L.: rybník u Podlešan.
- Anthericum liliago* L.: skály mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami, váp. skála u Přívlak, nad Posázavskou stezkou, dubina nad řekou proti nádraží v Leděčku, dubina V zahrádkách.
- Allium montanum* S c h m i d t. subsp. *petraeum* (L a m. sp.): výslunné skály mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami, sev. od Sázavy města, váp. skály u Přívlak a sev. od Č. Šternberka, Davidka u Stříbrné Skalice.
- Lilium martagon* L.: keřnaté stráně na Medníku a na Malém Medníku.
- Erythronium dens-canis* L.: známá lokalita na Medníku.
- Asparagus officinalis* L.: skála v ohybu Sázavy vých. od Luk, dubina V zahrádkách.
- Polygonatum odoratum* (M i l l.) D r u c e: skály nad Sázavou u Pikovic a u Leděčka, keřnaté stráně na Malém Medníku, Šrámta u Vestce.
- Convallaria majalis* L.: roztroušen v bučinách na Medníku a na Malém Medníku, v Okrouhelském revíru a Hornopožárských lesích.
- Juncus inflexus* L.: rybník u Podlešan.
- Juncus conglomeratus* L.: mimo teplé oblasti, kromě nejdolejší části všude; vlhké louky a bažiny u Č. Šternberka, Šternova, Křešic, Bělokozyl u Leděčka, Přestavlk, Sázavy města, v dolní části jen u Kamenného Přívozu.
- Juncus macer* S. F. G r a y: vyhýbá se teplým oblastem a vápenci; v řece vých. od Davle, lesní cesta již. od Dubé, okolí Čerčan.
- Luzula luzuloides* D. C.: les Tůmovka vých. od Č. Šternberka, lesy v okolí Poddubí, Čerčan, Mrače, Peceraď, Poříčí, Byliny, Koláč u Kamenného Přívozu, Okrouhelský revír, u potoka Čakovického, Vodslivského a Křešického.
- Luzula albidula* W i l d.: hojná v lesích, hlavně v borech a ve smrčínách, v celé oblasti.
- Carex brizoides* L.: břehy Vodslivského, Čakovického a Křešického potoka, ojediněle na př. i na vlhkých násepch, obrácených k severu, před tunelem u Leděčka, u Iváně a j.

- Carex remota* L.: břehy Čakovického a Křešického potoka, malá rašelinka na břehu Vodslivského potoka již. od Dojetříe.
- Carex humilis* L. e y s s.: úhor před nádražím v Ledečku, skála nad řekou proti Medníku, Zbořený Kostelec (jižní svahy Hradečnice), skály mezi Lukami a Pikovicemi.
- Carex digitata* L.: ve stinných lesích u potoků na Medníku a vých. od Hradištka.
- Festuca valesiaca* S c h l e i c h.: na skalách, stráních, v borech; skály mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami, u Zbořeného Kostelce, Čerčan, Mrače, Samopše, Sázavy města, Č. Šternberka, nad Posázavskou stezkou, Koláč u Lešan, Čapík u Stříbrné Skalice, mezi Ledečkem a Přívlaky.
- Festuca duriuscula* L.: na skalách (vápencových) mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami, Sekanka u ústí, Davidka u Stříbrné Skalice, sev. od Sázavy města a Zbořený Kostelec.
- Glyceria aquatica* (L.) W a h l b.: okraj řeky u Davle, Žampachu, Samechova, Zbořeného Kostelce, Zlenic u Čerčan, Ledečko, Č. Šternberk, břehy Blanice.
- Melica transilvanica* S c h u r.: výslunné skály, úhory; Čapík u Stříbrné Skalice, Sekanka u ústí, Davidka u Stříbrné Skalice, skály mezi Petrovem a Pikovicemi, u Chocerad, Samopše, Přívlak, Sázavy města, Samechova; odtud sestupuje někdy až na okraje cest a osazuje hromady šterku.
- Melica nutans* L.: v listnatých lesích (v jehličnatých ojediněle jako zbytek); Medník, Spálený vrch u Dojetříe, Komorní Hrádek u Hvězdonic, Maní hora u Ledečka, Jestřáb u Sázavy města, smrčina u Iváně a u Ledečka, křovinné porosty na březích Vodslivského, Čakovického a Křešického potoka.
- Hordeum murinum* L. subsp. *eumurinum* H a y.: náves u cesty v Ledečku, poblíž řeky.
- Bromus erectus* H u d s.: roztroušeně u cest, na náspech, na návších a v obilí v okolí Hradištka, Lešan a Pecerad.
- Holcus mollis* L.: smrčina u Iváně.
- Calamagrostis arundinacea* (L.) R o t h.: výslunná skála u Mrače, křovinaté stráně u Luk, Přívlak, Ledečka, Sázavy města, Č. Šternberka, břehy Mnichovky u Senohrab.
- Apera spica-venti* (L.) P. B e a u v.: na výslunných úhorech u Obory, Poddubí a Chocerad.
- Phleum toehmeri* W i d e l.: výslunné stráně a skály u Pikovie, skály nad řekou proti Medníku, u Zbořeného Kostelce, Hradečnice, skály v okolí Č. Šternberka.
- Botriochloa ischaemum* (L.) K e n g.: kamenité stránky kolem Jílového a u Zbořeného Kostelce.
- Plantanthera chlorantha* (C u s t.) R e h b.: roztroušeně v Záušním lese (dubina) u Dubska, Hornopožárský revír sev. od Krhanie, dubina V zahrádkách a u Čakovického potoka.
- Orchis ustulata* L.: louka a stránky poblíž řeky u Pecerad.

Literatura

- Čelakovský, L. (1883): Prodrum der Flora von Böhmen I—III, Prodrum květeny české IV, Praha.
- Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881—1893.
- Rohlena, J. (1922—1931): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech I—XIII. Časopis Nár. musea 1922: 54—66; 1925: 3—12 a 129—139; 1929: 1—17 a 65—75; 1931: 1—23, Praha.
- Rohlena, J. (1902): Beitrag zur Flora von Böhmen. Zvl. otisk z Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik etc. 5/6 a 7/8.
- Dostál, J. (1948—1950): Květena ČSR, Praha.
- Dostál, J. (1954): Klíč k Úplné květeně ČSR, Praha.
- Čeřovský, J. (1948): Xerothermní vegetace na skalách u Pikovie a jejich ochrana. — Ochrana přírody 4: 28—30, Praha.
- Čeřovský, J. (1949): Teplomilná květena ve Zbořeném Kostelci. — Čs. botan. listy 2: 55—57, Praha.
- Čeřovský, J.: (1949): Jalovecový lesík na Jílovsku. — Čs. botan. listy 2: 74—75, Praha.
- Čeřovský, J. (1949): Zplanělé rostliny z dolního Posázaví. — Čs. botan. listy 2: 87—89, Praha.
- Pflanzengeografische Kartierung 1: 300 000, Aufruf zur Mitarbeit, im Aufruf der für die Kartierung verantwortlichen Institute herausgegeben von Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle (Saale).

Adresa autora: Věroslav Š i m e č e k, Praha 10, Průhonická 17.

Došlo: 2. 4. 1957.