

Poznámky ke květeně jihovýchodní části Podunajské nížiny

Anmerkungen zur Flora des südöstlichen Teiles der slowakischen Donautiefebene

Jindřich Chrtek, Bohdan Křísa a Zdenka Slavíková

CHRTEK J., B. KŘISA et Z. SLAVÍKOVÁ (1972): Poznámky ke květeně jihovýchodní části Podunajské nížiny. [Anmerkungen zur Flora des südöstlichen Teiles der slowakischen Donautiefebene.] — *Preslia, Praha, 44 : 52—66.* — Es werden die Resultate der floristischen Durchforschung des südöstlichen Teiles der Donautiefebene veröffentlicht. Das Untersuchungsgebiet ist durch die Linie Komárno—Nové Zámky—Gbelec—Kravany nad Dunajom—Komárno begrenzt. In diesem Beitrag sind 217 Arten angeführt, und zwar vorwiegend die häufigen Arten, welche manchmal in phytogeographischer Hinsicht wichtig sind. Aus diesem Gebiet sind bisher relativ wenig konkrete Lokalitäten bekannt. Wir haben in diesem Beitrag nur die taxonomisch weniger komplizierten Arten angeführt; weniger häufige und kritische Arten sollen in einem weiteren Artikel behandelt werden. — *Botanisches Institut der Karls-Universität, Benátská 2, Praha 2, Tschechoslowakei.*

V květnu a červenci r. 1970 jsme pracovali v jihovýchodní části Podunajské nížiny v území Komárno—Nové Zámky (hranici tvořil levý břeh řeky Nitry a Váhu) — Gbelec (zde byla hranice vymezena železniční tratí Nové Zámky—Štúrovo)—Kravany nad Dunajom—Komárno. V této oblasti jsme botanizovali téměř jeden měsíc a nashromáždili ca 2100 položek.


Území v němž jsme pracovali, vytváří geomorfologicky přechod mezi Velkým Žitným ostrovem a Hronskou tabulovou pahorkatinou. Přibližnou hranicí mezi těmito dvěma územními celky je dolní tok řeky Žitavy, a to v prostoru mezi obcemi Martovec a Žitavská Tůň. Jihozápadní část studovaného území, Komárno—Lándor pusta—Martovec—Žitavská Tůň—Komárno, tvoří poslední výběžky Velkého Žitného ostrova. Je to nížina s četnými slepými rameny a regulačními kanály zejména při dolním toku řeky Nitry. V poslední době vlivem vodohospodářských úprav jsou některé přírodní celky (slepá ramena, tůně, podmáčené louky, slaniska) na ústupu. Zbývající část území náleží geomorfologicky k jižnímu výběžkům Hronské tabulové pahorkatiny, která je od vlastní nížiny ohraničena souvislým pásmem vátých písků probíhajících od obce Nesvady přes obec Imeľ, Hurbanovo, Chotín, Marcelová, Virt, Radvaň nad Dunajom. Na toto pásmo navazují bezprostředně vyvýšeniny Hronské tabulové pahorkatiny, která vyplňuje většinu studovaného území a je tvořena neogenními usazeninami, které jsou převážně sprašemi.

Nejvyšší vrchol těchto vyvýšenin je kóta 250 m (Nový les) severně od obce Modrany. Celou tuto vrcholovou zalesněnou část se sousedními odlesněnými vyvýšeninami označujeme jako Modranská pahorkatina. DOSTÁL (1960) řadí toto území do obvodu xerothermní panonské květeny, okresu Podunajská nížina, okrsku Hronská tabule. FUTÁK (1966) neuvádí v okresu Podunajská nížina žádné podrobné třídění. Podle našeho názoru není studované území fytogeograficky jednotné. Geomorfologická charakteristika je v souladu s fytogeografickými poměry, to znamená, že jihozápadní část v prostoru Komárno—Martovec—Žitavská Tůň náleží do květenného okresu Žitný ostrov a zbývající část patří již okrsku zmíněné Hronské tabule. Z větších prací, které se svou tematikou dotýkají našeho území jmenujeme především práce těchto autorů: KNAPP (1864), SCHILLER (1865), KRIST (1937 až 1940), OSVAČILOVÁ (1956), MÁJOVSKÝ (1961) a FUTÁK (1962). V novější době pracovala v území příležitostně řada botaniků, zejména slovenských.

V tomto příspěvku jsme se pokusili zaznamenat rozšíření některých zpravidla běžných a taxonomicky poměrně jasných druhů, jejichž rozšíření v Podunajské nížině nebylo dostatečně známé. Druhy, které považujeme za taxonomicky obtížnější zveřejníme v dalším příspěvku. Označení nalezišť je většinou podle názvosloví z topografických map (1 : 50 000) z roku 1952. Nomenklatura taxonů je ve většině případů podle: DOSTÁL J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. Ed. 2. — Praha.

Acer tataricum L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); jv. od obce Marcelová; již. od obce Patince-kúpele. FUTÁK (1962): Drieňová hora, mezi obcí Nové Zámky a dvorem Aňala.

Achillea setacea W. et K. — Křovinaté stráně a meze. Mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan; jv. od obce Marcelová; okolí obce Domáňovská Pustatina; sv. od obce Virt; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937b): Drieňová hora.



Obr. 1. — Schématická mapa studované oblasti. Seznam nejčastěji použitých lokalit v textu. — 1. dvor Kotelnica; 2. Timonova myslivna; 3. Rókalyuk pusta; 4. Sesleš; 5. Horný Vek; 6. Dolný Vek; 7. louky Komočín; 8. Ďulov dvor; 9. Kolozs majir; 10. Chotín — železniční stanice; 11. les Čenka; 12. Velká Kamenná Pustatina; 13. Malá Kamenná Pustatina; 14. vrch Kurta; 15. dvor Horáreň; 16. Žltý dom; 17. Pribetský dvor; 18. Pribetský les — myslivna; 19. Nový les; 20. Chrbát; 21. kóta 212 m; 22. Suchý vrch; 23. Močarisko; 24. Močodla; 25. Velká dolina; 26. Bašov kopec; 27. Veterný výšok; 28. dvor Mašan; 29. Domáňovská Pustatina; 30. Močská Pustatina; 31. Komárno-tehelňa; 32. Malý Haresás; 33. Haresás pusta; 34. kóta 112 m; 35. Patince-kúpele; 36. dvor Slukoviny; 37. kóta 226 m, Novoveské vinice; 38. Drieňová hora.

Acorus calamus L. — Bažiny a mokřady. Levý břeh řeky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesleš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta); při Dunaji vých. od obce Moča. HEJNÝ (1960): jen mezi obcemi Komárno a Štúrovo.

Adonis aestivalis L. — Pole a úhory. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

A. vernalis L. — Stepní a křovinaté stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; svahy sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch a kóta 212 m sv. a sev. od obce Modrany; již. od kóty Nový les; Novoveské vinice. Na mnohých místech mizí, protože lokality jsou zarůstány křovinami a zejména akátovými porosty. ŠTARÝ (1952): Gbelee; KRIST (1937b), OSVAČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

Agrimonia eupatoria L. — Travnaté stráně a meze. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; okolí obce Dulovce; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; stránka sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech.

Agrostemma githago L. — Opuštěná místa. Záp. od obce Horný Vek; úpatí kopce Novoveské vinice.

Allium angulosum L. — Pobřežní mokřiny. Levý břeh řeky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný Vek, Komočín, Lándor pusta); u Dunaje při kótě 112 m záp. od obce Iža a již. od obce Patince-kúpele. HENDRYCH (1968) je z území neuvádí.

Alyssum calcycinum L. — Suchá stanoviště. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Amaranthus albus L. — Ruderální stanoviště a u cest. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Patince; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Amygdalus nana L. — Křovinaté stráně. Sz. od obce Šrobárová; Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Novoveské vinice.

Anchusa officinalis L. — Suché travnaté stráně a podél cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska. KRIST (1939) se zmiňuje o var. *angustifolia* DC. z obce Chotín a Čenkov. Taxonomická hodnota tohoto taxonu je sporná. Soó (1968) ji považuje za pouhou formu od var. *officinalis*.

Anemone ranunculoides L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát).

Anthemis ruthenica M. B. — Suché písčité půdy. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta; vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); sv. od obce Dulovce; záp. od obce Dolný Peter; již. od obce Malá Kamenná Pustatina; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň); mezi obcemi Modrany a Moča na více místech; Moča. KRIST (1938); Chotín, (1939); Balázstag u obce Hurbanovo; MÁJOVSKÝ (1961); Marcelová; FUTÁK (1962); mezi obcemi Bajč a Imeľ, Moča.

Anthericum ramosum L. — Západní svah kóty 212 m sev. od obce Modrany. SKALICKÝ (1959): Drieňová hora.

Antiriscus cerefolium (L.) HOFFM. subsp. *trichosperma* (SCHULT.) ARCANG. — Lesní porosty. Les u dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; u obce Chotín; Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Čenka jz. od obce Dolný Peter; vřeh Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Pribeta a Vojnice na mnoha místech; jv. od obce Marcelová; sev. od obce Žitavská Tůň.

Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. — Pole, písčité půdy, váté písky. Okraj obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); pískoviště sv. od obce Dulovce a sz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, dvor Mašan, Veterný vršok, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň); mezi obcemi Modrany a Moča na více místech.

Arabislopsis thaliana (L.) HEYNL. — Písčité úhory. Již. od obce Malá Kamenná Pustatina; jz. od obce Dulovce; u hřbitova na sv. okraji obce Modrany; chatová základna u obce Radvaň n. D.

Aristolochia clematitis L. — Příkopy, okraje silnic a řek, lesy. Na sv. okraji obce Imeľ; u dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; břehy řeky Žitavy, Nitry a Váhu souvisle a někdy v rozsáhlých porostech až k obci Komárno; podél toku Dunaje od obce Komárno přes obce Iža, Patince, Radvaň n. D., Moča, po Kravany n. D.; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Virt; jv. od obce Marcelová; mezi obcemi Modrany a Moča na více místech. Srov. mapa rozšíření v ČSSR HOLUBOVÁ et SLAVÍKOVÁ (1964).

Artemisia absinthium L. — Ruderální stanoviště a u cest. Železniční stanice Hurbanovo; Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; železniční stanice Chotín; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Dolný Peter; Vojnice; Moča; jz. svah Novoveských vinic.

A. pontica L. — Suchá travnatá stanoviště. Lándor pusta sev. od obce Komárno; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962); u obce Komárno.

Asparagus officinalis L. — Travnaté a křovinaté stráně. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Sesíleš u obce Hurbanovo; Komárno-tehelná; Lándor pusta sev. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka u obce Dolný Peter; Suchý vřeh sv. od obce Modrany; sz. od obce Vojnice; okolí obce Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; mezi obcemi Žitavská Tůň a Radvaň n. D.; záp. od obce Kravany n. D.; stráně sz. od obce Šrobárová.

Asperugo procumbens L. — Druhotná stanoviště. Okolí dvora Kotelnica sz. od obce Bajč; Sesíleš u obce Hurbanovo; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m); již. od obce Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; v okolí obce Modrany (Suchý vřeh); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora

Mašan, Domáňovská Pustatina); u hájovny v Pribetském lese jv. od obce Dulovce; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Asperula odorata L. — Listnaté lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát); přilece Dunaji již. od obce Patince-kúpele.

Astragalus cicer L. — Travnaté porosty při cestách. U dvora Kotelníca sz. od obce Bajč; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; sv. od obce Dulovce; mezi obcemi Dulovce a Dolný Peter; vřeh Kurta záp. od obce Mudroňovo; stráňky sz. od obce Šrobárová; Suchý vřeh sv. od obce Modrany; sv. od obce Vojnice; Močodla záp. od obce Búč; mezi obcí Kravany n. D. a dvorem Slukoviny, Novoveské vinice. FUTÁK (1962): na kótě Novoveské vinice a Drieňová hora.

A. glycyphyllos L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany a sz. od obce Vojnice); Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; Suchý vřeh sv. od obce Modrany.

Avenochloa pubescens (HUDS.) HOLUB — Paseky, křovinaté stráně, lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u hájovny v Pribetském lese, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice.

Berteroa incana (L.) DC. — Výslunná suchá stanoviště, u cest. Komárno-tehelňa; Haresás pusta; Velká Kamenná Pustatina; Dolný Peter; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; Modrany; vřeh Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Mudroňovo a Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce Marcelová, Bašov kopec, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň); Moča; mezi obcemi Moča a Kravany n. D. na více místech.

Betonica officinalis L. — Travnaté stráně a paseky. Vřeh Kurta záp. od obce Mudroňovo; Žltý dom sz. od obce Šrobárová; Suchý vřeh sv. od obce Modrany; u kóty Nový les mezi obcemi Pribeta a Vojnice.

Blackstonia perfoliata (L.) HUDS. — Podmáčené alkalické půdy. Komárno-tehelňa na vých. okraji při silnici Komárno—Iža ve velkém množství; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. jen v několika exemplářích. KRIST (1937a); uvádí nejbližší lokalitu u obce Nová Stráž. SVOBODOVÁ (1966b): Moča.

Bothriochloa ischaemum (L.) KENG — Travnaté stráně. Vřeh Kurta záp. od obce Mudroňovo; okolí dvora Horáreň a dvora Žltý dom sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, Suchý vřeh); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina). KRIST (1938); Chotín, (1939): vřeh Kurta, Radvaň n. D., dvor Mária u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962): mezi obcemi Bajč a Imeľ, Modrany, Žitavská Tůň, Nová Vieska.

Butomus umbellatus L. — Pobřežní mělké vody a zarůstající kanály. Sev. od obce Horný Vek záp. od obce Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta sev. od obce Komárno a dále k jihu až k obci Komárno; mezi obcemi Komárno a Chotín (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majír); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. roztroušeně (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča).

Caltha palustris L. subsp. *cornuta* (SCH., NYM. et K.) HEGI — Bažinatá místa. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesleš, Martovce, Dolný Vek, Komočín, Lándor pusta); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí a sev. od obce); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech.

Calystegia sepium (L.) R. BR. — Pobřežní křoviny. Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Dulovce; sz. od obce Modrany; mezi obcemi Modrany a Moča; dvor Slukoviny; Moča.

Campanula bononiensis L. — Suché travnaté stráně. Kóta 212 m sz. od obce Modrany; Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

C. glomerata L. subsp. *farinosa* (KIT.) JÁV. — Výslunné stráně. Kóta 212 m a Suchý vřeh sev. a sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

C. sibirica L. subsp. *paniculata* (OPITZ) HENDRYCH — Křovinaté výslunné stráně. Suchý vřeh sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): Modrany, Drieňová hora, Žitavská Tůň.

Cardaria draba (L.) DESV. — Okraje cest a polí. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Carduus collinus W. et K. — Novoveské vinice. Je zajímavé, že druh jsme nenalezli na podobných stanovištích v širším okolí obce Modrany. Na hrázi mezi obcemi Kravany n. D. a Moča jsme našli jedince, který připomínal křížence *Carduus acanthoides* × *collinus* BUDAI.

C. nutans L. — Suché meze. Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; mezi obcemi Dulovce a Pribeta; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, Kravany n. D.); Marcelová; Virt; Modrany; Vojnice; Novoveské vinice.

Carlina vulgaris L. subsp. *longifolia* (RCHB.) ARCANG. — Výslunné stráně. Sz. od obce Šrobárová; Suchý vřeh sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

Caulalis lappula (WEB.) GRANDE — Pole a úhory. Mezi obcemi Lándor pusta a Komárno; Ďulov dvor; Kolozs majr a Chotín; okolí obce Modrany (Kamenica, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča.

Celtis occidentalis L. — Introdukovaná dřevina roztroušeně v území. Sz. od obce Chotín; sz. od obce Vojnice; mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan; sev. od obce Virt; u silnice záp. od obce Radvaň n. D. (souvislý hájový porost).

Centaurea cyanus L. — Pole. Mezi obcemi Komárno a Lándor pusta; Ďulov dvor; mezi obcemi Iža a Komárno (Haresás pusta); mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; již. od obce Pribeta; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; sev. od obce Modrany.

Centaureum pulchellum (Sw.) DRUCE — Vlhká místa u komunikací a slané půdy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesíleš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta, Komárno); Komárno-tehelňa, mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina; Močarisko jv. od obce Modrany; sz. od obce Moča; u železniční stanice Chotín. (Det. A. ČVANČARA.)

C. vulgare Raf. subsp. *uliginosum* (W. et K.) Soó — Zamokřené slané půdy. Komárno-tehelňa (na vých. okraji poblíže silnice Komárno—Iža). KRIST (1938); u obce Chotín. (Det. A. ČVANČARA.)

Cerinth minor L. — U cest. Mezi obcemi Martovce a Lándor pusta; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Dulovce a Dolný Peter; mezi obcemi Dulovce a Pribeta; sz. od obce Vojnice; Patince-kúpele; Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice.

Chaenorrhinum minus (L.) LGE. — Pole a u cest. Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); u lesa Čenka jz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; okolí obce Marcelová (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); sev. od obce Virt; Patince-kúpele; Žitavská Tůň.

Chamaepilium officinale (L.) WALLR. — U cest a na návších. Lándor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (kóta 112 m); Iža; Marcelová; Žitavská Tůň; Moča.

Chenopodium ambrosioides L. — U silnice v obci Žitavská Tůň.

C. botrys L. — Ruderální stanoviště v obcích. Komárno-tehelňa; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.

C. hybridum L. — Pole a u cest. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

C. vulvaria L. — Obce. Hurbanovo; Marcelová; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.

Chondrilla juncea L. — Travnaté a křovinaté stráně. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modranv; Voinice; Virt; Žitavská Tůň. Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Chrysanthemum corymbosum L. subsp. *corymoosum* — Lesy a křovinaté strane. Kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; Nový les; Chrbát v prostoru mezi obcemi Pribeta a Vojnice.

Cirsium brachycephalum JUR. — Vlhké slané louky. Martovce; Komočín; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Močarisko jv. od obce Modrany. KRIST (1937d) podává rozbor tohoto druhu na Slovensku a (1940) mapku rozšíření na Slovensku.

Clematis integrifolia L. — Vlhké louky, břehy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno u řeky Žitavy a Nitry (Sesíleš, Horný a Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta); Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Moča).

C. recta L. — Suché okraje pobřežních křovin podél Dunaje. M. Haresás; Haresás pusta; Iža; Patince-kúpele; soutok Žitavy a Dunaje; Radvaň n. D.; Moča; dvor Slukoviny; Kravany n. D.

C. vitalba L. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (lesní cesta u hájovny v Pribetském lese a u kóty Nový les); sz. od obce Vojnice.

Colchicum autumnale L. — Louky a vlhká místa při lesních okrajích. Horný a Dolný Vek; Martovce; Komočín; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí a sev. od obce); Komárno — Iža (Haresás pusta, kóta 112 m); Patince-kúpele; mezi obcemi Kravany n. D. a Moča na více místech; v lese mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u hájovny v Pribetském lese, záp. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát).

Conium maculatum L. — Ruderální stanoviště v obcích. Mezi obcemi Komárno a Lándor pusta; Ďulov dvor; Bohatá; Dolný Peter; sz. od obce Vojnice; jv. od obce Modrany; Radvaň n. D.; Moča.

Consolida orientalis (GAY) SCHROED. — Při silnici mezi obcemi Komárno a Lándor pusta, ne- daleko kóty 109 v rozsáhlých porostech.

C. regalis GRAY subsp. *regalis* — Plevel v polích v okolí obcí. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo;

Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Corydalis cava (L.) SCHW. et KOERTE — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, kóta Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Crepis foetida L. subsp. *rhoeadiifolia* (M. B.) ČEL. — Výslunné travnaté stráně. Sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, při cestě k Suchému vrhu); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Veterný vršek, kóta 131 m u dvora Mašan, Domáňovská Pustatina).

Cynodon dactylon (L.) PERS. — Suchá travnatá stanoviště. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); Patince; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt); Suchý vrch sv. od obce Modrany; vinice sz. od obce Vojnice; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962); Modrany, Pribeta, Moča.

Datura stramonium L. — Ruderální stanoviště a úhory. Sesileš záp. od obce Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; Imeľ; Modrany; Vojnice; Moča; Kravany n. D.

Descurainia sophia (L.) WEBB. — Ruderální stanoviště nejčastěji v obcích. Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Chotín; Dolný Peter; Dulovce; Pribeta; Marcelová; Bašov kopec jv. od obce Marcelová; Šrobárová; Iža; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.

Dianthus armeria L. — Křovinaté stráně a rozvolněné lesní porosty. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, kóta Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

D. pontederæ KERN. — Suché travnaté stráně. Suchý vrch sv. od obce Modrany; paseka sz. od kóty Nový les mezi obcemi Pribeta a Vojnice; Patince-kúpele a již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937b) a OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora. Ve studovaném území je výskyt tohoto druhu poměrně řídký. Taxonomická hodnota jihoslovenských populací je dosud nejasná a vyžadovala by dalšího zevrubného studia. Domníváme se, že tyto populace nejsou zcela totožné s *D. pontederæ* KERN. a není vyloučeno, že se jedná o jiný taxon.

D. serotinus W. et K. — Váté písky a písčité stanoviště. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta sv. od obce Nesvady; kóta 131 m u dvora Mašan sev. od obce Virt. KRIST (1939): Chotín, Radvaň n. D.; FUTÁK (1962): mezi obcemi Imeľ a Bajč, Žitavská Tůň.

Dictamnus albus L. — Křovinaté stráně a suchá místa v lesích. Jv. okraj lesa poblíž dvora Horáreň záp. od obce Mudroňovo; Suchý vrch sv. od obce Modrany; okraj lesa sz. od obce Vojnice.

Diplotaxis muralis (L.) DC. — Ruderální stanoviště, u cest a v polích. Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (Močodlo, Suchý vrch); Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Novoveské vinice.

Doronicum hungaricum (SADL.) RCHB. — Doubrava na sz. svahu kóty Nový les v lesním porostu mezi obcemi Pribeta a Vojnice, ca 230 m n. m. Jedinci se nalézali přibližně v kruhu o průměru asi 10 m v množství asi 100 kvetoucích jedinců. Nápadný byl výskyt velkého množství exemplářů na poměrně omezeném prostoru. Tato lokalita představuje nepochybně další nový nález tohoto druhu na jižním Slovensku. Doposud jsou známy ze Slovenska tyto lokality: Zobor u Nitry, Krupinská vrchovina (okolí obce Plášťovce z vrchu Šípka a z kóty 368 m — Trinovský vrch), u obce Poltár v okrese Lučence a v sev. části Ďarmotských kopců. Srov. MÁJOVSKÝ et JURKO (1956): 130; SVOBODOVÁ et REHOŘEK (1964): 186; BERTOVÁ (1966): 63—66. Podle písemného sdělení nalezní tento druh botanikovec SMEJKAL a VICHEREK v květnu 1970 na Kováčovských kopcích v doubravě při lesní cestě poblíž kóty 345 m nad nádražím Kamenica nad Hronom.

Echinops sphaerocephalus L. — Ruderální místa. Na sev. okraji obce Komárno u městských jatek; Lándor pusta; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

Eryngium campestre L. — Meze a u cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

E. planum L. — Poloslané půdy. Lándor pusta sev. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.). KRIST (1937a): u obce Chotín.

Euonymus europaea L. — Křoviny a okraje lesů. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, Patince-kúpele, Radvaň n. D., u dvora Slukoviny); u Žitavy záp. od obce Virt; v okolí obce Modrany (Kamenica, Suchý vrch, sz. od obce Vojnice).

E. verrucosa Scop. — Les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). FUTÁK (1962): Novoveské vinice.

Falcaria vulgaris BERNH. — Meze a u cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovec; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Ficus carica L. — Zplanělý při Dunaji na vých. okraji obce Moča.

Galeopsis angustifolia EHRH. — Úpatí kóty Novoveské vinice. Přestože byl tento druh sledován, zjistili jsme jej jen na této jediné lokalitě.

Galium boreale L. — Vlhké louky mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný a Dolný Vek, Martovec, Komočín, Lándor pusta); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); M. Haresás mezi obcemi Komárno a Iža.

G. cruciata (L.) Scop. — Křovinaté stráně a světlé lesy. Okolí obce Modrany (kóta 212 m a Suchý vrch); les mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice.

G. rubioides L. — Vlhké pobřežní křoviny u Dunaje. Patince-kúpele; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

G. schultesii VEST. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Chrbát, Nový les). ZAHRADNÍKOVÁ (1967) a HADAČ E. (1969) z území tento druh neuvádějí.

Geranium lucidum L. — Světliny v lesích. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, již. od obce Pribetský dvor v rozsáhlých porostech, Nový les, Chrbát); jv. od obce Marcelová směrem na obec Virt.

Gladium corniculatum (L.) RUDOLPH. — Zplanělý v okolí obce Modrany (na sev. okraji obce Suchý vrch). FUTÁK (1962): u obce Modrany.

Gratiola officinalis L. — Vlhké louky, Martovec; Komočín; Lándor pusta; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, Patince-kúpele); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Dunajské hony mezi dvorem Slukoviny a obcí Moča; Žitavská Tôň. SKALICKÝ (1965) uvádí na mapě ze studovaného území jen jedinou lokalitu.

Gypsophila muralis L. — Ruderální místa a u cest. Okolí obce Dulovec (Erdő pusta, dvor Lapos, Stará hora a na sev. okraji obce).

G. paniculata L. — Váté písky. V lese sev. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); hřbitov v obci Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, kóta 134 m, kóta 121 m, dvor Mašan, vinice u obce Domáňovská Pustatina, sev. od obce Žitavská Tôň); u silnice mezi obcemi Žitavská Tôň a Radvaň n. D. KRIST (1938) na hrázi u obce Kravany n. D., (1939) dvor Balázstag u obce Hurbanovo, písčité pahorky a hřbitov u obce Chotín, dvor Márie u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962): záp. od obce Hurbanovo, Žitavská Tôň.

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH. — Váté písky. Rókalyuk pusta mezi obcemi Nesvady a Bajč; Bašov kopec jv. od obce Marcelová.

Hibiscus trionum L. — Pole a úhory. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Martovec; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Holosteum umbellatum L. subsp. *glutinatum* (M. B.) NYMAN. — Písčité půdy a travnaté stráně. Mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás); Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Veterný vršek); okolí obce Modrany (u hřbitova a Suchý vrch). Ve studovaném území převažují jedinci patřící k tomuto poddruhu.

Humulus lupulus L. — Pobřežní křoviny a lesy. Mezi dvorem Kotelnica a Timonovou myslivnou záp. od obce Bajč; při Žitavě vých. od obce Martovec; mezi obcemi Martovec a Lándor pusta; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Žitavská Tôň (Haresás pusta, Iža, Patince-kúpele, soutok Žitavy a Dunaje).

Hydrocharis morsus-ranae L. — Tůně a slepá ramena. Komočín mezi obcemi Martovec a Lándor pusta; Žitava záp. od obce Virt. HEJNÝ (1960) uvádí tento druh pouze od dvora Aňala mezi obcemi Nesvady a Nové Zámky a z okolí obce Hurbanovo.

Hyoscyamus niger L. — Ruderální místa a u cest. Dolný Vek; mezi obcemi Lándor pusta a Komárno; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, M. Haresás); Chotín; Dolný Peter; Dulovec; Patince-kúpele; Močská Pustatina sv. od obce Moča; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Hypericum hirsutum L. — Světlé lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (sz. od obce Modrany, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Inula britannica L. — U cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovec; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tôň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Iris pseudacorus L. — Břehy vod. U řeky Žitavy a Nitry mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesleš, Horný a Dolný Vek, Martovec, Komočín, Lándor pusta); Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Kolozs majr sv. od obce Komárno; mokřiny sz. od obce Chotín; Močárisko a Veľká dolina mezi obcemi Modrany a Moča; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, Slukoviny).

I. sibirica L. — Na lukách Komočín mezi obcemi Martovec a Lándor pusta.

Juncus articulatus L. — Zamokřená místa. U řeky Váh sv. od obce Komárno; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová a mezi obcemi Radvaň n. D. a Kravany n. D. (Moča, Dunajské hony, dvor Slukoviny).

J. compressus JACQ. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža); Patince; Žitavská Tůň; u obce Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová.

J. gerardi LOISEL. — Zamokřená a poloslané půdy. Michalov dvor jz. od obce Hurbanovo; Martovec; Komočín; Lándor pusta; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža); Patince-kúpele. Srov. mapku KRIST (1940).

J. inflexus L. — Podmáčené půdy v blízkosti cest. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Martovec, Komočín, Lándor pusta); Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta, Iža); Patince-kúpele.

Jurinea mollis (TORN.) REHB. — Suchý vrch sv. od obce Modrany ve velkém množství. Na této lokalitě byla značná proměnlivost ve tvaru a velikosti přízemních listů od nedělených až po laločnaté s různě hlubokými zářezy. OSVAČILOVÁ (1956); Drieňová hora; FUTÁK (1962); Drieňová hora a Novoveské vinice.

Kickxia elatine (L.) DUM. — Pole. Sev. okraj obce Imeľ; mezi obcemi Lándor pusta a Komárno na více místech; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

K. spuria (L.) DUM. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; jv. od obce Modrany. FUTÁK (1962); okolí obce Modrany. Na několika místech jsme našli jedince (Patince, Moča), připomínající křížence mezi oběma zmíněnými druhy.

Lactuca quercina L. subsp. *quercina* var. *quercina* — Prosvětlené háje. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice. FERÁKOVÁ (1969) uvádí nejbližší lokality tohoto taxónu ve vztahu ke studovanému území od obce Čenkov a z kótv Drieňová hora.

L. serriola (L.) TORN. — Výslunné stráně. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Komárno; Iža; Chotín; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Lamium amplexicaule L. — Pole a vinice. Imeľ; Bohatá; Hurbanovo; Chotín; Komárno; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká Kamenná Pustatina, Malá Kamenná Pustatina); Marcelová; Virt; Žitavská Tůň; Modrany.

L. purpureum L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Chotín; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká a Malá Kamenná Pustatina); mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); Virt; Žitavská Tůň; mezi obcemi Modrany a Moča (Veľká dolina, Močská Pustatina).

Lappula myosotis MOENCH — Pole a úhory. Chotín; Dulovec; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta); Horáreň sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Domáňovská Pustatina); Virt; Suchý vrch sv. od obce Modrany; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Veľká dolina, Močská Pustatina); sv. od obce Vojnice; Novoveské vinice.

Lapsana communis L. — Ruderální stanoviště. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Dulovec; Marcelová; Šrobárová; Moča.

Lathyrus niger (L.) BERNH. — Prosvětlená místa v lese mezi obcemi Pribeta a Vojnice (jz. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

L. tuberosus L. — Okraje polí a cest. Nesvady; Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovec; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovec; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Leucocjum aestivum L. — Bažinaté louky a zaplavovaná místa v širokém pobřeží Dunaje. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno při řece Žitavě a Nitře (Sesleš, Horný a Dolný Vek, Martovec, Komočín, Lándor pusta); na některých místech ještě v rozsáhlých porostech, zejména při silnici z obce Horný Vek do obce Martovec; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň); na těchto lokalitách velmi roztroušeně a tvoří velké porosty. KRIST (1938); Iža.

Linaria vulgaris L. — Okraje polí a výslunné křovinaté stráně. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurba-

novy; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Vojnice; Virt; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Nová Vieska.

Linum flavum L. subsp. *flavum* — Výslunné travnaté stráně. Suchý vrch sv. od obce Modrany. OSVAČILOVÁ (1956); Drieňová hora.

L. hirsutum L. subsp. *latifolium* (LEDEB.) DOST. — Travnaté výslunné stráně. Sz. od obce Šrobárová (již. od dvora Horáren); Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956); Drieňová hora; FUTÁK (1962); Modrany.

L. tenuifolium L. — Suchá travnatá místa. Sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch sev. a sv. od obce Modrany; Novoveské vinice; Kravany n. D. (záp. při Dunaji). OSVAČILOVÁ (1956); Drieňová hora; FUTÁK (1962); Modrany a Novoveské vinice.

Lithospermum arvense L. — Pole a úhory. Imeľ; Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Bůč; Nová Vieska.

L. purpureo-coeruleum L. — Háje a křovinaté stráně. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany a sz. od obce Vojnice); u kóty 212 m sev. od obce Modrany; Suchý vrch sv. od obce Modrany; Novoveské vinice. FUTÁK (1962); Novoveské vinice a Drieňová hora.

Lotus tenuis W. et K. — Poloslané půdy podél řeky Dunaje. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča u dvora Slukoviny. Srov. mapku KRIST (1940). *Lotus borbasii* UJHELYI, který je znám z Novoveských viní, jsme ve studovaném území nepozorovali.

Lupinus polyphyllus LINDL. — Vyséváný v lesích. U hájovny v Pribetském lese; Nový les sz. od obce Vojnice.

Lythrum hyssopifolium L. — Poloslané půdy. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Dolný a Horný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta, Komárno); Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Domáňovská Pustatina; Močarisko jv. od obce Modrany; sz. od obce Moča; u železniční stanice Chotín. Druh roste většinou společně s druhem *Centaureum pulchellum* (Sw.) DRUCE.

L. virgatum L. — Vlhké louky a pobřeží křoviny. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesileš, Horný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta, Komárno-jatky); Ďulov dvor; Kolozs majír; sv. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Moča, Kravany n. D.); Velká dolina mezi obcemi Modrany a Moča.

Malcolmia africana (L.) R. BR. — U cest druhotně rozšířená. Mezi obcemi Komárno a Patince-kúpele (M. Haresás, Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža). KRIST (1939); nedaleko obce Iža.

Malva silvestris L. — U cest, v křovinách. Mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Kravany n. D.); Marcelová; Šrobárová; Modrany.

Matricaria chamomilla L. — Úhory, pole a u cest. U železniční stanice Hurbanovo; Martovce; sv. od obce Chotín; Dulovce; Modrany; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); Žitavská Tůň; Moča. Mezi obcemi Komárno a Iža u kóty 112 m byli na poloslaných půdách jedinci, kteří svým vzhledem odpovídali populaci *M. chamomilla* L. subsp. *bayeri* (KAN.) HAY.

M. discoides DC. — U cest a v obcích. Imeľ; Bohatá; Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta; Komárno; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Iža; Patince; Radvaň n. D.; Marcelová; Šrobárová; Modrany; Kravany n. D.; Novoveské vinice.

Medicago minima (L.) GRUEB. — Výslunné travnaté stráně. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; stráně sv. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. od obce a Suchý vrch); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (souvisle od obce Marcelová po Bašov kopeček, dvor Mašan, Veterný výšok, sz. od obce Radvaň n. D.); již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. FUTÁK (1962); Moča a vinice u obce Nová Vieska.

Melandrium noctiflorum (L.) FR. — Pole a úhory. Lándor pusta sev. od obce Komárno; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majír); mezi obcemi Chotín a Dolný Peter (les Čenka); mezi obcemi Marcelová a Virt (jv. okolí obce Marcelová a Šrobárová); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Velká dolina, Močská Pustatina); Žitavská Tůň.

M. viscosum (L.) ČELAK. — Travnaté stráně. Kóta 118 m sv. od obce Virt; mezi obcemi Močská Pustatina a Moča; mezi obcemi Moča a Kravany n. D. OSVAČILOVÁ (1956); Drieňová hora.

Melilotus albus DESR. — Přikopy a rumiště. Lándor pusta sev. od obce Komárno; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor; Kolozs majír); mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás

pusta, kóta 112 m); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce, Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, Vaterný vršek, Virt, sev. od obce Žitavská Tůň); Moča.

M. officinalis (L.) LAM. — Na podobných stanovištích jako u předešlého druhu. Nesvady; Imeř; Bajě; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Mercurialis annua L. — Okraje polí zejména v obcích. Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Komárno; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Komárno-tehelňa; Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Patince; Patince-kúpele; Radvaň n. D.; Marcelová; Modrany; Vojnice.

Misopates orontium (L.) RAF. — Pole. Na sev. okraji obce Modrany a sv. od obce Vojnice.

Mycelis muralis (L.) DUM. — Lesy. Mezi obcemi Pribeta a Vojnice (u obce Pribetský dvor, Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Nigella arvensis L. — Travnaté svahy, okraje polí a úhory. Sv. od obce Imeř; mezi obcemi Nesvady a Bajě (Rókalyuk pusta, Timonova myslivna, dvor Kotelnica); na hrázi mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Horný Vek, Martovce, Lándor pusta); sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor, Kolozs majír); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vinice mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; mezi obcemi Hurbanovo a Dulovce (Vinohrady, Velká Kamenná Pustatina, Malá Kamenná Pustatina); okolí obce Dulovce (Stará hora, Lapos); mezi obcemi Komárno a Iža; (M. Haresás, Haresás pusta); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. souvisle (Bašov kopec, dvor Mašan, Vaterný vršek, Virt, Žitavská Tůň); mezi obcemi Dolný Peter a Šrobárová (vreh Kurta, dvor Horáreň, Žltý dom); okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, Suchý vreh); sz. a sv. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Velká dolina, Močská Pustatina); mezi obcemi Moča a Kravany n. D. (Dunajské hony a dvor Slukoviny). MÁJOVSKÝ (1961): Marcelová; FUTÁK (1962): Modrany a Drieňová hora; SVOBODOVÁ (1966a): Vojnice.

Nonea pulia (L.) DC. — Suché meze a stráně. Bajě; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Onopordum acanthium L. — Náspvy, pustá místa, rumišť. Nesvady; Imeř; Bajě; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Búč; Nová Vieska.

Oryzopsis virescens (TRIN.) BECK — Okraj lesa již. od kóty Nový les sev. od obce Modrany.

Padus serotina (EHRH.) BORKH. — Vysazován v lesích mezi obcemi Pribeta a Vojnice (les u Pribetského dvora, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Papaver rhoeas L. — Pole a úhory. Martovce; Lándor pusta; sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor); mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vreh Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Modrany a Moča na více místech.

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. BALL et HEYWOOD — Travnaté výslunné stráně. Sv. od obce Imeř; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; dvor Kotelnica sz. od obce Bajě; Chotín; Iža; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň); stráně sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. od obce, kóta 212 m, Suchý vreh); sz. od obce Vojnice; Močská Pustatina sz. od obce Moča; již. od dvora Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Peucedanum alsaticum L. — Výslunné křovinaté stráně. Vreh Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vreh); sz. od obce Vojnice; v lese mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát); Novoveské vinice. OSVAČILOVÁ (1956) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. oreoselinum (L.) MOENCH — Písčité půdy. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan, sev. od obce Žitavská Tůň).

Phusalis alkekengi L. — Křovinaté úvoz v okraji lesů. Lándor pusta sev. od obce Komárno; vreh Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; Suchý vreh sv. od obce Modrany; Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

Phytolacca americana L. — Křoviny. Již. část lesů při jv. okraji obce Marcelová; mezi kótou Bašov kopec a dvorem Mašan sv. od obce Virt.

Plantago altissima L. — Vlhké louky. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Dolný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta); sv. od obce Komárno (Komárno-tehelňa, Ďulov dvor); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; na loukách při Dunaji mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny).

P. indica L. — Písečiny. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; les Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; u silnice vých. od obce Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce Marcelová, Bašov kopece, dvor Mašan, Veterný výšek, Domáňovská Pustatina, sev. od obce Žitavská Tůň); písečiny mezi obcemi Modrany a Moča. FUTÁK (1962): písečiny u obce Modrany.

Polygonatum latifolium (JACO.) DESF. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les u obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Modrany, sz. od obce Vojnice); Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. multiflorum (L.) ALL. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Polygonum amphibium L. — Tůně a slepá ramena podél řeky Nitry, Dunaje a Žitavy. Lándor pusta; sev. okraj obce Komárno; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Iža (Haresás pusta); Patince; Patince-kúpele.

Portulaca oleracea L. subsp. *silvestris* (DC.) ČEL. — Cesty, úhory a vinice, často jako obtížný plevel. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Dolný a Horný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Prunella laciniata (L.) NATH. — Travnaté porosty na sev. okraji obce Moča; Novoveské vinice. FUTÁK (1962): Modrany, Drieňová hora.

P. vulgaris L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesíleš, Lándor pusta); Dulovce; Dolný Peter; Pribeta; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele); Modrany; Moča.

Pulmonaria mollissima KER. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (již. od obce Pribetský dvor, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). FUTÁK (1962): Drieňová hora.

P. officinalis L. subsp. *officinalis* — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát).

Ranunculus arvensis L. — Pole. Mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka jz. od obce Dolný Peter; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; okolí obce Modrany (sev. okraj obce, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

R. illyricus L. — Prosvětlené lesy. Les Čenka jz. od obce Dolný Peter; již. od obce Velká Kamenná Pustatina vých. od obce Hurbanovo; stráně sz. od obce Šrobárová; Nový les sev. od obce Modrany. FUTÁK (1962): Drieňová hora.

R. sceleratus L. — Mokřiny a příkopy u cest. Martovce; Komočín mezi obcemi Martovce a Lándor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; na okraji lesa sev. od obce Modrany; Podunaj-ké hony mezi obcemi Moča a Kravany n. D.

Reseda lutea L. — Meze a u cest. Bajč; Bohatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárová; Mudroňovo; Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

R. luteola L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Lándor pusta sev. od obce Komárno; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Suchý vrch, Patince, Žitavská Tůň); Vojnice.

R. phyteuma L. — V území jen podél toku Dunaje, převážně na hrázích. Komárno-tehelňa; M. Haresás; Haresás pusta; kóta 112 m; Iža; mezi obcemi Iža a Patince; Patince-kúpele; Veterný výšek u obce Virt; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Kravany n. D.

Scleria aethiopsis L. — Travnaté výslunné stráně a úhory. Mezi dvory Horáren a Žltý dom sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; sev. od kóty 212 m u obce Modrany. KRIST (1939): vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo.

S. austriaca JACO. — Travnatá místa. U hřbitova vých. od obce Radvaň n. D.; u silnice mezi obcemi Búč a Kravany n. D. (dvor Červený Písek). OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; FUTÁK (1962): záp. od obce Pribeta.

S. nemorosa L. — Meze a u cest. Bajč; Bohatá; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komočín; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Hurbanovo; Dolný Peter; Dulovce; mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tůň (Bašov kopece, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt); mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Šrobárová; Modrany; mezi obcemi Pribeta a Vojnice; Nová Vieska.

S. pratensis L. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu. Martovce; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Dulovce; Modrany; Komárno-tehelňa; Iža; Patince; Kravany n. D.; Moča.

S. verticillata L. — Travnatá místa. Dvor Kotelnica sz. od obce Bajč; Lándor pusta sev. od obce Komárno; sz. od obce Vojnice; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D.; Kravany n. D.

Sambucus ebulus L. — Ruderální stanoviště a okraje lesů. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Dolný a Horný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný

Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Saponaria officinalis L. — Druhotná stanoviště ve vsích a u cest. Martovec; Lándor pusta sev. od obce Komárno; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká a Malá Kamenná Pustatina); mezi železniční stanicí a obcí Chotín; Komárno-tehelňa; vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; Dulovec; mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tůň (dvor Mašan, Domáňovská Pustatina); Moča.

Saxifraga bulbifera L. — Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo.

Scelerochloa dura (L.) BEAUV. — Seslápávaná místa na cestách. Sesíleš záp. od obce Hurbanovo; Bajč; Horný Vek; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; mezi obcemi Hurbanovo a Dolný Peter (Veľká Kamenná Pustatina); Pribeta; mezi obcemi Marcelová a Virt (jv. okraj obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina); sz. od obce Šrobárová; okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Komárno a Radvaň n. D. (M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Veľká dolina, Močská Pustatina).

Senecio paludosus L. subsp. *angustifolius* HOLUB — Stojaté vody a pobřežní křoviny při říčních tocích. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Martovec, souvisle přes obce Komočín, Lándor pusta až k obci Komárno); mezi obcemi Komárno a Žitavská Tůň (Haresás pusta, M. Haresás, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň). Všechny rostliny ze sledovaného území jsou po stránce morfologické jednotného charakteru (srov. HOLUB 1962).

S. viscosus L. — Písčítá a někdy druhotná stanoviště. Sv. od obce Imeľ; železniční stanice Bajč; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. okraj obce Marcelová, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt).

Serratula tinctoria L. — Vlhké louky. Komočín mezi obcemi Martovec a Lándor pusta; jv. od obce Lándor pusta; Komárno (sv. okraj města); Haresás pusta mezi obcemi Komárno a Iža; Patince-kúpele.

Sideritis montana L. — Travnaté porosty a písčité půdy. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; stránky mezi dvory Horáreň a Žltý dom; sz. od obce Šrobárová; kóta 212 m a Suchý vrch v okolí obce Modrany; sz. od obce Vojnice; dvor Mašan a Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča; dvor Slukoviny mezi obcemi Moča a Kravany n. D. KRIST (1937c); Chotín; FUTÁK (1962); Modrany a Drieňová hora.

Silene borysthenea (GRUNER) S. M. WALTERS — Zatravnělé váte písky. Mezi obcemi Nesvady a Bajč (Rókalyuk pusta); mezi obcemi Marcelová a Virt (Bašov kopec, kóta 131 m u dvora Mašan sv. od obce Virt). (Det. M. ŠOURKOVÁ.)

S. conica L. — Písčité půdy. Sv. od obce Imeľ (Rókalyuk pusta, vých. od obce Nesvady); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. plynule, např. Bašov kopec, dvor Mašan, Vetrný vršek, Domáňovská Pustatina atd.; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; písčoviště záp. od obce Dolný Peter. KRIST (1938); Chotín, (1939); Hurbanovo, majír Balázstag, vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo, Chotín, dvor Mária u obce Kravany n. D.; FUTÁK (1962); Moča.

S. dichotoma EHRH. — Pole a úhory. Lándor pusta sev. od obce Komárno; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; okolí obce Modrany (Suchý vrch, na sev. okraji obce); mezi obcí Šrobárová a dvorem Horáreň; sv. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, M. Haresás, Iža, Patince); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (Bašov kopec, Vetrný vršek, Virt, sev. od obce Žitavská Tůň).

Sium latifolium L. — Tůně a vlhké příkopy. Martovec; Komočín; Lándor pusta sev. od obce Komárno; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; mezi obcemi Komárno a Iža (Komárno-tehelňa, Haresás pusta).

Solanum dulcamara L. — Pobřežní křoviny a křovinaté stráně. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesíleš, Horný a Dolný Vek, Martovec, Komočín, Lándor pusta, Komárno-jatky); sev. od obce Chotín; Dulovec; již. od obce Domáňovská Pustatina; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, Iža); Suchý vrch a u hřbitova v obci Modrany. Rostliny na posledních dvou lokalitách jsou sbírány z výslunných suchých stanovišť a jsou nápadně mnohem užšími listy než z vlhkých stanovišť. Tyto úzkolisté populace si vyžadají dalšího taxonomického studia a není vyloučeno, že se jedná o odlišné taxóny.

Sonchus olerensis L. — Pole a úhory. Komárno-tehelňa; Ďulov dvor sv. od obce Komárno; Chotín; Marcelová; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň, Radvaň n. D.); mezi obcemi Modrany a Búč; sz. od obce Vojnice; Podunajské hony vých. od obce Moča.

Stachys annua L. — Pole a úhory. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovec; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

S. germanica L. — Křovinaté a travnaté stráně. Imeľ; u dvora Kotelnice sz. od obce Bajč; na

hrází řeky Nitry při lukách Komočín mezi obcemi Martovce a Lándor pusta; sz. od obce Šrobárová; na sev. okraji obce Modrany; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; Radvaň n. D.

Tanacetum vulgare L. — Druhotná stanoviště. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny. Kravany n. D.); Modrany; Vojnice; Búč; Nová Vieska.

Tetragonolobus maritimus (L.) Roth — Vlhké louky. Martovce; při silnici mezi železniční stanicí a obcí Chotín; při Dunaji mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, M. Haresás, Iža, Patince, Patince-kúpele, již. od obce Marcelová při Žitavě, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

Thalictrum flavum L. subsp. *flavum* — Vlhké louky. Timonova myslivna záp. od obce Bajč; Martovce; Komočín; Lándor pusta; Komárno-jatky; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Moča; Kravany n. D.

Thlaspi perfoliatum L. — Výslunné stráně, úhory. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

Thymelaea passerina (L.) Cass. et GERM. — Výslunné travnaté stráně. Mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; okolí obce Dulovce (Stará hora, dvor Lapos, Podbáj); vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; kóta 212 m a vinice sev. od obce Modrany. KRIST (1939); Radvaň n. D.; FUTÁK (1962); Žitavská Tůň a Modrany.

Tithymalus cyparissias (L.) Scop. — Meze, u cest a písité pudy. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Bohatá; Hurbanovo; Chotín; les Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter (Velká Kamenná Pustatina); Dulovce; Pribeta; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča, Kravany n. D.); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopece, dvor Mašan, Vetrný vršek, Domáňovská Pustatina, Virt); mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Močská Pustatina); Vojnice, Novoveské vinice.

T. esula (L.) Scop. — Travnaté porosty. Martovce; Komočín; Lándor pusta sev. od obce Komárno; železniční stanice Chotín; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, M. Haresás, Patince, Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

T. exiguus (L.) LAM. — Pole. Mezi obcemi Komárno a Lándor pusta; mezi obcemi Marcelová a Šrobárová; Močodla a Močská Pustatina mezi obcemi Modrany a Moča; sv. od obce Vojnice.

T. falcatus (L.) KLOTZSCH et GARCKE — Pole. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Dolný a Horný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín; Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárová; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Haresás pusta, kóta 112 m, Patince, Patince-kúpele, Žitavská Tůň, Moča, dvor Slukoviny); Modrany; Vojnice; Nová Vieska.

T. glareosus (PALLAS ex BIEB.) PROCH. subsp. *pannonicus* (HOST) CHRETEK et KŘÍSA — Travnaté meze podél silnice. Sz. okraj obce Mudroňovo asi 1,5 km od obce; obce Šrobárová u silnice na sv. okraji obce. KRIST (1939); u obce Šrobárová; FUTÁK (1962); Novoveské vinice.

T. helioscopia (L.) Scop. — Pole a ruderalní stanoviště. Bajč; Hurbanovo; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; mezi obcemi Komárno a Patince (Haresás pusta, kóta 112 m, Iža); Marcelová; Virt; Žitavská Tůň; Modrany; Vojnice.

T. lucidus (W. et K.) KLOTZSCH et GARCKE — Pobřežní křoviny a okraje tůní. Mezi obcemi Martovce a Lándor pusta plynule; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Iža; Patince; Patince-kúpele.

T. palustris (L.) HAW. — Stojaté vody a okraje tůní. Mezi obcemi Hurbanovo a Komárno (Sesíle, Horný Vek, Martovce, Komočín, Lándor pusta, při sev. okraji obce Komárno); mezi obcemi Komárno a Žitavská Tůň (Komárno-tehelňa, Haresás pusta, kóta 112 m, Iža, Patince, Patince-kúpele, Žitava záp. od obce Virt).

T. platyphyllos (L.) RAFIN. subsp. *platyphyllos* — Pole a druhotná stanoviště. Imeľ; Lándor pusta; Hurbanovo; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Komárno-tehelňa, Iža, Patince, Žitavská Tůň, Radvaň n. D., Moča); mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopece, Vetrný vršek, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt).

T. salicifolius (HOST) KLOTZSCH et GARCKE — Travnaté porosty a křovinaté suché stráně. Mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárová; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; u široké lesní cesty nedaleko kóty Nový les sev. od obce Modrany. KRIST (1937b); Drieňová hora; FUTÁK (1962); Drieňová hora a Novoveské vinice.

T. sequierianus (NECK.) PROCH. subsp. *sequierianus* — Váté písky a travnaté výslunné porosty. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); sz. od obce Šrobárová; Suchý vrch sv. od obce Modrany; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D. (Iža, Patince-kúpele, Radvaň n. D., dvor Slukoviny, Kravany n. D.); mezi obcemi Marcelová a Žitavská Tůň (jv. od obce, Bašov kopece, dvor Mašan, Vetrný vršek, Domáňovská

Pustatina, u obce Virt). KRIST (1937b) a OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora; KRIST (1937c): Chotín; FUTÁK (1962): Žitavská Tůň, Modrany, Drieňová hora.

T. virgatus (W. et K.) KLOTZSCH et GARCKE — Meze a stráně s travnatými porosty. Lándor pusta sev. od obce Komárno; mezi železniční stanicí a obcí Chotín; u lesa Čenka mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; vinice mezi obcemi Dolný Peter a Dulovce; stráně mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárova; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; Iža; Patince; Marcelová; Virt; Žitavská Tůň.

Tragopogon dubius Scop. subsp. *major* (Jacq.) Volkm. — Výslunné stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; sz. od obce Šrobárova; mezi obcemi Chotín a Dolný Peter; mezi obcemi Komárno a Iža (M. Haresás, Haresás pusta); okolí obce Modrany (sev. od obce, kóta 212 m, Suchý vrch); sv. obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Modrany a Moča (Močodla, Močská Pustatina); mezi obcemi Kravany n. D. a Moča. OSVAČILOVÁ (1956): Drieňová hora.

Trifolium arvense L. — Úhory a písčité půdy. Sv. od obce Imeľ; Rókalyuk pusta vých. od obce Nesvady; Timonova myslivna mezi obcemi Nesvady a Bajč; Chotín; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň).

Valerianella mixta (L.) DUF. — Travnaté porosty. U řeky Žitavy záp. od obce Virt; sev. od obce Žitavská Tůň (u lesa). HADAČ et CHRTEK (1968) uvádějí tento druh z Podunajské nížiny nejbližší od obce Čenkov.

V. olitoria (L.) POLL. — Podobná stanoviště jako u předešlého druhu a na úhorech. Bajč; Bobatá; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Komárno; Chotín; Iža; Patince; Pribeta; Dulovce; Dolný Peter; Marcelová; Šrobárova; Mudroňovo, Modrany; Vojnice; Virt; Žitavská Tůň; Radvaň n. D.; Moča; Kravany n. D.; Búč; Nová Vieska.

Verbena officinalis L. — Meze, pastviny, rumiště. Nesvady; Imeľ; Bajč; Hurbanovo; Horný a Dolný Vek; Martovce; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; Ďulov dvor; Chotín (mezi železniční stanicí a obcí); Dolný Peter; Pribeta; Marcelová; Šrobárova; Virt; mezi obcemi Komárno a Kravany n. D.; Modrany; Vojnice; Búč; Nová Vieska.

Veronica longifolia L. — Křoviny na vlhkých lukách. Komočín mezi obcemi Martovce a Lándor pusta.

V. prostrata L. — Výslunné stráně. Vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárova; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; mezi obcemi Patince a Kravany n. D. (Patince-kúpele, Radvaň n. D., Moča, dvor Slukoviny, Kravany n. D.).

V. serpyllifolia L. — Vlhké louky, u cest a v lesích. Dolný Vek; Komočín; Lándor pusta; Komárno-tehelňa; sev. od obce Chotín; mezi obcemi Dulovce a Pribeta; mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Pribetský les, Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice).

Vicia pannonica Cr. — Travnatá místa u cest. Martovce; Lándor pusta; v okolí obce Modrany (kóta 212 m a u hřbitova); Domáňovská Pustatina sv. od obce Virt; Močská Pustatina sz. od obce Moča.

V. pisiformis L. — Lesy mezi obcemi Pribeta a Vojnice (Nový les, Chrbát, sz. od obce Vojnice). KRIST (1937b) a FUTÁK (1962): Drieňová hora.

V. striata M. B. — Travnatá místa. Sz. od obce Šrobárova; mezi obcí Modrany a kótou Suchý vrch.

Vinca herbacea W. et K. — Křovinaté stráně a světlé háje. Mezi dvorem Horáreň a obcí Šrobárova; okolí obce Modrany (kóta 212 m, Suchý vrch); sz. od obce Vojnice; světlá místa u cest v lesích u kóty Nový les.

Xeranthemum annuum L. — Výslunné travnaté stráně. Mezi obcemi Imeľ a Bajč (sv. od obce, Rókalyuk pusta, Timonova myslivna); Chotín, Dolný Peter; okolí obce Dulovce (Stará hora, dvor Lapos); vrch Kurta záp. od obce Mudroňovo; mezi dvorem a obcí Šrobárova; okolí obce Modrany (Kamenica, kóta 212 m, Suchý vrch); mezi obcemi Šrobárova a Modrany; mezi obcemi Modrany a Vojnice; sz. od obce Vojnice; Novoveské vinice; mezi obcemi Marcelová a Radvaň n. D. (jv. od obce, Bašov kopec, dvor Mašan, Domáňovská Pustatina, Virt, Žitavská Tůň).

Literatura

- BERTOVÁ L. (1966): Príspevok k rozšíreniu *Doronicum hungaricum* Rehb. na Slovensku. — *Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.*, Bratislava, 12/1 : 63–66.
- DOSTÁL J. (1960): The phytogeographical region distribution of the Czechoslovak flora. — *Sborn. Čs. Společ. Zeměp.*, Praha, 65 : 193–202.
- FERÁKOVÁ V. (1969): Rozšíření druhu *Lactuca quercina* L. v Československu. — *Zpr. Čs. Bot. Společ.*, Praha, 4 : 145–154.
- FUTÁK J. (1962): Floristické poznámky z juhovýchodnej časti Západoslonského kraja. — *Sborn. Pr. Ochr. Přír. Západoslov. Kr.*, Bratislava, 1962 : 35–50.

- (1966): Fytogeografické členenie Slovenska. — In: FUTÁK J. [red.]: Flóra Slovenska. 1, p. 535—538. — Bratislava.
- HADAČ E. (1969): The distribution of *Galium silvaticum* L. and *G. Schultesii* Vest in Czechoslovakia. — Preslia, Praha, 41 : 39—60.
- HADAČ E. et J. CHRTEK (1968): *Valerianella mixta* (L.) Dufr. v Československu. — Preslia, Praha, 40 : 301—303.
- HEJNÝ S. (1960): Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in dem slowakischen Tiefebene. — Bratislava.
- HENDRYCH R. (1968): Ad floram regionis Filakoviensis in Slovacia addenda critica. — Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 1967 : 109—183.
- HOLUB J. (1962): Beitrag zur Taxonomie der Art *Senecio paludosus* L. — Novit. Bot. Hort. Bot. Univ. Carol. Prag., Praha, 1962 : 25—34.
- HOLUBOVÁ A. et Z. SLÁVIKOVÁ (1964): *Aristolochia clematitis* na území ČSSR. — Preslia, Praha, 36 : 294—305.
- KNAPP J. (1864): Correspondenz. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 14 : 221.
- KRIST V. (1937a): Floristické poznámky z jižního a jihozápadního Slovenska. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 19 (1936) : 50—57.
- (1937b): Dvě zajímavé lokality teplobytné květeny na jižním Slovensku. — Příroda, Brno, 30 : 13—16.
- (1937c): Příspěvek ke květeně písků na jižním Slovensku. — Příroda, Brno, 30 : 293—297.
- (1937d): Příspěvek k poznání květeny československé II. — Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, 238 : 1—17.
- (1938): Floristické poznámky ze Slovenska II. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 20 (1937) : 24 až 30.
- (1939): Floristické poznámky ze Slovenska III. — Sborn. Klubu Přírod. Brno 21 (1938) : 40 až 47.
- (1940): Halofytní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé uherské nížiny. — Pr. Mor. Přírod. Společ., Brno, 12/10 : 1—100.
- MÁJOVSKÝ J. (1961): *Cycloloma platyphyllum* (Michx.) Moq. a *Amarantus blitoides* S. Wats., dva nové druhy flóry Slovenska. — Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Comen., Bot., Bratislava, 6 : 391—405.
- MÁJOVSKÝ J. et A. JURKO (1956): Asociácia *Festuca pseudodalmatica*-*Inula oculus christi* na južnom Slovensku. — Biológia, Bratislava, 11 : 129—145.
- OSVAČILOVÁ V. (1956): Sukcesia na opustených viniciach juhozápadného Slovenska. — Biológia, Bratislava, 11 : 416—423.
- SCHILLER S. (1865): Aus Oberungarn. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 15 : 378—383.
- SKALICKÝ V. (1959): Einige taxonomische und phytogeographische Bemerkungen zu den tschechoslowakischen Arten der Gattung *Anthericum* L. — Acta Univ. Carol.-Biol., Praha, 1959 : 117—157.
- (1965): *Gratiola officinalis* L. in der Tschechoslowakei mit einigen Bemerkungen zur phytogeographischen Gliederung der Tschechoslowakei. — Preslia, Praha, 37 : 289—298.
- Soó R. (1968): A magyar flóra és vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve. 3. — Budapest.
- STARÝ F. (1952): Farmakobotanická monografie *Adonis vernalis* L. — Preslia, Praha, 24 : 3—40.
- SVOBODOVÁ Z. (1966a): Nové lokality a rozšírenie niektorých adventívnych rastlín, ruderalov a burín. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 13 : 171—175.
- (1966b): Nové lokality a rozšírenie niektorých lúčnych a močaristých druhov rastlín. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 14 : 181—186.
- SVOBODOVÁ Z. et V. REHOŘEK (1964): Príspevok k flóre povodia Ipľa. — Acta Fytotechnica Univ. Agricult. Nitra 10 : 183—190.
- ZAHRADNÍKOVÁ K. (1967): Príspevok k rozšíreniu *Galium silvaticum* L. a *G. schultesii* Vest. — Biológia, Bratislava, 22 : 132—142.

Došlo 12. ledna 1971
Recenzenti: V. Jirásek, V. Rehořek