

Príspevek ke květeně Dražanské vrchoviny. — II. Část speciální

Beitrag zur Flora des Drahaner Plateaus. — II. Spezieller Teil

Vladimír Řehořek

ŘEHOŘEK V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. — II. Část speciální. [Beitrag zur Flora des Drahaner Plateaus. — II. Spezieller Teil.] — Preslia, Praha, 44 : 67—87. — In diesem zweiten Teile seines Beitrages gibt der Verfasser eine ausführliche Liste der Pflanzensippen, die er während mehrjähriger Erforschung des untersuchten Gebietes gefunden hat. Die Liste umfasst 513 Arten bzw. Unterarten von Gefäßpflanzen mit angeführten Fundorten. Weitere 142 im Gebiet allgemein verbreitete Sippen sind am Ende des Beitrages ohne Fundorte alphabetisch angeordnet. — *Sídl. Chrenová, bl. A-12, Nitra, Tschechoslowakei.*

V této druhé části svého příspěvku podávám přehled druhů zjištěných v území vymezeném v I. části (ŘEHOŘEK 1971). V seznamu uvádím všechny nalezené druhy včetně obecných, abych tak podal pokud lze úplný a reprezentativní obraz o flóře tohoto území, který bude možno s určitými doplňky rozšířit na celou kulmovou část Dražanské vrchoviny. Druhy v území obecné uvádím na konci příspěvku v abecedním výčtu bez udání lokalit. Ostatní vzácnější druhy nebo takové, které jsou charakteristické pro typické vegetační útvary, uvádím i s lokalitami. Pokud jsem sledoval blíže rozšíření určitého druhu v území, vyjadřuji slovně i hojnost jeho zastoupení. Jinak udávám jen bezpečně zjištěné lokality, i když u většiny druhů bude jistě možno výčet lokalit rozšířit o mnoho dalších. Kromě toho jsou do příspěvku zahrnuty i ojedinělé nálezy z okolí Boskovic.

Během tisku I. části příspěvku jsem zjistil v oblasti kulmové paroviny výskyt některých ruderalních druhů, jako *Arctium tomentosum*, *Artemisia vulgaris* a *Carduus acanthoides*, takže údaj o jejich absenci zde je nutno opravit. Jejich výskyt souvisí se zvýšenou frekvencí na komunikacích a se vznikem příhodných stanovišť (zbořeniště opuštěných domů a jiná zruderalizovaná místa).

Sledovaného území si v minulosti všímalo poměrně málo autorů. Z dříve publikovaných prací mají k této oblasti vztah např. některé příspěvky Spitznerovy (SPITZNER 1883, 1885, 1886, 1887a, 1887b, 1888, 1893), který kromě jiného zpracoval zdejší ostružiníky, avšak všímá si spíše východních svahů Dražanské vrchoviny. Některé jeho nálezy od Protivanova uvádí FORMÁNEK (1887—1897), často se mi je však nepodařilo potvrdit. Dále si tohoto území poněkud všímá J. ŠMARD (1934, 1936, 1951, 1963). Též F. ŠMARD (1961) přináší z posledních let řadu nálezů z okolí Horního Štěpánova, Kořence a Knínice. Z komplexů vrchovišť a rašelinných luk u Pavlova a Horního Štěpánova publikoval nálezy některých vzácnějších druhů TOVÁREK (1966). Okrajově se uvedené části Dražanské vrchoviny dotýkají NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1968 až 1969), kteří uvádějí některé nálezy od Protivanova, Ždárné, Suchého, Valchova, Vratkova, Boskovic, Sudic, Vážan, Knínice a Šebetova, dále KAVKA (1961) několika lokalitami od Horního Štěpánova, Protivanova a Bukové, a částečně též KÜHN (1968).

Některými údaji o výskytu vzácnějších druhů mi přispěli též amatérští botanici z řad učitelů, jakož i ing. V. Kavka, pracovník Okresního muzea v Prostějově. Svoje záznamy o výskytu polních plevelů v uvedené oblasti mi poskytl k publikaci doc. dr. F. Kühn CSc., který mi podobně jako prof. dr. E. Hadač CSc. přispěl též některými literárními údaji. Rod *Euphrasia* revidoval doc. dr. M. Šmejkal CSc., rod *Salix* doc. ing. J. Chmelař CSc. Subfossilní zbytky dřeva z rašelin určil dr. E. Opravil CSc. Všem vzdávám na tomto místě srdečný dík. Za cenné připomínky k rukopisu děkuji kromě toho dr. J. Holubovi CSc.

Doklady uvedených druhů, hlavně kritických, jsou uloženy v mém herbáři. Názvy druhů uvádím většinou podle ROTHMALER et al. (1963), zčásti podle TUTIN, HEYWOOD et al. (1964, 1968), řidčeji podle jiných pramenů.

Abies alba MILL. — Místy v bučinách (Vosovec u Kořence, svahy Mojetína k Bělé aj.) i v kulturních smrčínách, jako např. u vrchoviště u Pavlova. Další lokality z okolí Boskovic a od Suchého uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

Acer campestre L. s. l. — Hojně v okolí Boskovic (viz též NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969). Chybí na kulmové parovině, proniká např. na úpatí jižních svahů v údolích asi do 520 m n. m. (úpatí Hradu v údolí Bělé S od Kořence).

A. platanoides L. — Poměrně zřídka v lesích (např. Dubina S od Kořence), někdy vysazován ve stromořadích.

A. pseudoplatanus L. — Hojný v lesích, zvl. v údolích potoků a na sutích, jako např. v údolí Višňáku J od Kořence.

Achyroporus maculatus (L.) SCOP. — FORMÁNEK (1887—1897) uvádí SPITZNERŮV údaj „u Protivanova a Bukové poblíž Boskovic“. Sám jsem jej nikde v území nesbíral.

Acorus calamus L. — Podle TOVÁRKA (1966) roste v tůňkách u silnice u Pohory. KAVKA (in litt.) jej sbíral u Pavlova.

Actaea spicata L. — Roztroušeně ve vlhkých stinných lesích. Knínice: Žlíbky. Kořence: Dubina. Od Kořence a Horního Štěpánova ji uvádí též F. ŠMARDA (1961).

Agrostis canina L. — Na rašelinných loukách dosti hojně. Pavlov: u dolního rybníka a pod lesem na svahu Paprče; vrchoviště. Benešov: nad silnicí k Suchému. Suchý: na břehu velkého rybníka; rašelinné louky pod horním rybníkem. Kořence: údolí Pohorského potůčku; Pastvisko; louky na S a Z okraji obce. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Buková: rašelinná louka JZ od obce. Protivanov: u Sklené Huti a u pramenů potůčku Z od obce. Horní Štěpánov: v Podivení a u pramenů Úsobrnky.

Alchemilla acutiloba ORIZ — Kořence: u kamenic za humny a na lukách S od vsi. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. KAVKA (1961) ji uvádí od Bukové.

A. glabra NEYGEF. — Kořence: Pastvisko; louky v údolí Bělé u soutoku s Pohorským potůčkem. Suchý: rašelinná louka pod horním rybníkem. Horní Štěpánov: u pramenů potůčku v Podivení. Okrouhlá: v údolíčku Z od vsi. Pavlov: v příkopu u cesty k vrchovišti. U Pavlova ji sbíral též KAVKA (in litt.).

A. glaucescens WALLR. — Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. Kořence: pastvina na Skalce; louky v údolí Kořeňáku pod Skalkou; u cesty za humny a na mezích a lukách S od vsi; na rašelinných loukách v údolí Bělé S od obce. Okrouhlá: suchá louka na Stádliskách. Suchý: rašelinná louka pod horním rybníkem.

A. gracilis ORIZ — Kořence: louky v údolí Kořeňáku pod Skalkou; na zahradě domu čp. 75; u kamenic za humny a na louce S od vsi; v lese Dubina. Pavlov: louky a rašeliniště u dolního rybníka.

A. monticola ORIZ — Nejhojnější zástupce rodu, obecný na lukách, mezích i v lesích.

A. ranthochlora ROTHM. — Kořence: u cesty za humny a na vlhkých loukách S od vsi; v údolí Bělé a Pohorského potůčku; u silnice k Šebetovu. Pavlov: u cesty poblíž vrchoviště.

Alisma plantago-aquatica L. — Kořence: v příkopu v údolí Bělé S od vsi. Šebetov: v zatopeném zákopu v lese u kamenolomu. Horní Štěpánov: v mlýnském rybníce.

Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA et GRANDE — Boskovice: Pílské údolí, cesta k zámku aj. Na kulmu chybí.

Allium oleraceum L. — Kořence: kamenice u lesa S od vsi.

A. montanum F. W. SCHMIDT — Boskovice: skály na Zámeckém kopeci (granitit brněnské vyvěliny).

Alnus glutinosa (L.) GAERTNER — Hojná kolem potoků a na lesních mokřadech. Mnoho zbytků olšového dřeva bylo ve vybagrovaném rašeliništi u dolního rybníka u Pavlova.

A. incana (L.) MOENCH — Pavlov: rašelinný les u cesty k Brodku. Kořence: údolí Bělé; údolí Kořeňáku „Pod Vodákovou“ směrem k Melkovu. Vážany: v doubravě na svahu Vejstíce.

Alopecurus aequalis SOBOL. — Pavlov: na bahně u dolního rybníka.

Alyssum alyssoides (L.) L. — Boskovice: na mezi u cesty na Vinohrádky. Ve vyšších polohách na kulmu chybí.

Anemone nemorosa L. — Kořence: louky SZ od obce a u silnice k Šebetovu; vlhké louky v údolí Bělé. Melkov: v křoví u soutoku Višňáku s Bělou. Pavlov: louky a rašeliniště u dolního rybníka. Suchý: louka pod horním rybníkem.

A. ranunculoides L. subsp. *ranunculoides* — Kořence: pod křovím v údolí Bělé na úpatí Hradu.

Angelica sylvestris L. — Kořence: v kamenici za humny; louky v údolí Kořeňáku pod Skalkou a v údolí Bělé S od vsi; louka na S okraji obce. Horní Štěpánov: rašelinná louka u pramenů Úsobrnky a v Podivení.

Antennaria dioica (L.) GAERTNER — Kořence: louky S od vsi; Pastvisko; Skalka. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. Okrouhlá: Stádliska. Pavlov: vysychající rašeliniště pod lesem na svahu Paprče; suché louky u rašeliniště na pravém břehu dolního rybníka (viz též TOVÁREK 1966).

Anthemis x adulterina WALLR. — Vznikl spontánní hybridizací v zahradě domu čp. 75 v Kořenci z planě rostoucího *A. arvensis* L. a vysazeného a zplanělého *A. tinctoria* L.

A. tinctoria L. — Knínice: pod lesem ve Žlibkách. Boskovice: Čížovky; Vinohrádky (viz J. ŠMARD 1934). Na kulmu chybí.

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. — Kořence: údolí Višňáku J od obce; v zahradách a sadech ve vsi.

Apera spica-venti (L.) P. BEAUV. — V poslední době se velmi šíří v obilninách např. u Kořence. Též na polích u Pohory (KÜHN).

Aphanes arvensis L. — Pohora: na polích směrem k Novým Sadům u Horního Štěpánova (KÜHN).

Arabis thaliana (L.) HEYNH. — Kořence: meze a vyčesaná místa v jetelištích S od obce; velmi hojně jako plevel na zahradě domu čp. 75. Pohora: na polích (KÜHN).

Arctium tomentosum MILL. — Kořence: v r. 1971 několik exemplářů podél silnice ve vsi. Jinak hojný druh na Malé Hané.

Arenaria serpyllifolia L. — Šebetov: na polích (KÜHN) a v kamenolomu nad Kapoučaty. Kořence: na mezi S od vsi.

Armoracia lapathifolia USTERI — Kořence: na louce u potoka při cestě do Melkova, pravděpodobně zplanělá.

Artemisia absinthium L. — Vážany: okraj lesa na úpatí Vejstice. Od Sudie ji uvádí F. ŠMARD (1961).

A. vulgaris L. — Kořence: v r. 1971 několik exemplářů za školou u potoka a kolem domovních zdí.

Arnica dioica (WALTER) FERNALD — Na jediném místě v rokli pod Třemi rybníčky u Boskovic v r. 1950.

Asplenium ruta-muraria L. — Kořence: vápencové skalky na úpatí Mojetína v údolí Bělé u bývalé vápenky.

A. septentrionale (L.) HOFFM. — Kořence: kamenice pod Paprčí. Boskovice: skály na Zámeckém kopci.

A. trichomanes L. s. l. — Kořence: Skalka (kulmské slepence); skály na úpatí Hradu (kulmské droby) a u bývalé vápenky na úpatí Mojetína (devonský vápence) v údolí Bělé.

Astragalus glycyphyllos L. — Kořence: Dubina; na zahradě domu čp. 75; v údolí Višňáku J od obce. Od Sudie ho udává F. ŠMARD (1961).

Astrantia major L. — Kořence: v sadu za kulturním domem; ve smrčíně u cesty k Melkovu. Pohora: v lese u Barborky. Knínice: u cesty mezi Mojetínem a Příhonem.

Athyrium filix-femina (L.) ROTH — Hojná hlavně ve vlhčích lesích. Knínice: Žlibky. Kořence: kamenice pod Paprčí; Dubina; na svahu Mojetína k Bělé; v údolí Kořenáku směrem k Melkovu.

Atriplex patula L. — Šebetov: okraj lesa SV od obce (KÜHN). Na celé kulmové parovině chybí.

Atropa bella-donna L. — Kořence: Hrad; Vlčí skála; údolí Višňáku; Dubina. Okrouhlá: okraj lesa na Stádliskách.

Avena fatua L. — Kořence: zřídka jako plevel na polích. Buková: na polích směrem k Protivanovu (KÜHN).

Avenochloa pubescens (HUDS.) HOLUB — Pavlov: rašelinné louky u dolního rybníka. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Kořence: louka na S okraji obce a pod Koudelkovou skalkou SZ od vsi; louky v údolí Bělé. Suchý: na loukách pod horním rybníkem. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení.

Ballota nigra L. subsp. *nigra* — Kořence: zřídka v kamenicích ve vsi.

Barbarea vulgaris R. BR. — Kořence: pole u silnice k Šebetovu.

Batrachium aquatile (L.) DUMORT. — Suchý: ve velkém rybníce při horním okraji; v potůčku pod horním rybníkem. Protivanov: v potůčku Z od vsi.

Berteroa incana (L.) DC. — Boskovice: Vinohrádky; Zámecký kopeček. Ve vyšších polohách na kulmu chybí.

Betonica officinalis L. — Kořence: na mezi S od vsi. Vážany: okraj lesa na úpatí Vejstice. Od Sudie ji uvádí F. ŠMARD (1961).

Betula pubescens EHRL. s. str. — Pavlov: vrchoviště; „Suchý les“. Horní Štěpánov: ve skupině stromů Z od cesty z Pavlova do Brodku; louka na JZ svahu Babylonu Z od vsi; rašelinná louka pod prameny Úsobrnky. Protivanov: u potůčku Z od vsi. Zbytky březového dřeva, pravděpodobně z tohoto druhu, jsou hojně v rašelině na vrchovišti u Pavlova.

Bidens cernuus L. — Pavlov: na bahnitěm břehu dolního rybníka. Podle TOVÁRKA (1966) byl v Podivení u Horního Štěpánova jako na jediné lokalitě nalezen *B. cernuus minimus* (asi *B. cernuus f. nanus* NEILR. = var. *minimus* BOISS.).

B. tripartitus L. — Kořence: na rumišti ve vsi; na bahně v mokřadu pod Uhlířovou studánkou.

Bilderdykia convolvulus (L.) DUMORT. — Šebetov: na polích (KÜHN). Pohora: na polích směrem na Nové Sady (KÜHN). Kořence: pole u větrného mlýna; na zahradě domu čp. 75.

Blechnum spicant (L.) ROTH — Jediný trs této kapradiny našly lesní dělnice 22. 11. 1959 pod

Komárkovými skalami (kóta 691 m) u Kořence ve vzrostlé smrčíně na obvodě kotlíku s náletem smrku. Trs byl bohužel vyrýpnut a přesazen do květináče, kde uhynul. V červenci 1961 byla na lokalitě ještě 1 malá růžice listů, vyrostlá ze zbytku oddenku. V r. 1965 nebylo už po ní ani stopy. Ačkoliv jsem podrobně prohledal blízké okolí, nepodařilo se mi nalézt jiný exemplář.

Blasmus compressus (L.) PANZER — Kořence: na jílovitém břehu potoka Kořeňáku na Pastvisku blízko pramene.

Brachypodium pinnatum (L.) P. BEAUV. — Kořence: pod trnkovými keři v Koudelkové skále SZ od vsi.

B. sylvaticum (HUDS.) P. BEAUV. — Šebetov: Mojetín, v lese za kamenolomem. Kořence: u staré cesty k Šebetovu na svazích Mojetína. Okrouhlá: u potůčku nad Melkovem.

Bromus benekenii (LANGE) TRIMEN — Kořence: spontánně na zahrádě domu čp. 75.

B. mollis L. — Ve vyšších polohách jen ojediněle a přechodně. Kořence: na staré cestě k Šebetovu na svazích Koziny.

Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH — Vážany: Vejstice, v rokli u potůčku. Od Suchého a Žďárné ji udávají NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

C. villosa (CHAIX) GMELIN — Pavlov: na okraji lesa („Suchý les“) u vrchoviště. Též u Suchého a Žďárné (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Calamintha acinos (L.) CLAIRV. — Kořence: mez na okraji lesa Kostnice Z od vsi. Šebetov: u cesty na hřebeni Mojetína.

C. clinopodium SPENNER — Šebetov: u cesty na hřebeni Mojetína. Kořence: úpatí J svahu Hradu v údolí Bělé. Od Kořence a Horního Štěpánova ji uvádí též F. ŠMARD (1961).

Callitriche palustris L. — Pavlov: lesní tůňka pod komplexem rašelinných luk. Kořence: v tůňkách na Pastvisku.

Calluna vulgaris (L.) HULL — Dostí hojný na chudobných substrátech. Kořence: pastvina na Skalec; louka na S okraji obce. Pohora: v lese na Karlově. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. Pavlov: na vysychajícím rašeliníšti u lesa pod Paprčí; sušší louky vedle rašelinných luk na pravém břehu dolního rybníka. Okrouhlá: Stádliska.

Camelina alyssum (MILL.) THELL. — SPITZNER ji podle FORMÁNKA (1887–1897) uvádí od Protivanova. Sám jsem ji nenašel.

C. microcarpa ANDRZ. ex DC. — Boskovice: úhor na Vinohrádech.

Campanula glomerata L. subsp. *glomerata* — Boskovice: při lesní cestě na Vinohrádech.

C. persicifolia L. — Kořence: úpatí Hradu v údolí Bělé. F. ŠMARD (1961) ji uvádí od Kořence a Vratíkova. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) zaznamenávají 2 lokality z okolí Šebetova.

C. trachelium L. — Šebetov: u zdi zámeckého parku; v kamenolomu nad Kapouňaty. Kořence: při silnici k Šebetovu u hájovny. Knínice: Žlábky. Ze 2 lokalit v údolí Bělé v okolí Boskovic ji uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

Cardamine amara L. s. str. — Kořence: údolí Bělé pod silnicí k Šebetovu. Horní Štěpánov: u pramenů potůčku v Podivení. Protivanov: u pramenů potůčku Z od vsi.

Cardaria draba (L.) DESV. — Kolem Boskovic hojná, na kulmu vyšších poloh chybí.

Carduus acanthoides L. — Boskovice: Vinohrádky. Šebetov: Mojetín, u kamenolomu. Na kulmu vyšších poloh zřídka, v r. 1971 několik exemplářů na zbořeníšti v Kořenci vedle domu čp. 75.

Carex acuta L. emend. REICHARD — Suchý: horní okraj velkého rybníka. Kořence: údolí Bělé u bývalé hájenky S od vsi; lesní mokřina v průseku na V svahu Paprče. Pavlov: rašelinné louky u dolního rybníka; v tůňkách po těžbě rašeliny na vrchovišti.

C. acutiformis EHRH. — Pavlov: rašeliníště na pravém břehu dolního rybníka. Lokalita je dnes zničena vybavrováním ložiska.

C. brizoides JUSS. — Pavlov: lesní prameniště pod dolním rybníkem; na sušších místech mezi rašelinnými loukami. Horní Štěpánov: louky v Podivení. Protivanov: rašelinné louky u Sklené Huti. Okrouhlá: u potůčku SZ od vsi. Kořence: louka SZ od vsi; na okraji lesa u cesty do Horního Štěpánova; na loukách v údolí Bělé a Pohorského potůčku. Od Žďárné ji udávají NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

C. caespitosa L. — Kořence: v údolí Bělé pod bývalou hájenkou a při Pohorském potůčku vzácně.

C. canescens L. — Pavlov: vrchoviště, na okraji tůně po vyrýpané rašelině; lesní prameniště pod dolním rybníkem. Kořence: údolí Bělé pod bývalou hájenkou; Pastvisko. Suchý: na břehu velkého rybníka.

C. caryophyllaea LATOURR. — Na výslunných mezích a sušších loukách hojná, značně variabilní. Na louce SZ od Kořence jsem ji našel ve zvláštní odchylce s dlouze stopkatým dolním samičím kláskem, oddáleným až k basi lodyhy [var. *caryophyllaea* subvar. *pedunculata* (BЕCK.) ASCH. GR.].

C. contigua HOPPE — Kořence: údolí Bělé S od vsi; údolí Kořeňáku pod vsí u cesty k Melkovu; u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny.

C. demissa HORNEM. — Kořenec: rašelinné louky na Pastvisku. Podle FORMÁNKA (1887—1897) uvádí SPITZNER od Protivanova *C. oederi* RETZ; jde pravděpodobně o *C. demissa*.

C. digitata L. — Nepříliš hojná ve zbytkech listnatých lesů i v kulturních smrčinách, zde většinou sterilní. Kořenec: Dubina; svah Mojetína k Bělé. Šebetov: Mojetín. Knínice: na svazích Příhonu. Též u Boskovic, Žďárné a Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

C. elongata L. — Kořenec: mokré louky v údolí Bělé pod bývalou hájenkou a v údolí Pohorského potůčku. Suchý: na břehu velkého rybníka.

C. flacca SCHREB. subsp. *flacca* — Kořenec: u cesty na vlhké pasece na svahu Mojetína do údolí Bělé. Knínice: lesní mokřad mezi Mojetínem a Příhonem: Žlíbky.

C. flava L. — Kořenec: Pastvisko; louky v údolí Bělé u soutoku s Pohorským potůčkem a pod bývalou hájenkou S od vsi. Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem (zde též ve zvláštní formě s větveným dolním samičím kláskem). Knínice: lesní mokřad mezi Mojetínem a Příhonem.

C. hirta L. — Na loukách dosti hojná. V údolí Bělé S od Kořence též ve var. *hartiformis* PERS.

C. leporina L. — Na lesních cestách a vlhkých loukách a pastvinách dosti hojná, např. na Pastvisku u Kořence, v lese na V svazích Paprče k rašelinným loukám u Pavlova aj.

C. muricata L. s. str. (= *C. pairaei* F. SCHULTZ) — Kořenec: Koudelkova skalka SZ od vsi.

C. nigra (L.) REICHARD subsp. *nigra* — Na rašelinných loukách u Kořence, Pavlova, Benešova, Okrouhlé, Suchého, Protivanova, Bukové, Horního Štěpánova aj. hojná. Též v kamenicích mezi poli pod Papří u Kořence.

C. pallescens L. — Kořenec: louka S od vsi a v údolí Bělé; paseka u cesty na svahu Mojetína k Bělé, Benešov: louka u Rašého potoka. Suchý: rašelinná louka pod horním rybníkem.

C. panicea L. — Na rašelinných loukách u Kořence, Benešova, Pavlova, Okrouhlé, Suchého, Protivanova, Bukové, Horního Štěpánova a j. hojná.

C. paniculata JUSL. — Pavlov: rašeliniště pod dolním rybníkem. Suchý: rašelinná louka pod horním rybníkem. Horní Štěpánov: u pramenů potůčku v Podivení.

C. pilosa SCOR. — Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem. Jde asi o jednu z lokalit (Sudice, Knínice), které uvádí F. ŠMARDA (1961). NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji sbírali u Šmelcovny u Boskovic.

C. pilulifera L. — Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. Pavlov: louka u dolního rybníka vedle rašeliniště a u cesty k vřehovišti. Kořenec: Pastvisko; Skalka; louky v údolí Bělé S od vsi; na vlhké pasece na svahu Mojetína k Bělé. Pohora: v bučině na J svahu Bašty.

C. remota GRUEB. — Kořenec: u potoka při cestě k Melkovu; v údolí Višňáku. Knínice: u potůčku ve Žlíbkách.

C. rostrata STOKES — Protivanov: rašelinné louky pod Sklenou Hutí; u potůčku Z od vsi a na louce u jeho pramenů. Suchý: břeh velkého rybníka. Pavlov: v potůčku pod dolním rybníkem, na břehu rybníka a u okolních rašelinných loukách. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení; pod prameny Úsobrnky. Kořenec: v údolí Pohorského potůčku.

C. stellulata GOOD. — Kořenec: Pastvisko; lesní mokřiny na V svahu Paprče; v údolí Bělé u bývalé hájenky S od vsi. Pavlov: lesní prameniště pod dolním rybníkem; rašelinné louky kolem dolního rybníka a u lesa na svahu pod Papří. Benešov: u lesa vlevo od silnice ke Kořenci. Pohora: vlhká lesní cesta na Baště. Protivanov: rašelinné louky pod Sklenou Hutí.

C. sylvatica HUDS. — Kořenec: lesní prameniště vlevo od cesty k Melkovu v údolí Kořenáku.

C. vesicaria L. — Suchý: na březích velkého rybníka a kolem potůčku napájejícího rybník. Pavlov: u potůčku v rašelinných loukách pod dolním rybníkem a v lesním prameništi. Kořenec: v údolí Bělé u bývalé hájenky S od vsi.

Carlina acaulis L. subsp. *acaulis* — Kořenec: Skalka; Koudelkova skalka SZ od vsi; meze v polích na svahu k Bělé; louka S od vsi („Pod Uhlířovým“); u staré cesty k Benešovu za větrným mlýnem; a mezi u lesa J od obce, zde též ve f. *elongata* MEUSEL et K. WERNER. Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. Z luk v údolí Bělé pod Horním Štěpánovem ji uvádí F. ŠMARDA (1961).

C. vulgaris L. — Velmi hojná ná úhorech na Vinohrádech u Boskovic. Ve vyšších polohách zřídka. Kořenec: na mezi u cesty v polích směrem k Bělé SZ od vsi.

Carpinus betulus L. — Nepříliš hojný v kulmové části vřehoviny, kde bývá vysazován do ochranných lesních pláští. Častější jen asi do 500—550 m n. m. v údolích potoků na úpatích svahů (údolí Bělé S od Kořence), dále kolem Kníne a Vážan (Příhon, Vejstice), Boskovic (Vinohrádky) apod. Též u Žďárné (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Carum carvi L. — Okrouhlá: louky na Stádliskách. Kořenec: louky v údolí Bělé S od vsi.

Centaurea jacea L. subsp. *subjacea* (BECK) HYL. — Kořenec: louka za větrným mlýnem. Melkov: údolí Višňáku pod Vlčí skálou.

C. stoebe L. s. str. — Boskovice: Vinohrádky.

Centaureum minus MOENCH subsp. *minus* — Kořenec: travnatá cesta na J svahu Hradu. Knínice: Žlíbky. Vážany: vlhká cesta na úpatí Vejstice. Šebetov: u cesty na hřebeni Mojetína.

Cerasus avium (L.) MOENCH subsp. *avium* — Ojedíněle ve světlých lesích (zplanělá?). Kořenec: Dubina.

Chaerophyllum aromaticum L. — Kořenec: podél Bělé od silnice do Šebetova k soutoku s Kořenákem velmi hojně; na svahu Mojetína k Bělé; na zahradě domu čp. 75. Od Šebetova a Protivanova ji uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

C. hirsutum L. — Pavlov: svahové rašeliniště pod silnicí k Bukové; v příkopu v bučině pod Paprčí. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení, Protivanov; rašelinné louky u Sklené Huti. Kořenec: rašelinné louky v údolí Bělé a Pohorského potůčku. Další lokality (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969): Šmelcovna u Boskovic; Vratíkov; mezi Protivanovem a Malým Hradiskem.

Chamaecytisus supinus (L.) LINK — Kořenec: loučka SZ od vsi; Koudelkova skalka; V a J okraj Dubiny; mez u cesty do údolí Bělé. Okrouhlá: Stádliska. Horní Štěpánov: vřesoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení. Vážany: Vejštiec.

Chenopodium bonus-henricus L. — Kořenec: ve vsi na okraji silnice. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) je uvádějí z Boskovic.

C. polyspermum L. — Kořenec: jako plevel na zahradě domu čp. 75, v posledních letech stále hojnější; též na polích.

Chrysosplenium alternifolium L. — Kořenec: údolí Višňáku; vlhká paseka na svahu Mojetína k Bělé. Horní Štěpánov: u Bělé v trati „Drahoňov“.

Cichorium intybus L. subsp. *intybus* — Na kulmu vyšších poloh chybí, nejvýše u silnice pod vápencovým kamenolcem nad Kapouňaty u Šebetova (asi 490 m n. m.).

Circaea alpina L. — Horní Štěpánov: v údolí Bělé pod Baštou v trati „Drahoňov“, Kořenec: u starého ramene Bělé pod soutokem s Pohorským potůčkem.

C. × intermedia EHRH. — Kořenec: v údolí Kořenáku u cesty k Melkovu „Pod Vodákovou“.

C. lutetiana L. — Kořenec: prameniště vlevo od cesty k Melkovu „Pod Vodákovou“. Knínice: u potůčku ve Žlíbkách.

Cirsium canum (L.) ALL. — Šebetov: na okraji vápencového kamenolcu nad Kapouňaty (asi 500 m n. m.).

C. oleraceum (L.) Scop. — Kořenec: louky pod vsí a v údolí Bělé. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení. Okrouhlá: u potůčku Z od vsi. Boskovice (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

C. salisburgense (WILLD.) G. DON — Na údolních a rašelinných loukách kolem Kořence Benešova, Pavlova, Okrouhlé, Suchého, Horního Štěpánova, Protivanova a Bukové hojně. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) je uvádějí též od Šebetova, Vratíkova a Ždárné.

C. vulgare (SAVI) TENORE subsp. *sylvaticum* (TAUSCH) DOSTÁL — Šebetov: Mojetín, v lese v příkopu u cesty na hřebeni.

Clematis recta L. — Boskovice: Vinohrádky (viz též KÜHN 1968). F. ŠMRDA (1961) jej uvádí od Sudie, kde roste na okraji lesa na Vejštieci.

Coeloglossum viride (L.) HARTM. — Jen v několika exemplářích na jediném místě na Pastvísku u Kořence. Lokality zanikla při rekultivaci pastvím koncem padesátých let.

Colchicum autumnale L. — Hojný na lukách u Kořence, Benešova, Suchého, Okrouhlé a j. S od Kořence v údolí Bělé roste var. *vernum* SCHRANK. V údolí Pohorského potůčku a v údolí Bělé pod Melkovem směrem k Boskovicím (Melkovské údolí) se vyskytuje forma s jarními zelenými květy.

Consolida regalis S. F. GRAY subsp. *regalis* — Hojná např. u Boskovic (viz též NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969), Šebetova (KÜHN) apod. Na kulmu vyšších poloh ještě na polích mezi Vratíkovem a Okrouhlou, v nadmořské výšce kolem 500 m.

Convallaria majalis L. — Hojná u Boskovic, např. na Vinohrádcích a v Lipníkách; NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí též od Šmelcovny, Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem. Šebetov: u silnice pod kamenolcem nad Kapouňaty. Kořenec: pod Dubínou u Bělé.

Coronilla varia L. — Šebetov: na mezích nad Kapouňaty. Kořenec: v údolí Bělé S od vsi, 550 m n. m. (nejvyšší zjištěná lokalita).

Crataegus laevigata (POIRET) DC. — Kořenec: na mezích a v kamenicích mezi poli. Šebetov: u cesty na Mojetín za lomem.

C. monogyna JACQ. — Kořenec: okraj lesa S od vsi.

Crepis biennis L. — Okrouhlá: u můstku při cestě k Melkovu. Kořenec: v údolí Bělé u silnice k Šebetovu a dále až do Melkova. Šebetov: na okraji kamenolcu nad Kapouňaty. Knínice: Žlíbky.

C. paludosa (L.) MOENCH — Na rašelinných loukách dosti hojná; Pavlov, Horní Štěpánov, Kořenec, Suchý, Protivanov (viz též NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

C. succisifolia (ALL.) TAUSCH — Kořenec: louka na S okraji obce; rašelinné louky v údolí Bělé.

Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem. U Pavlova ji sbíral též KAVKA (in litt.), který ji kromě toho uvádí i z mokřiny v lese u Bukové (KAVKA 1961).

Crocus heuffelianus HERB. — Na lokalitu, kterou uvádí F. ŠMARD (1961), jehož údaj převzal i KÜHN (1968), byl jsem upozorněn říd. uč. Kočvarou, nepodařilo se mi však kvetoucí šafrán zastihnout. Našel jsem zde jen jarní exempláře očnímu, což ve mně vzbudilo podezření, že tu došlo k záměně těchto dvou druhů. F. ŠMARD (1966 in litt.) mi sdělil, že šlo skutečně o omyl ze strany řed. Fernlíka (nález byl publikován bez ověření pouze na základě jeho sdělení), který o tom sám F. Šmardu informoval nějaký čas po otištění jeho příspěvku. Na základě uvedených skutečností je tedy nutno *Crocus heuffelianus* škrtnout z květeny Dražanské vřehoviny.

Cruciatia lacripes OPIZ. — Kořence: na J úpatí Hradu a u silnice k Šebetovu v údolí Bělé.

Cuscuta epithymum (L.) NATH. — Okrouhlá: u mostku při cestě k Melkovu. Kořence: louka pod Papřčí: mez S od vsi (na *Centaurea jacea*).

Cystopteris fragilis (L.) BERNH. s. str. — Kořence: skály na úpatí Mojetína a Hradu v údolí Bělé; kamenice mezi poli pod Papřčí: na zídce ve vsi u domu čp. 28.

Dactylis glomerata L. — Jen na úrodnějších loukách (např. v údolí Bělé S od Kořence); na kulmové parovině proto pouze roztroušeně.

D. polygama HORVÁTOVSKÝ. — V lesích roztroušeně. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji sbírali u Protivanova.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó s. l. — Jen u Pavlova na okraji rašelinných luk u lesa pod Papřčí několik exemplářů.

D. majalis (REICHENB.) HUNT et SUMMERH. subsp. *majalis* — Na vlhkých až rašelinných loukách u Kořence, Benešova, Pavlova, Suchého, Žďárné, Protivanova, Horního Štěpánova a j. dosti hojně.

Daphne genkwa L. — Boskovice: Vinohrádky, na okraji lesa nad Mladkovem (leg. prof. K. PATOČKA); též na V svahu (viz J. ŠMARD 1934, KÜHN 1968).

D. mezereum L. — Dostí hojně, hlavně ve stinných lesích. Kořence: údolí Kořenáku u Melkova; údolí Višňáku a Bělé; též v kamenicích mezi poli u cesty do Horního Štěpánova. Šebetov: v lese za kamenolomem nad Kapouňaty. Melkov: u cesty do Boskovic v Melkovském údolí.

Daucus carota L. subsp. *carota* — Na mezích a sušších loukách na kulmu vyšších poloh roztroušeně. Okrouhlá: louky na Stádliskách; u mostku při cestě k Melkovu. Benešov: na mezi u silnice ke Kořenci. Kořence: v jetelišti J od vsi, Pavlov: na poli u rašelinných luk (KÜHN).

Dentaria bulbifera L. — NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí od Protivanova. Sám jsem ji nikde nesbíral.

D. enneaphyllus L. — Kořence: u cesty k Melkovu v údolí Kořenáku.

Descurainia sophia (L.) WEBB ex PRANTL — Ve vyšších polohách chybí, pouze u Pavlova na břázi dolního rybníka jsem našel 18. 7. 1961 jeden exemplář.

Dianthus armeria L. — Kořence: 1 exemplář se objevil v r. 1957 na trávníku na zahradě domu čp. 75. Možnost jeho zavlečení do těchto míst je těžko vysvětlitelná, v širokém okolí neroste.

D. carthusianorum L. subsp. *carthusianorum* — Boskovice: Vinohrádky (viz též J. ŠMARD 1934). Vážany: na okraji lesa pod Vejsticí. Mezi Knínicemi a Šebetovem ho sbírali NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

D. deltoidea L. — Kořence: Skalka; údolí Bělé: meze S od vsi. Okrouhlá: Stádiska. Též u Žďárné (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

D. superbus L. subsp. *superbus* — Boskovice: Vinohrádky, okraj lesa nad Mladkovem.

Digitalis grandiflora MILL. — Kořence: J svah Hradu. Od Kořence a Sudie ho udává též F. ŠMARD (1961). Boskovice: u silnice k Újezdu; odtud ho uvádějí též NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) vedle dalších lokalit z okolí Boskovic a Žďárné.

Diphasium complanatum (L.) ROTH. — Na více místech u Kořence: Dubina; průsek na S svahu Hradu: svahy Vlčí skály nad Melkovem, vesměs sterilní. V zrašelinělé smrčíně v trati Kocourův mezi Kořencem a Benešovem též plodné exempláře.

Drosera rotundifolia L. — Horní Štěpánov: rašelinná louka u pramenu Úsobrnky (cf. KAVKA 1961, TOVÁREK 1966), dosti vzácně; rašelinná louka v Podivení (TOVÁREK 1966). Pavlov: nad horním rybníkem (KAVKA in litt.). Na „vřehovišti“ u Pavlova byla její lokalita podle TOVÁRKA (1966) zničena těžbou rašeliny a melioracemi (vřehovištěm se zde asi myslí čockovitě vyklenuté rašelinisté přechodového typu na pravém břehu dolního rybníka, které bylo vybagrováno). Podle sdělení odb. uč. A. Hrouze rostla kdysi v lesním rašeliníšti v trati Kocourův u Kořence.

Dryopteris carthusiana (VILL.) H. P. FUCHS — Kořence: bučina na svahu Mojetína k Bělé: Dubina. Pavlov: „Suchý les“.

D. dilatata (HOFFM.) A. GRAY — Pavlov: v „Suchém lese“ vpravo od cesty k Brodku.

Echinops sphacrocephalus L. — Boskovice: Vinohrádky, na mezi u lesíka *Pinus banksiana* LAMB.

Eleocharis acicularis (L.) ROEM. et SCHULT. — Suchý: na bahně na dně vypuštěného malého rybníka.

E. palustris (L.) ROEM. et SCHULT. subsp. *vulgaris* S. M. WALTERS — Suchý; břeh velkého rybníka.

Elodea canadensis RICH. — Suchý; v posledních letech se masově rozšířila ve velkém rybníce.

Elitrigia repens (L.) DESV. — Hojně na druhotných stanovištích u Boskovic, Knínice, Šebetova a jinde na Malé Haně. Na kulmu vyšších poloh se běžně nevyskytuje, v r. 1970 zaznamenán adventivní výskyt na zahradě domu čp. 75 v Kořenci.

Epilobium hirsutum L. — Pavlov; na břehu dolního rybníka. Též u Boskovic (NEUHÄUSL. et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

E. montanum L. — Dosti hojně v lesích včetně kulturních smrčín. Kořence: na vlhké pasece v bučině na svahu Mojetína k Bělé; Dubina: jako plevel na zahradě domu čp. 75 velmi hojně. Knínice: Žlíbky, Šebetov; ve smrčíně na Mojetíně; u kamenolomu nad Kapouňaty.

E. palustre L. — Na rašelinných loukách u Kořence, Pavlova, Okrouhlé, Suchého, Protivanova, Bukové a Horního Štěpánova hojná.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ — Šebetov: u cesty na hřeben Mojetína. Kořence: v lese u cesty k Melkovu v údolí Kořenáku. Vážany: Vejstice.

Equisetum fluviatile L. — Pavlov; na břehu dolního rybníka a na rašelinných loukách v jeho blízkosti. Suchý; na okraji horního i velkého rybníka a na rašelinných loukách pod horním rybníkem. Kořence: rašelinné louky v údolí Pohorského potůčku a Bělé; v tuních na Pastvisku.

E. palustre L. — Na rašelinných loukách u Pavlova, Kořence, Okrouhlé, Suchého, Protivanova, Horního Štěpánova a j. hojná.

E. sylvaticum L. — Pavlov; okraj lesa nad rašelinnými loukami pod Paprčí; na levém břehu Bělé pod rybníkem. Benešov: rašelinná louka u silnice k Suchému. Pohora: na polích na terénním hrbetě (KÜHN).

Erigeron acer L. s. str. — Kořence: úhor na Bělé; na zahradě domu čp. 75; u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny; loučka u staré cesty k Benešovu. Boskovice: Vinohrádky.

Eriophorum angustifolium HONCK. s. str. — Na rašelinných loukách u Kořence, Pavlova, Benešova, Suchého, Protivanova, Horního Štěpánova a j. hojný.

E. latifolium HORRE — Na rašelinných loukách, řidčeji než předešlý druh. Kořence: v údolí Bělé u soutoku s Pohorským potůčkem. Pavlov: pod dolním rybníkem; u silnice k Bukové. Horní Štěpánov: v Podivení; pod prameny Úsobrnky. Protivanov: u Sklené Huti; u pramenů potůčku Z od vsi. Buková: u potůčku JZ od vsi. Suchý: pod horním rybníkem. Okrouhlá: v údolíčku Z od vsi.

E. vaginatum L. — Jen na vrchovišti u Pavlova u „Suchého lesa“ (viz též J. ŠMARDA 1963, TOVÁREK 1966). Tvoří zde souvislé porosty na rašelině a na minerálním podkladě, kromě toho osidluje vyvrpanou rašelinu. Podle TOVÁRKA (1966) roste též na „vrchovišti“ u pramenů Úsobrnky u Horního Štěpánova, kde jsem je nenašel, i když lokalitu dobře znám. Ačkoliv jsem uveřejnil nález tohoto význačného druhu u Pavlova již před léty i s fotografií (ŘEHOŘEK 1958), nepojala PAVLOVÁ (sec. HENDRYCH 1969) tuto lokalitu do mapy rozšíření *E. vaginatum* v ČSSR; opírala se jen o herbářové položky a ne o literární údaje, a můj sběr ve veřejně přístupných herbářích nebyl uložen. Je to škoda, protože právě naše lokalita je v místech, kde ostatní údaje nejsou a na mapě je tak zbytečně bílé místo tam, kde se *E. v.* bezpochyby vyskytuje, a to masově, i když na omezené ploše.

Erophila verna (L.) CHEVALL. — Kořence: na suchých mezích S od vsi a j. Pohora: na polích na terénním hrbetě (KÜHN).

Euonymus europaea L. — Kořence: na břehu Kořenáku. Višňáku i Bělé u Melkova. Boskovice: Vinohrádky (cf. J. ŠMARDA 1934); Zámecký kopec.

Eupatorium cannabinum L. — Kořence: J svah Hradu; údolí Pohorského potůčku. Šebetov: Mojetín.

Euphorbia amygdaloides L. — Knínice: Žlíbky. Vážany: Vejstice.

E. cyparissias L. — Kořence: Koudelkova skalka SZ od vsi; okraj lesa Dubina. Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. F. ŠMARDA (1961) ji uvádí z luk v údolí Bělé pod Horním Štěpánovem.

E. dulcis L. — Kořence: smrčina pod Paprčí; při ústí Pohorského potůčku do Bělé. Melkov: údolí Bělé. Horní Štěpánov: v trati „Drahoňov“. U Horního Štěpánova, Kořence a Knínice ji sbíral též F. ŠMARDA (1961), od Pílského dvora v údolí Bělé u Boskovic ji uvádějí NEUHÄUSL. et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

Euphrasia nemorosa (PERS.) WALLR. subsp. *nemorosa* — Ve světlých lesích a na lesních cestách. Horní Štěpánov: na S svahu Bašty. Šebetov: Mojetín, u hřebenové cesty k Příhonu. Vážany: Vejstice. okraj paseky v doubravě s příměsí borovice.

E. stricta WOLFF subsp. *stricta* — Dosti hojně na krátkostébelných loukách a okrajích lesů. Kořence: Skalka; meze S od vsi; louka na S okraji obce; u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny; J a Z okraj Dubiny; úhor na Fabínově vrší. Okrouhlá: lesní cesta pod Stádliskami

u Melkova. Šebetov: Příhon, na okraji lesa. Pavlov: u cesty k vrchovišti (zde v jedinech konvergujících k *E. nemorosa*). Boskovice: Vinohrádky.

Fagus sylvatica L. — Tvoří zbytky původních porostů např. na Skalách u Protivanova, na Hradě a Vlčí skále u Kořence, na Stádliskách u Okrouhlé a j. Z okolí Suchého a Ždárné jej uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

Falcaria vulgaris BERNH. — Boskovice: meze na Čížovkách (křída). Do vyšších poloh na kulm nazasahuje.

Festuca altissima ALL. — NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí od Protivanova. Sám jsem ji v území neshíral.

F. gigantea (L.) VILL. — Kořence: na břehu Bělé pod Hradem. Okrouhlá: u potůčku nad Melkovem. Též u Žlárné (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

F. heterophylla LAMK. — Kořence: spontánně na zahradě domu čp. 75. Na základě tohoto výskytu lze předpokládat její větší rozšíření v lesích, doposud jsem ji však asi přehlédl.

F. tenuifolia SIBTH. — Kořence: mokřina v průseku na V svahu Paprče. Pavlov: rašelinné louky proti vrchovišti. U Pavlova ji sbíral též KAVKA (in litt. sub *F. capillata*).

Ficaria verna HUDS. subsp. *bulbifera* (ALBERT) LÖVE et LÖVE — Kořence: údolí Bělé S od vsi. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí z okolí Boskovic.

Filago arvensis L. — Kořence: výslunná stráž na úpatí Hradu v údolí Bělé.

Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. subsp. *ulmaria* — Hojně na údolních a rašelinných loukách a kolem potoků u Kořence, Pavlova, Benešova, Suchého, Protivanova, Okrouhlé, Horního Štěpánova a j.

F. vulgaris MOENCH — Několik sterilních exemplářů v údolí Bělé S od Kořence, jinak na kulmu vyšších poloh chybí.

Fragaria moschata DUCHESNE — Kořence: úpatí J svahu Hradu a úpatí Mojetína u bývalé vápenky v údolí Bělé.

Frangula alnus MILL. — Knínice: Žlíbky. Melkov: na břehu Višňáku. Kořence: Koudelkova skalka SZ od vsi.

Fraxinus excelsior L. — Hojný v lesích kolem potoků v celém území. V údolí Kořeňáku u Melkova 1 exemplář var. *diversifolia* AITON.

Fumaria rostellata KNAF — Protivanov: na polích Z od vsi (KÜHN).

Gagea lutea (L.) KER-GAWL. — Kořence: v údolí Bělé S od vsi; na louce u potoka Kořeňáku pod vsí („Ve žlebě“). Též u Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Galeobdolon montanum (PERS.) REICHENB. — Kořence: Dubina: údolí Bělé; údolí Višňáku. Okrouhlá: údolí Bělé u Melkova. Též v okolí Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Galeopsis angustifolia EHRH. — Boskovice: Vinohrádky (cf. J. ŠMARDA 1934). Knínice: mezi štěrkem na náspu trati u zastávky.

G. bifida BOENNINGH. — Kořence: u cesty za humny; na polích S od vsi; jako plevel na zahradě domu čp. 75 jednak v typické formě, jednak ve var. *pernhofferi* (WETTST.) GAMS in HEGI. Tuto varietu jsem dále našel v údolí Bělé S od Kořence a velmi hojně na vytrápané zemině kolem odvodňovacích příkopů na vybagrovaném rašeliništi u dolního rybníka u Pavlova.

G. ladanum L. — Kořence: J a V okraj Dubiny. Knínice: okraj lesa pod Žlíbky.

G. pubescens BESS. subsp. *pubescens* — Kořence: na poli J od vsi; okraj lesa Dubina: jako plevel na zahradě domu čp. 75 a u plotu za humny.

G. speciosa MILL. — Vratíkov: Melkovské údolí pod „Babou“.

G. tetrahit L. — Pohora: na polích (KÜHN). Horní Štěpánov: v lese u cesty v údolí Bělé v trati „Drahoňov“. Kořence: pole kolem vsi; jako plevel na zahradě domu čp. 75 a j.

Galinsoga parviflora CAV. — Kořence: na zahradách a u plotů ve vsi nepříliš hojně.

Galium aparine L. — Šebetov: v bučině smřčině na Mojetíně. Kořence: okraj lesa v údolí Bělé S od vsi; jako plevel na zahradě domu čp. 75.

G. boreale L. — Pavlov: na břehu dolního rybníka a na okolních rašelinných loukách. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Kořence: Pastvisko; louky S od vsi.

G. mollugo L. — Kořence: Skalka; úpatí Hradu v údolí Bělé; Koudelkova skalka SZ od vsi; louky S od vsi. Okrouhlá: u můstku při cestě k Melkovu.

G. odoratum (L.) Scop. — Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem. Kořence: Dubina. Od Kořence a Horního Štěpánova je uvádí též F. ŠMARDA (1961), od Boskovic a Protivanova NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

G. palustre L. subsp. *palustre* — Na rašelinných loukách u Pavlova, Kořence, Okrouhlé, Suchého, Protivanova, Horního Štěpánova a j. hojný.

G. × pomeranicum RETZ. (*G. mollugo* × *verum* SCHULTZ) — Kořence: na mezi za humny S od vsi spolu s *G. verum* L.

G. pumilum MURR. — Kořence: suchá louka v údolí Bělé u soutoku s Pohorským potůčkem, u bývalé hájenky a u silnice k Šebetovu pod hájenkou; loučka pod Koudelkovou skalkou SZ od

vsí. Okrouhlá; Stádliska. Suchý; louka pod horním rybníkem. Od Kořence a Horního Štěpánova je uvádí též F. ŠMARD (1961).

G. rotundifolium L. — Pohora: v lese u myslivny na Karlově. Kořence: v bučině na svahu Mojetína k Bělé. Též u Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

G. sylvaticum L. — Kořence: údolí Bělé S od vsí. Šebetov: u cesty na Mojetíně. Knínice: Žlíbky. Vážany: okraj lesa na úpatí Vejstice. U Sudic je sbíral F. ŠMARD (1961), v údolí Bělé u Boskovic NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

G. uliginosum L. — Na rašelinných loukách hojně, např. u Kořence, Benešova, Pavlova, Suchého, Protivanova, Bukové, Horního Štěpánova a j.

G. verum L. — Na mezích kolem Kořence i jinde dosti hojně.

Genista germanica L. — Kořence: Skalka; na mezi u Dubiny. FORMÁNEK (1887–1897) ji uvádí od Boskovic a Štěpánova (Horního?).

G. tinctoria L. subsp. *tinctoria* — Kořence: Skalka; okraj Dubiny; Koudelkova skalka. Okrouhlá: okraj lesa a suchá louka na Stádliskách.

Gentiana pneumonanthe L. — Podle TOVÁRKA (1966) roste velmi roztroušeně na „vrchovišti“ u pramenů Úsobrnky u Horního Štěpánova. Sám jsem ji zde nenašel.

Gentianella obtusifolia (F. W. SCHMIDT) HOLUB s. l. — Na pastvinách a krátkostébelných loukách dosti hojně. Kořence: Pastvisko; Skalka; louky SZ od vsí. Pavlov: louky u dolního rybníka. Okrouhlá; Stádliska.

Gentianopsis ciliata (L.) MA — Šebetov: ve vápencovém kamenolomu nad Kapouňaty a v lese za kamenolomem na Mojetíně. Boskovice: v lese na Rovně.

Geranium palustre L. — Okrouhlá: v údolíčku směřem k Vratíkovu. Kořence: louky kolem Pohorského potůčku.

G. pratense L. — Kořence: v příkopech kolem cest a na vlhkých lukách kolem vesnice. Okrouhlá: v údolíčku Z od vsí a u mostku při cestě k Melkovu. Též u Boskovic a Šebetova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

G. pusillum L. — Kořence: jako plevel na zahradě domu čp. 75.

Geum rivale L. — Na rašelinných loukách u Kořence, Horního Štěpánova, Pavlova, Suchého a Protivanova roztroušeně.

Gladiolus imbricatus L. — Podle FORMÁNKA (1887–1897) uváděn již H. Schindlerem od Horního Štěpánova. Tentýž Schindlerův údaj uvádí J. Ryš v kapitole o floristických poměrech jevíckého okresu (Vlastivěda moravská 2. Tom. 1., No. 26 – Jevícký okres). Nedá se však zjistit, kde vyšla originální práce SCHINDLER H. (1878): Mitteilung über *Gladiolus imbricatus* L. bei Stefanau nächst Gewitsch. Koncem padesátých let našla zde znovu tento druh prom. biol. M. SKYBOVÁ, uvádí ho odtud (od pramenů Úsobrnky) i KAVKA (1961) a TOVÁREK (1966). FORMÁNEK (l.c.) dále uvádí SPITZNERŮV nález „u Protivanova“, PODPĚRA (1914) další SPITZNERŮV nález „lesy u Bukové v okrese boskovickém“. Řed. Syehra mi ho přinesl z Radovy louky u Benešova, ué. Kočvarová z luk u Melkova.

Glyceria fluitans (L.) R. Br. — Kořence: Pastvisko.

Gnaphalium sylvaticum L. — Roztroušeně v lesích. Kořence: Dubina a j.

G. uliginosum L. — Kořence: Pastvisko; mokrá louka v údolí Bělé u silnice k Šebetovu; hojně jako plevel na zahradě domu čp. 75. Pohora: na polích (KÜHN). Protivanov: pole Z od vsí (KÜHN).

Gymnadeniella conopsea (L.) R. Br. subsp. *conopsea* — Kořence: Pastvisko; louky pod vsí. Okrouhlá: louky na Stádliskách. U Pavlova ji sbíral KAVKA (in litt.).

Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWMAN — Kořence: paseka na svahu Mojetína k Bělé; Dubina: kamenice mezi poli pod Papřčí. Též u Židárné a Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Gypsophila muralis L. — Šebetov: okraj lesa SZ od obce (KÜHN). Do vyšších poloh na kulm nezasahuje.

Helianthemum nummularium (L.) MILL. subsp. *obscurum* (WAHLENB.) HOLUB — Kořence: louka na S okraji obce: meze S od vsí; Skalka. Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. Též u Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Hepatica nobilis MILL. — Kořence: ostroh mezi Kořenákem a Višňákem (výběžek Vlčí skály) u Melkova. Okrouhlá: v lese na Stádliskách (S svah). Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem. Boskovice: Vinohrádky. Doubravy.

Hieracium auricula L. — Kořence: louky S od vsí; loučka u staré cesty k Benešovu za větrným mlýnem. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení; pod prameny Úsobrnky. Pavlov: rašeliniště u dolního rybníka. Buková: rašelinné louky pod Hamerským lesem JZ od vsí. Suchý: rašelinné louky pod horním rybníkem.

H. bauhini SCHULT. in BESS. subsp. *bauhini* s. l. [= *H. bauhini* (BESS.) ZAHN] — Kořence: paseka nad hájovnou u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny. Boskovice: mez u cesty na Vinohrádky.

H. lachenalii GMEL. subsp. *lachenalii* s. l. [= *H. lachenalii* (GMEL.) ZAHN = *H. sciaphilum*

(UECHTRITZ) ZAHN] — Kořence: okraj lesa pod Paprčí; na okraji Dubiny. Pavlov: rašelinná louka u lesa pod Paprčí.

H. laevigatum WILLD. subsp. *laevigatum* s. l. [= *H. laevigatum* (WILLD.) ZAHN = *H. rigidum* (HARTM.) ZAHN] — Kořence: okraj lesa pod Paprčí.

H. laevigatum WILLD. subsp. *tridentatum* (FRIES) ZAHN s. l. [= *H. tridentatum* (FRIES) ZAHN] — Benešov: v kulturní smrčtině u staré cesty ke Kořenci. Kořence: Dubina; okraj lesa S od vsi. Horní Štěpánov: údolí Bělé pod Baštou.

H. pilosella L. — Na suchých mezích, pastvinách a okrajích lesů v celém území obecný. Na úhoru na Fabinově vrši u Kořence jsem našel v září 1953 jeden exemplář se třemi úboří na stvolu.

H. platyphyllum A.-T. (= *H. racemosum-sabaudum*) — Kořence: v lese u cesty k Melkovu v údolí Kořeňáku.

H. racemosum W. et K. subsp. *crinitum* (SIBTH. et SM.) ZAHN — Knínice: Žlíbky. Kořence: J svah Hradu nad Bělou.

H. rothianum WALLR. (= *H. setigerum* TAUSCH = *H. echinoides* > *pilosella*). FORMÁNEK (1887–1897) uvádí SPITZNERŮV nález „u sklené huti za Protivanovem“.

H. sabaudum L. subsp. *boreale* (FRIES) ZAHN s. l. [= *H. boreale* (FRIES) ZAHN] — Kořence: louky S od vsi. Vážany: v lese na Z svahu Vejstice a na okraji lesa nad tratí. Knínice: Žlíbky. Boskovice: Vinohrádky.

H. umbellatum L. subsp. *umbellatum* — Kořence: louka S od vsi; na zahradě domu čp. 75.

Holeus mollis L. — Kořence: na okraji lesa Dubina a V odtud na polích velmi hojný; ve světlém lese na Vlčí skále, Pavlov: na cestě k vrchovišti; na okraji lesa pod Paprčí. Pohora: na polích na terénním hřebětě (KÜHN). Buková: na polích k Protivanovu (KÜHN). Protivanov: pole Z od vsi (KÜHN).

Humulus lupulus L. — Boskovice: u potůčku pod Oborou při silnici do Lhoty Rapotiny. Ve vyšších polohách chybí.

Hyoscyamus niger L. — Boskovice: rumiště u hradu. Ha kulmu vyšších poloh chybí.

Hypericum hirsutum L. — Kořence: údolí Višňáku. Šebetov: Mojetín.

H. humifusum L. — Pavlov: na poli u rašelinných luk (KÜHN).

H. maculatum CRANTZ subsp. *maculatum* — Horní Štěpánov: v trati „Drahoňov“ ve smrčtině na břehu Bělé. Kořence: loučka u lesa vlevo od silnice k Šebetovu.

H. montanum L. — Kořence: údolí Višňáku; Dubina; vlhká paseka na svahu Mojetína k Bělé. Šebetov: Mojetín.

H. tetrapterum FRIES — FORMÁNEK (1887–1897) uvádí SPITZNERŮV nález od Protivanova; sám jsem je zde neshíral.

Impatiens glandulifera ROYLE — Tuto u nás zdomácenou netýkavku, která se již více než dvě desetiletí silně šíří podél Svitavy (cf. MÜLLER 1948), jsem našel v bujném porostu spolu s *I. parviflora* DC. 20. 9. 1956 na Skalách u Protivanova poblíž chaty „Hanačka“ (domek na ukládání nářadí pro lesní dělníky). Původ těchto dvou druhů na uvedené lokalitě ani souvislost jejich zdejšího výskytu s intenzivním šířením v povodí Svitavy mi nejsou známy. Od Boskovic ji uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

I. noli-tangere L. — U lesních potůčků dosti hojná. Kořence: údolí Višňáku a Kořeňáku; Dubina. Knínice: Žlíbky. Vratíkov: Melkovské údolí pod „Babou“.

I. parviflora DC. — Protivanov: Skály, v lese u chaty „Hanačka“.

Inula conyzia DC. — Šebetov: Mojetín, u hřebenové cesty. Boskovice: Vinohrádky.

Iris pseudacorus L. — Vážany: v potoku na „Panině louce“ (leg. A. Hrouz). Skalce n./Svit.: mokřady u železniční trati směrem k Brnu. Ve vyšších polohách chybí.

* *I. sibirica* L. — Kořence: louka pod větrným mlýnem (lokalita byla zničena obnovou odvodňovací strouhy). Suchý: na louce u horního rybníka.

Isopyrum thalictroides L. — Okrouhlá: v křoví u Višňáku pod Stádliskami. Kořence: v údolí Bělé pod Hradem.

Ira xanthiifolia NUTT. — Boskovice: na rumišti (zavezený mlýnský rybník) u lihovaru v srpnu 1970.

Jasione montana L. — Kořence: na mezi a v březovém hájku u cesty k Bělé SZ od vsi.

Juncus bulbosus L. subsp. *bulbosus* — Kořence: Pastvisko; na obnažené půdě v údolí Bělé S od vsi. Pavlov: lesní prameniště a rašelinná louka pod dolním rybníkem. Z potoka J od Pavlova ho udává i KAVKA (1961). Suchý: rašelinná louka nad velkým rybníkem. Horní Štěpánov: louka nad reservoárem vodovodu v Podivení.

J. conglomeratus L. — Kořence: louky v údolí Kořeňáku pod Skalkou a v údolí Bělé S od vsi; louka u cesty do Horního Štěpánova. Protivanov: u potůčku nad Sklenou Hutí. Horní Štěpánov: u pramenů potůčku v Podivení; u pramenů Úsobrnky. Pavlov: rašelinná louka u lesa pod Paprčí; tuně po vyřípané rašelině na vrchovišti u „Suchého lesa“ (cf. TOVÁREK 1966).

J. effusus L. — Pavlov: rašelinná louka u dolního rybníka; vrchoviště u „Suchého lesa“. Kořence: Pastvisko; údolí Bělé S od vsi. Suchý: pod horním rybníkem.

J. filiformis L. — Suchý: rašelinné louky na břehu velkého rybníka. Horní Štěpánov: rašelinné louky u pramenů Ůsobruky; v Podivení nad reservoárem vodovodu hojně. Kořence: Pastvisko; údolí Bělé a Pohorského potůčku.

J. inflexus L. — Knínice: lesní mokřad v úžlabině mezi Mojetínem a Příhonem (perm). Na kulmu vyšších poloh chybí.

J. squarrosus L. — Kořence: mokřina v průseku na V svazích Paprče. Pavlov: rašelinná louka u lesa pod Paprčí; loučka mezi lesíky při cestě do Brodku. U Pavlova ho sbíral též KAVKA (in litt.). Horní Štěpánov: u lesní cesty na S svahu Bašty. Z louky nad prameny Ůsobruky u Horního Štěpánova ho uvádí KAVKA (1961) a TOVÁREK (1966).

J. tenuis WILLD. — Benešov: mokrá louka na břehu Račího potoka u staré cesty ke Kořenci.

Juniperus communis L. — Několik exemplářů jen na Stádliskách u Okrouhlé.

Knutia drymeia HEUFF. — Kořence: v údolí Višňáku nad Melkovem pod Vlčí skálou. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí z více lokalit (Pílský dvůr a Šmelcovna v údolí Bělé u Boskovic; Vratíkov; mezi Protivanovem a Žďárnou).

K. silvatica (L.) DUBY — Knínice: Žlíbky. Boskovice: Vinohrádky.

Coeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT. — Boskovice: Vinohrádky, na JZ svazích (cf. J. ŠMARDA 1934).

Lamium amplexicaule L. — Ve vyšších polohách zřídka. V roce 1959 několik exemplářů na zahradě domu čp. 75 v Kořenci. Pohora: na polích (KÜHN). Protivanov: pole Z od vsi (KÜHN).

Lapsana communis L. — Kořence: jako plevel na zahradě domu čp. 75. Pohora: na polích (KÜHN).

Larix decidua MILL. — Často vysazován v kulturních smrčínách.

Laserpitium prutenicum L. — Jen na dvou místech u Horního Štěpánova: na vřesovišti mezi rašelinnými loukami v Podivení a na louce vlevo od cesty z Pavlova do Brodku.

Lathraea squamaria L. subsp. *squamaria* — Kořence: údolí Bělé S od vsi, pod lískovými keři. Benešov: v kulturní smrčíně na břehu Račího potoka. Vratíkov: Melkovské údolí.

Lathyrus niger (L.) BERNH. — Šebetov: u cesty v lese na Mojetíně za kamenolomem nad Kapouňaty.

L. vernus (L.) BERNH. — Kořence: údolí Bělé nad soutokem s Pohorským potůčkem. Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem.

Lembotropis nigricans (L.) GRISEB. — Kořence: JZ okraj Dubiny. Vážany: Vejštice. Boskovice: Pílský dvůr (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Lepidium campestre (L.) R. BR. — Ve vyšších polohách zřídka. Kořence: úhor na Fabinově vrší; na zahradě domu čp. 75.

Lilium martagon L. — Šebetov: Mojetín, na vápenci v lese za kamenolomen nad Kapouňaty. Boskovice: svah na levém břehu Bělé za stadionem (granitit). F. ŠMARDA (1961) ji uvádí od Knínice a Sudic.

Linum usitatissimum L. — Přechodně zplaňuje na místech, kde se roší len; Kořence: Skalka; louky S od vsi.

Listera ovata (L.) R. BR. — Kořence: Pastvisko. Pavlov: na rašeliništi u dolního rybníka. U Pavlova ji sbíral i KAVKA (in litt.).

Lithospermum arvense L. subsp. *arvense* — Boskovice: Zámecký kopec. Ve vyšších polohách jen zřídka. Kořence: v bramborišti u Dubiny. Pohora: na polích (KÜHN).

Lolium temulentum L. — Kořence: okraj pole za větrným mlýnem; pole S od vsi.

Lonicera xylosteum L. — Kořence: okraj Dubiny. Knínice: Žlíbky.

Lupinus polyphyllus LINDLEY — Vyséván a zplanělý v lesích, např. u silnice z Kořence do Šebetova.

Luzula multiflora (RETZ.) LEJ. — Pavlov: vrchoviště u „Suchého lesa“; rašelinné louky u lesa pod Paprčí.

L. pilosa (L.) WILLD. — Kořence: okraj lesa v údolí Bělé S od vsi. Pohora: okraj lesa u Barborky. Větší počet lokalit uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969): Šmelcovna u Boskovic; mezi Boskovicemi a Valchovem; Žďárná; Protivanov.

Lycopodium annotinum L. — Kořence: hojně pod Komárkovými skalami na Paprčí; kulturní smrčina v Dubíně: průsek na S i J svahu Hradu; v lese u Drahoňovské cesty v údolí Bělé S od vsi, většinou sterilní. Pavlov: „Suchý les“ (leg. M. SKYBOVÁ).

Lycopsis arvensis L. — Protivanov: na polích Z od vsi (KÜHN). Je tak potvrzen starší nález SPITZNERŮV (sec. FORMÁNEK 1887–1897).

Lycopus europaeus L. s. str. — Kořence: u starého ramene Bělé nad soutokem s Pohorským potůčkem. Horní Štěpánov: rašelinná louka v Podivení.

Lysimachia nemorum L. — Kořence: mýtina a průsek na V svahu Paprče.

L. nummularia L. — Kořence: louka u lesa při cestě do Horního Štěpánova; vlhké louky v údolí Bělé a Pohorského potůčku; v příkopu u silnice k Šebetovu. Knínice: v bučině mezi

Mojetínem a Příhonem, Protivanov; louka u pramenů potůčku Z od vsi, Suchý; břeh velkého rybníka; rašelinné louky pod horním rybníkem, Okrouhlá; na louce Z od vsi.

L. vulgaris L. — Kořence; louka na S okraji obce; v poli na dolním konci vesnice; u staré cesty k Benešovu (též KÜHN in litt.); rašelinné louky v údolí Bělé a Pohorského potůčku S od vsi. Horní Štěpánov; rašelinné louky v Podivení; pod prameny Úsobrnky, Protivanov; rašelinné louky u Sklené Hutí, Buková; rašelinné louky pod Hamerským lesem JZ od vsi.

Lythrum salicaria L. — Kořence; v příkopěch na louce za větřným mlýnem; údolí Bělé S od vsi. Suchý; břeh velkého rybníka; rašelinná louka pod horním rybníkem. Horní Štěpánov; rašelinné louky v Podivení.

Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT — Okrouhlá; v bučině na Stádliskách, Pavlov; na okraji lesa a na rašelinné louce na svazích Paprče, Kořence; Paprč; les v údolí Višňáku; bučina na svahu Mojetína k Bělé, Knínice; v bučině mezi Mojetínem a Příhonem.

Malva moschata L. — Melkov; na okraji lesa u cesty ke Kořenci, Kořence; louka v údolí Bělé pod Hradem, SLAVÍK (1967) považuje výskyt tohoto druhu na Moravě za sekundární; ani pro naši lokalitu nemáme důkazy o její původnosti.

Medicago falcata L. — Knínice; okraj lesa pod Žlíbkou. Na kulmu vyšších poloh chybí.

Melampyrum arvense L. — Ve vyšších polohách zřídka, v r. 1950 několik exemplářů u Kořence v polích u cesty k Bělé SZ od vsi.

M. nemorosum L. subsp. *silesiacum* RONN. — Melkov; v křoví u Višňáku, Kořence; okraj lesa u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny.

M. pratense L. — V rámci tohoto druhu by bylo možno na základě klíče SCHNEIDEROVÉ (1963a) předběžně rozlišit v území následující plemena, která však vyžadují dalšího sledování: subsp. *pratense* (?) — Kořence; okraj lesa u staré cesty k Šebetovu na svahu Koziny, Dubina. Šebetov; na hřebeni Mojetína, Knínice; u hřebenové cesty na Příhoně.

subsp. *paludosum* (GAUD.) RONN. — Pavlov; vrchoviště; „Suchý les“ vpravo od cesty k Brodku.

subsp. *oligocladum* (BEAUV.) Soó — Kořence; paseka na svahu Mojetína k Bělé.

subsp. *engleri* Soó (?) — Šebetov; v mladé dubové výsadbě uvnitř kulturní smrčiny u cesty na hřebeni Mojetína.

M. sylvaticum L. s. l. — Jen ve smrčíně na pravém břehu Bělé pod dolním rybníkem u Pavlova (13. 8. 1957 několik jedinců, v červenci 1961 rozsáhlé porosty mezi borůvkám).

Melandrium dioicum (L.) COSS. et GERM. — Boskovice; v lese u Dvou Dvorů na svahu do údolí Bělé několik exemplářů 5. 6. 1950.

Melica nutans L. — Kořence; okraj lesa u cesty do Horního Štěpánova; údolí Bělé pod Mojetínem, Dubina, Knínice; Žlíbky. Od Boskovic (údolí Bělé u Pilského dvora a u Šmeleovny), Ždárné a Protivanova ji uvádějí NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

M. uniflora RETZ. — Protivanov; v bučině na Skalách.

Melilotus alba MEDIC. — Šebetov; vápencový kamenolom nad Kapouňaty, Knínice; okraj lesa pod Žlíbkou.

M. officinalis (L.) PALLAS — Boskovice; u silnice k Chrudichromům a j. Na kulmu vyšších poloh chybí.

Melittis melissophyllum L. — Boskovice; Vinohrádky, okraj lesa nad Mladkovem (cf. J. ŠMARD 1934). Od Sudce a Knínice ho uvádí F. ŠMARD (1961).

Mentha longifolia (L.) NATH. — Melkov; údolí Bělé, Kořence; při Pohorském potůčku.

Menyanthes trifoliata L. — Pavlov; vzácně na rašelinné louce pod dolním rybníkem (leg. M. SKYBOVÁ). Horní Štěpánov; hojně na rašelinné louce v Podivení. TOVÁREK (1966) ji uvádí z údolí Bělé ve „Žlebě“.

Mercurialis perennis L. — Knínice; Žlíbky, Kořence; Dubina; údolí Bělé S od vsi; v lese při cestě k Melkovu v údolí Kořenáku, F. ŠMARD (1961) ji uvádí od Kořence, Nových Sadů a Šebetova, NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) od Protivanova.

Misopates orontium (L.) RAFIN. — Boskovice; Vinohrádky, pole na svahu k Mladkovu.

Mochringia trinervia (L.) CLAIRV. — Knínice; Žlíbky, Kořence; bučina na svahu Mojetína k Bělé; na zahradě domu čp. 75 hojně jako plevel v alpinu, Boskovice; u Šmeleovny (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Molinia coerulea (L.) MOENCH subsp. *coerulea* — Pavlov; vrchoviště u „Suchého lesa“; rašelinné louky u lesa pod Paprčí, Kořence; pastvina na Skalce; louky S od vsi; u potoka pod Skalkou, Horní Štěpánov; pod prameny Úsobrnky (cf. TOVÁREK 1966); rašelinná louka v Podivení, Protivanov; nad Sklenou Hutí, Okrouhlá; louky na Stádliskách.

M. c. subsp. *arundinacea* (SCHRANK) PAUL — Vážany; Vejštice, vlhká cesta v doubravě na Z svahu.

Moneses uniflora (L.) A. GRAY — Pohora; u lesního potůčku u Barborky.

Monotropa hypopitys L. — Kořence; smrčina na levém břehu Višňáku; v lese při cestě k Melkovu, Pavlov; v kulturní smrčíně pod Paprčí.

Montia rivularis C. C. GMELIN — KAVKA (1961) a TOVÁREK (1966) ji uvádějí od pramenů

Úsobrnky u Horního Štěpánova jako z jediné lokality v tomto území. Sám jsem ji zde ani jinde na podobných stanovištích nenašel.

Mycelis muralis (L.) DUM. — Kořence: les Dubina; svah Mojetína k Bělé. Šebetov: Mojetín. Knínice: Žlíbky.

Myosotis discolor PERS. — Kořence: okraj jetelístě pod Koudelkovou skalkou a vedle na suché louce SZ od vsi.

M. nemorosa BESS. subsp. *nemorosa* — Na vlhkých loukách u Kořence, Pavlova, Horního Štěpánova, Bukové, Protivanova, Okrouhlé a j. dosti hojná ve var. *nemorosa*. V příkopu u silnice z Kořence do Šebetova též v bělokvěté formě.

M. stricta LINK. — Kořence: na mezích S od vsi; J okraj Dubiny; u lesa Kostnice vpravo od silnice k Šebetovu.

M. sylvatica (EHRH.) HOFFM. s. str. — Kořence: Dubina.

Myosoton aquaticum (L.) MOENCH — Knínice: Žlíbky.

Neottia nidus-avis (L.) RICH. — Kořence: pod jelemí na svahu Mojetína k Bělé.

Neslia paniculata (L.) DESV. — Okrouhlá: na poli Z od vsi, asi 500 m n. m. Je to ojedinělý výskyt na kulmu vyšších poloh.

Odontites rubra (BAUMG.) PERS. subsp. *rothmaleri* U. SCHNEIDER — Šebetov: na cestě v kamenolomu nad Kapouniaty. Kořence: okraj pole za domem čp. 75. Tato monomorfní (přechodná) rasa, která nebyla dosud známa z území ČSSR, se podle SCHNEIDEROVÉ (1963b) vyznačuje absencí interkalárních listů (nebo nanejvýš přítomností 1 páru) a podpůrnými listeny delšími než květy. Větvi se odspodu na četné obloukovitě odstávající větve. Lodyžní články jsou četné, spodní krátké, horní prodloužené. První květy jsou založeny v 8. — 14. uzlině. Květy v červenci a v srpnu. SCHNEIDEROVÁ (l.c.) uvádí toto nové plemeno z Meklenburska. Naše exempláře se shodují s popisem až na to, že větve nejsou obloukovitě zahnuté. Na obou lokalitách kvetly v srpnu (26. 8. 1955 a 4. 8. 1962).

Onobrychis viciifolia Scop. — Vratíkov: na mezi u silnice (granitit brněnské vyvřeliny). Na kulmu vyšších poloh neroste. Od Vratíkova ho uvádějí též NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

Ononis spinosa L. subsp. *spinosa* — Knínice: na mezích u lesa pod Žlíbky. Na kulmu vyšších poloh neroste.

Ophioglossum vulgatum L. — Pavlov: vlhká louka poblíž dolního rybníka.

Orchis morio L. — Kořence: louky SZ od vsi. Okrouhlá: suché louky na Stádliskách.

Ornithogalum gussonei TEN. — Kořence: louka v údolí Kořenáku pod Skalkou.

O. umbellatum L. — Kořence: pod křovinami v údolí Bělé pod Hradem S od vsi.

Orthilia secunda (L.) HOUSE — Kořence: v mladé smrčtině pod Dubinou; u staré cesty k Šebetovu na svazích Koziny. Šebetov: ve skupině dubů uprostřed kulturní smrčtiny na hřebeni Mojetína.

Oxalis europaea JORD. — Okrouhlá: na strništi Z od vsi.

Oxycoccus quadripetalus GLIB. — Jen u Pavlova na vrchovišti u „Suchého lesa“. Uvádějí ji odtud též J. ŠMARDA (1963), TOVÁŘEK (1966) a KÜHN (1968).

Padus avium MILL. s. str. — Kořence: pod Skalkou; údolí Bělé S od vsi, v křovinách u potoka a na mezi v polích.

Papaver argemone L. — Šebetov: okraj lesa SV od obce (KÜHN).

P. rhoeas L. — Zřídka ve vyšších polohách na kulmu: nejvýše položené lokality stálého výskytu jsem zjistil nad Šebetovem nad osadou Kapounáta (též KÜHN in litt.) a mezi Vratíkovem a Okrouhlou, v obou případech asi 500 m n. m. KÜHN (in litt.) ho sbíral ještě u objektů JZD Protivanov. Přechodně se objevil před několika lety i na poli pod Kořencem směrem k Šebetovu a v r. 1971 na hromadě písku v Kořenci u domu čp. 63.

Paris quadrifolia L. — Kořence: les v údolí Višňůvek. Benešov: les kolem Ražního potoka.

Parnassia palustris L. — Kořence: vlhké louky kolem vesnice, Pavlov: rašelinné louky kolem dolního rybníka. Okrouhlá: u potůčku SZ od vsi. Protivanov: rašelinné louky pod Sklenou Hutí. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení. Rovněž FORMÁNEK (1887—1897) uvádí SPITZNERŮV nálezkod Štěpánova (Horního?).

Pedicularis palustris L. — Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem. U Pavlova ho sbíral též KAVKA (in litt.). Suchý: hojně na rašelinných loukách u velkého rybníka. Benešov: rašelinná louka u silnice k Suchému. Protivanov: u pramenů potůčku Z od vsi.

P. sylvatica L. — Kořence: Pastvíska; louky na S okraji obce; louky u silnice k Benešovu. Benešov: rašelinná louka u silnice k Suchému. Suchý: u velkého rybníka. Okrouhlá: vlhké louky na Stádliskách. Pavlov: rašelinná louka pod dolním rybníkem; lesní mokřina v průseku pod Paprčí. U Pavlova ho sbíral též KAVKA (in litt.).

Petasites albus (L.) GAERTN. — Horní Štěpánov: v údolí Bělé v trati „Drahoňov“ pod hájovnou.

P. hybridus (L.) GAERTN., MEYER et SCHERB. — V údolí Bělé mezi Melkovem a Boskovicemi (Melkovské údolí) hojný.

Peucedanum ostruthium (L.) KOCH — Podle KAVKY (1961) roste v zahradních plotech v Protivanově.

Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT — Kořence: na pasece na svahu Mojetína k Bělé.

Phragmites communis TRIN. s. str. — Ve vyšších polohách jen na rašelinné louce u pramenů Úsobrnky u Horního Štěpánova (sterilní). Chybí v litorálu rybníků u Pavlova a Suchého.

Phyteuma orbiculare L. — Roztroušeně na loukách (vlhkých) ve vyšších polohách kolem Kořence, Benešova a Suchého. Od Horního Štěpánova ji uvádí F. ŠMARD (1961), od Pohory TOVÁREK (1966).

P. spicatum L. subsp. *spicatum* — Vratíkov: Melkovské údolí. Boskovice: údolí Bělé u Šmelcovny (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Picea abies (L.) KARSTEN — Tvoří dnes hlavní složku lesních porostů, jeho původnost je zde však sporná.

P. pungens ENGELM. — Zřídka vysazován v lesích, např. v menší skupině v údolí Višňáku u Melkova.

Pimpinella major (L.) HUDSON — Knínice: Žlíbky.

Pinus banksiana LAMBERT — Zřídka vysazována, např. na Vinohrádcech u Boskovic.

P. sylvestris L. — Často vysazována mezi smrkem nebo spolu s dubem v acidofilních doubravách s bělomechem (Doubravy u Boskovic). U Kořence v lese „Vodáková“ několik exemplářů var. *uncinata* D. DON (non *P. uncinata* RAMD. nec auct. bohemoslov., germ. et al.).

P. strobus L. — Zřídka vysazována v lesích, např. v údolí Kořeňáku u cesty k Melkovu.

Platanthera bifolia (L.) RICH. subsp. *bifolia* — Okrouhlá: okraj lesa a louky na Stádliskách. Kořence: louky u silnice k Benešovu; na mezi u bývalých selských lesů J od vsi; Pastvisko.

Poa angustifolia L. — Kořence: louka S od vsi.

P. compressa L. subsp. *compressa* — Kořence: Pastvisko, na hlinitém břehu potoka Kořeňáku.

P. palustris L. — Kořence: louky na S okraji obce; louky v údolí Bělé S od vsi. Pavlov: louky kolem dolního rybníka.

P. trivialis L. — Na mokřích loukách dosti hojná. Kořence: údolí Bělé S od vsi. Suchý: pod horním rybníkem. Okrouhlá: v údolíčku Z od vsi. Řídčeji ve vlhkých lesích. Kořence: na pasece na svahu Mojetína k Bělé.

Podospermum canum C. A. MEYER — SPITZNER udává podle FORMÁNKA (1887—1897) tento druh od Protivanova. Jeho značné pochybný výskyt se mi zde nepodařilo potvrdit.

Polygala comosa SCHKUHR — Kořence: na vápencovém ostrůvku u bývalé vápenky na úpatí Mojetína v údolí Bělé.

Polygonatum multiflorum (L.) ALL. — Boskovice: Vinohrádky. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) je našli ještě u Žďárné.

P. odoratum (MILL.) DRUCE — Boskovice: Vinohrádky (cf. J. ŠMARD 1934). Vážany: na úpatí Vejstice nad tratí.

P. verticillatum (L.) ALL. — Kořence: Dubina; v kulturní smrčíně pod Paprčí. Benešov: u silnice ke Kořenci. Šebetov: v lese u kamenolomu nad Kapouňaty. J. ŠMARD (1936) je udává od Boskovic a Protivanova, F. ŠMARD (1961) od Kořence a Horního Štěpánova, NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) od Žďárné.

Polygonum amphibium L. — Suchý: ve velkém rybníce při horním okraji. Pavlov: na poli u rozcestí k Bukové (KÜHN). Buková: pole na hřbetu k Protivanovu (KÜHN). Protivanov: na polích (KÜHN).

P. bistorta L. — Na vlhkých až rašelinných loukách kolem Kořence, Benešova, Pavlova, Suchého, Horního Štěpánova, Bukové a Protivanova dosti hojně (cf. F. ŠMARD 1961).

P. hydropiper L. — Kořence: vlhká cesta v údolí Bělé S od vsi. Pohora: na polích (KÜHN). Protivanov: na polích (KÜHN).

P. persicaria L. — Kořence: vlhká lesní cesta na Hradě; v brambořišti na S okraji obce. Šebetov: na polích (KÜHN). Pohora: na polích (KÜHN).

P. tomentosum SCHRANK — Kořence: v brambořišti u Dubiny. Pohora: na polích (KÜHN).

Potamogeton vulgaris L. — Kořence: skály na J svahu Hradu: Komárkovy skály na Paprčí.

Potamogeton natans L. — Pavlov: v dolním rybníce.

P. pusillus L. — Pavlov: na bahně v mělině při horním okraji dolního rybníka.

P. trichoides CHAM. et SCHLECHTD. — Kořence: ve starém rameni Bělé nad soutokem s Pohorským potůčkem.

Potentilla alba L. — Boskovice: Vinohrádky, okraj lesa nad Mladkovem (cf. J. ŠMARD 1934). Od Sudie a Knínice ji udává F. ŠMARD (1961).

P. henthaphylla JUST. — Na mezích a sušších loukách kolem Kořence i jinde hojná.

P. reptans L. — Kořence: v údolí Bělé pod Hradem.

Prenanthes purpurea L. — Horní Štěpánov: v údolí Bělé u lesní cesty v trati „Drahoňov“ (cf. F. ŠMARD 1961).



Primula elatior (L.) HULL. subsp. *elatior* — Na vlhkých loukách v údolí Bělé od Horního Štěpánova po Boskovice (cf. F. ŠMARD 1961, NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

P. veris L. subsp. *veris* — Knínice: v bučině mezi Mojetínem a Příhonem. Boskovice; Vínohrádky; J. ŠMARD (1934) odtud udává subsp. *canescens* (OPITZ) HAYEK.

Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER — Knínice: na mezi u lesa pod Žlíbký.

Prunus spinosa L. — Kořence: Koudelkova skalka SZ od vsi (nejvyšší zjištěná lokalita, asi 600 m n. m.); u soutoku Bělé s Pohorským potůčkem. V nižších polohách kolem Šebetova, Knínice. Vážan a Boskovice hojná.

Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO — Místy vysazována v kulturních smrčínách (Kořence: Dubina; J svah Hradu: Vlčí skála a j.).

Pteridium aquilinum (L.) KUHN — Kořence: v řídké bučině na J svahu Hradu do údolí Bělé.

Pulmonaria officinalis L. subsp. *officinalis* (= *P. obscura* DUM.) — Kořence: údolí Bělé pod Hradem. Knínice: Žlíbký; bučina mezi Mojetínem a Příhonem. Též u Boskovic a Protivanova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Pyrola chlorantha Sw. — Kořence: ve smrčíně pod Mojetínem.

P. rotundifolia L. s. str. — Boskovice: Doubravy, v acidofilní doubravě s borovicí a bělo-
mechem na pískovci.

Quercus petraea (MATTUSCHKA) LIEBL. — Na kulmové parovině dnes jen místy vysazován do skupin v kulturních smrčínách, např. v lese Dubina u Kořence. Ojedinelé soliterní exempláře se vyskytují mezi poli asi do nadmořské výšky 650 m (např. „Za Uhlířovými“ S od Kořence).

Q. robur L. — Místy vysazován, např. nad Šebetovem na hřebeni Mojetína. Oba tyto druhy dubu byly dříve jistě hojnější — rozšířeny po větší části paroviny, jak o tom kromě četných místních jmen svědčí i nález dubového kmene ve vrchovišti u Pavlova.

Q. rubra L. — Místy vysazován, např. v údolí Bělé nad Melkovem a u cesty na hřebeni Mojetína nad Šebetovem.

Ranunculus arvensis L. — Šebetov: na poli u silnice ke Kořenci nad Kapouňaty (též KÜHN in litt.). Buková: na polích k Protivanovu (KÜHN).

R. bulbosus L. s. l. — Kořence: pastvina na Skalce (zde ve var. *brachiatius* SCHLEICH.); u skupiny keřů pod vsí vpravo od silnice k Šebetovu („Andělka“, bývalá drubežárna).

R. flammula L. subsp. *flammula* — Kořence: Pastvisko; v příkopu u cesty k Šebetovu; louky v údolí Bělé. Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem. Okrouhlá: v údolíčku Z od vsi. Suchý: rašelinné louky na březích velkého rybníka. Protivanov: u pramenů potůčku Z od vsi. Horní Štěpánov: u pramenů Úsobrnky; rašelinné louky v Podivení.

R. lanuginosus L. — Kořence: při potoku u cesty k Melkovu v údolí Kořeňáku. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) jej uvádějí od Protivanova.

R. polyanthemus L. — Kořence: Koudelkova skalka.

Rhamnus cathartica L. — Melkov: ve skupině keřů při ústí Višňáku do Bělé.

Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLL. subsp. *bucalis* (WALLER.) SCHINZ et THELL. var. *arvensis* (SEMLER) U. SCHNEIDER (= *Alectorolophus arvensis* SEMMLER) — Dostí hojně jako plevel v obilninách, např. u Protivanova (KÜHN), Kořence a j.

R. minor L. subsp. *minor* — Dostí hojně na loukách. Okrouhlá: Stádliska. Kořence: Pastvisko; louky S od vsi; louky v údolí Bělé. Suchý: louky pod horním rybníkem.

Ribes alpinum L. — Kořence: Dubina.

R. rubrum L. — Šebetov: jeden keřík u cesty od kamenolomu na Mojetín (zplanělý?).

R. uva-crispa L. subsp. *uva-crispa* — Boskovice: u Tří rybníků. Knínice: Žlíbký. Kořence: u potoka při cestě k Melkovu.

Robinia pseudacacia L. — Na kulmu jen zřídka vysazován, např. na úpatí Hradu v údolí Bělé S od Kořence (J exposice).

Roeperia canina (L.) NÉVSKÝ — Knínice: Žlíbký. Kořence: údolí Bělé pod Hradem S od vsi. Horní Štěpánov: v trati „Drahoňov“ Z od vsi.

Rorippa palustris (L.) BESS. — Pavlov: na břehu dolního rybníka.

Rosa canina L. — Hojná na mezích a okrajích lesů. SPITZNER (sec. FORMÁNEK 1887–1897) uvádí od Protivanova další 2 druhy růží z okruhu *R. canina* L. s. l., a to *R. coriifolia* FRIES a *R. vasagiana* DESP.

R. pendulina L. — Melkov: u cesty ke Kořenci pod Vlčí skálou. ŠVESTKA (1933) ji uvádí od Skláren (Skléná Hut) u Protivanova. F. ŠMARD (1961) od Horního Štěpánova.

R. tomentosa SMITH — Podle FORMÁNKA (1887–1897) ji našel SPITZNER u Protivanova.

Rumex conglomeratus MURRAY — Knínice: Žlíbký.

Rumex crispus L. — Pohora: na polích směrem na Nové Sady (KÜHN). Pavlov: u rozcestí k Bukové (KÜHN).

Sagina procumbens L. s. str. — Kořence: pastvina na Skalce; louky na S okraji obce; mokré louky v údolí Bělé a Pohorského potůčku. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Suchý: louka pod horním rybníkem. Šebetov: okraj lesa SV od vsi (KÜHN).

Salix alba L. subsp. *vitellina* (L.) ARCANGELI — Kořenec; u potoka Kořeňáku pod Skalkou.
S. × atropurpurea TAUSCH (*S. fragilis* × *triandra* DOM.) — Kořenec; kolem potoka ve vsi bývala velká skupina starých samčích stromů, dnes jsou většinou vykáčeny. (Det. J. CHMELÁŘ.)

S. aurita L. — Horní Štěpánov: na rašelinné louce ve „Žlebě“ (TOVÁREK 1966); rašelinné louky v Podivení; u pramenů Úsobrnky; mezi lesíky vlevo od cesty z Pavlova k Brodku. Pavlov: rašelinné louky u lesa pod Paprčí; vřehoviště u „Suchého lesa“; na břehu dolního rybníka. Kořenec: Pastvísko; u lesa pod Paprčí.

S. pentandra L. — Horní Štěpánov: v Podivení. Pavlov: na hrázích rybníků (TOVÁREK 1966); rašelinné louky kolem dolního rybníka. U Pavlova ji sbíral i KAVKA (in litt.).

S. purpurea L. subsp. *purpurea* — Pavlov: u potoka a na rašelinné louce pod dolním rybníkem; na hrázi dolního rybníka. Horní Štěpánov: u pramenů potůčku v Podivení.

S. rosmarinifolia L. — Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení; pod prameny Úsobrnky.
S. × tinctoria SMITH (*S. fragilis* × *pentandra* WIMM.) — Pavlov: u strouhy pod dolním rybníkem. (Det. J. CHMELÁŘ.)

Salix pratensis L. — Boskovice: Zámecký kopec u hradu. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí od Boskovic ještě od Pílského dvora, též mezi Knínicemi a Šebetovem. Na kulmu vyšších poloh neroste.

Sambucus cbulus L. — Kořenec: J úpatí Hradu; v údolí Pohorského potůčku; na svahu Mojetína k Bělé. Šebetov: v příkopu u cesty na hřebeni Mojetína.

Sanguisorba minor SCOR. subsp. *minor* — Od Sudie ji uvádí F. ŠMARD (1961). Kořenec: na vápeneovém ostrůvku u bývalé vápenky na úpatí Mojetína v údolí Bělé; do kulmového území proniká jen údolními potoky, tak např. roste ještě pod skupinou keřů v údolí Bělé pod Hradem. Chybí na celé parovině.

Sanicula europaea L. — Šebetov: u cesty za kamenolomem na Mojetíně v kulturní smřčině.

Sarothamnus scoparius (L.) WIMM. — Okrouhlá: Stádliska. Boskovice: paseky „Pod Oborou“ (přívodní ?).

Sarifruga granulata L. — Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. Kořenec: louky na S okraji obce; v údolí Kořeňáku pod Skalkou; v údolí Bělé S od vsi. Suchý: louka pod horním rybníkem.

Scorzonera humilis L. — Kořenec: louka pod Koudelkovou skalkou SZ od vsi; louka na S okraji obce; louky u silnice k Benešovu. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Pavlov: na louce vedle rašeliniště u dolního rybníka.

Scutellaria galericulata L. — Kořenec: na úpatí Hradu v údolí Bělé.

Sedum saxangulare L. — Boskovice: Vinohrádky (cf. J. ŠMARD 1934). Ve vyšších polohách jen roztroušeně na rozdí od hojného *S. acre* L. Kořenec: údolí Bělé S od vsi. Okrouhlá; u mustku při cestě k Melkovu.

S. villosum L. — Kořenec: prameniště potoka Kořeňáku na Pastvísku; rašelinná louka v údolí Pohorského potůčku. Pavlov: rašelinná louka pod dolním rybníkem (jen na této lokalitě jsem je našel v květu 5. 7. 1955). Suchý: rašelinná louka pod horním rybníkem.

Senecio nemorensis L. subsp. *fuchsii* (Gmel.) ČELAK. — Protivanov: v bučině na Skalách u chaty „Hanačka“. Kořenec: Dubina; v údolí Kořeňáku při cestě k Melkovu. Knínice: Žlíbky. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ho uvádějí ještě od Zdárné a ze Šmeleovny u Boskovic, též od Protivanova.

S. rivularis (W. et K.) DC. — Kořenec: rašelinné louky v údolí Bělé a Pohorského potůčku. Pavlov: svahové rašeliniště pod silnicí k Bukové; kolem dolního rybníka; u Pavlova ho sbíral i KAVKA (in litt.). Protivanov: pod Sklenou Hutí; u potůčku Z od vsi. KAVKA (1961) ho uvádí z mokré louky u Bukové.

S. sylvaticus L. — Pavlov: v kulturní smřčině pod dolním rybníkem.

S. viscosus L. — Kořenec: lesní světliny v Dubině; Vlčí skála.

Serratula tinctoria L. s. str. — Kořenec: jen na dvou místech na lukách S od vsi. FORMÁNEK (1887—1897) zaznamenává též SPEJZNERŮV údaj od Protivanova.

Setaria glauca (L.) P. BEAUV. — Okrouhlá: na poli u silnice do Vratkova. Pavlov: pole u rašelinných luk (KÜHN). Buková: pole k Protivanovu (KÜHN).

S. viridis (L.) P. BEAUV. — Jen v teplejších polohách. Knínice: okraj lesa pod Žlíbky.

Sherardia arvensis L. — Kořenec: pole S od vsi. Protivanov: pole Z od vsi (KÜHN). Pohora: na polích (KÜHN). Šebetov: na polích (KÜHN).

Sieglelingia decumbens (L.) BERNH. — Kořenec: pastvina na Skalec; louky S od vsi; na okraji lesa pod Paprčí; Pastvísko. Pavlov: rašelinné louky u lesa pod Paprčí. Horní Štěpánov: vřehoviště mezi rašelinnými loukami v Podivení.

Silene nutans L. — NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí ze Šmeleovny u Boskovic a od Šebetova.

Sinapis arvensis L. — Jako plevel na polích v nižších polohách kolem Šebetova (též KÜHN in litt.). Knínice: Vážan. Sudie, Boskovice apod. Na chudobných půdách vyšších poloh neroste.

Sisymbrium officinale (L.) Scop. — Na kulmu vyšších poloh zřídka. Kořence: v uličce mezi domy proti škole 7. 9. 1956, u školy 15. 8. 1970.

Solanum dulcamara L. — Melkov: údolí Bělé.

S. nigrum L. subsp. *nigrum* — Boskovice: pole u cihelny a j. Ve vyšších polohách zřídka, KÜHN (in litt.) ho našel na poli u Kořence směrem k Benešovu.

Solidago virgaurea L. subsp. *virgaurea* — Kořence: na mezi pod větrným mlýnem. Boskovice: Vinohrádky (cf. J. ŠMARD 1934).

Sonchus asper (L.) HILL — Na polích u Šebetova (KÜHN).

Sparganium erectum L. subsp. *neglectum* (BEEBY) SCHINZ et THELL. — Okrouhlá: v potůčku nad Melkovem. Kořence: v Pohorském potůčku nad soutokem s Bělou.

Spergula arvensis L. — Kořence: pole J od vsi. Šebetov: okraj lesa SV od obce (KÜHN).

Spergularia rubra (L.) J. et C. PRESL — Kořence: na poli u cesty do Horního Štěpánova.

Stachys annua L. — Boskovice: úhory na Vinohrádcích. Na kulmu vyšších poloh neroste.

S. palustris L. — Horní Štěpánov: na rašelinných loukách v Podivení. Hojně jako plevel na polích kolem Kořence, Benešova, Pohory (KÜHN), Protivanova (KÜHN) a j. Na okraji lesa SV od Šebetova (KÜHN).

S. sylvatica L. — Kořence: paseka na svahu Mojetína k Bělé. Horní Štěpánov: údolí Bělé v „Drahoňově“. Knínice: Žlíbky. Těž u Boskovic a Šebetova (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

Stellaria alsine GRIMM — Kořence: v příkopu na louce S od vsi.

S. graminea L. — Pohora: na polích na terénním hřbetu (KÜHN). Buková: pole na hřbetu k Protivanovu (KÜHN). Kořence: Skalka; louky SZ od vsi; na poli S od vsi.

S. holostea L. — Kořence: Dubina; J úpatí Hradu. Od Sudie, Kořence a Horního Štěpánova ji udává F. ŠMARD (1961), od Boskovic NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969).

S. nemorum L. subsp. *nemorum* — Kořence: údolí Bělé pod Mojetínem. Pohora: v lese u Barborky. NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) ji uvádějí od Protivanova.

S. palustris RETZ. — Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem. Kořence: Pastvisko; údolí Pohorského potůčku. Protivanov: u pramenů potůčku Z od vsi. Suchý: břeh velkého rybníka. Horní Štěpánov: na rašelinných loukách v Podivení.

Succisa pratensis MOENCH — Kořence: louky S od vsi; v údolí Bělé. Pavlov: rašelinné louky pod dolním rybníkem a u lesa pod Papřicí. Okrouhlá: louky na Stádliskách. Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení; u pramenů Úsobrnky.

Swida sanguinea (L.) OPIZ — Kořence: v kamenicích mezi poli; v křovinách u Bělé pod Hradem. Knínice: Žlíbky.

Tanacetum vulgare L. — Kořence: u lesa „Pod Uhlířovým“ S od vsi. Protivanov: mez u silnice k Bukové.

Taraxacum paludosum (SCOP.) SCHDL. — KAVKA (in litt.) je našel u Pavlova.

Thalictrum aquilegifolium L. — Melkov: v údolí Bělé.

Thesium linophyllum L. — F. ŠMARD (1961) je uvádí z luk v údolí Bělé pod Horním Štěpánovem.

Torilis japonica (HOULT.) DC. — Šebetov: Mojetín. Kořence: J úpatí Hradu.

Tragopogon orientalis L. — Kořence: údolí Bělé nad Melkovem; louky kolem vesnice.

Trifolium alpestre L. — Vážany: okraj lesa na úpatí Vejštice. F. ŠMARD (1961) je uvádí od Sudie a Knínice.

T. arvense L. — Kořence: úhor u lesa Kostnice na svahu do údolí Bělé. Boskovice: úhory na Vinohrádcích.

T. aureum POLLICH — Kořence: mez u silnice k Šebetovu.

T. campestre SCHREBER — Kořence: úhor na Fabinově vrši. Šebetov: okraj lesa SV od obce (KÜHN). Boskovice: Vinohrádky.

T. dubium SIBTH. — Okrouhlá: louky na Stádliskách. Kořence: pastvina na Skalec; louky S od vsi; louky v údolí Bělé; loučka u staré cesty k Benešovu.

T. hybridum L. subsp. *hybridum* — Na vlhkých loukách roztroušeně, např. u Kořence, Pavlova, Okrouhlé a j.

T. medium L. s. str. — Kořence: v údolí Bělé pod Hradem. Těž u Žďárné (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969).

T. montanum L. — Okrouhlá: suché louky na Stádliskách. Kořence: Koudelkova skalka SZ od vsi; louky S od vsi; v údolí Bělé. Od Kořence je udává též F. ŠMARD (1961).

T. spadicum L. — Kořence: Pastvisko. Benešov: rašelinná louka vlevo od silnice k Suchému. Suchý: u velkého rybníka. Pavlov: rašelinné louky kolem dolního rybníka.

Triglochin palustris L. — Kořence: rašelinné louky v údolí Pohorského potůčku.

Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ-BIP. — Ve vyšších polohách zřídka, KÜHN (in litt.) je našel na poli Z od Protivanova.

Trisetum flavescens (L.) P. BEAUV. s. str. — Okrouhlá: louky na Stádliskách; u můstku při cestě k Melkovu; v údolíčku Z od vsi. Kořence: louky S od vsi a v údolí Bělé. Suchý: pod horním rybníkem.

Trollius europaeus L. subsp. *europaeus* — Na vlhkých až rašelinných loukách u Kořence, Pavlova, Benešova a Suchého roztroušeně.

Turritis glabra L. — Kořence: spontánně na zahradě domu čp. 75, kde ji pozorují již řadu let v několika exemplářích. Nejbližší ji udává F. ŠMARDA (1961) od Sudic.

Typha latifolia L. — Kořence: v tůních na Pastvisku.

Typhoides arundinacea (L.) MOENCH — Buková: u potůčku Z od vsi a na louce u jeho pramene. Protivanov: u potůčku Z od vsi. Kořence: břeh Pohorského potůčku.

Ulmus carpinifolia GLED. — Knínice: Žlábky, v úzlabinách na svazích Mojetína a Příhonu k Malé Haně.

U. glabra HUDSON — Roztroušeně v lesích na kulmu Drahanské vrchoviny, též v křovinách a kamenicích mezi poli a ve vsích.

Vaccinium vitis-idaea L. — Jen na vrchovišti u Pavlova a na louce poblíž vrchoviště u „Suchého lesa“ (leg. M. SKYBOVÁ).

Valeriana dioica L. — Na rašelinných loukách dosti hojná; Kořence, Pavlov, Horní Štěpánov, Buková, Protivanov, Suchý, Okrouhlá.

V. sambucifolia MIKAN fil. — Kořence: na pasece a v lese na svahu Mojetína k Bělé.

Valerianella locusta (L.) BETCKE — Pohora: na polích (KÜHN).

Verbascum nigrum L. — Kořence: mez pod větrným mlýnem.

V. thapsus L. — Kořence: úpatí Hradu v údolí Bělé.

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. *anagallis-aquatica* — Kořence: mokřina za humny u Uhlířovy studánky.

V. arvensis L. — Pohora: na polích (KÜHN). Kořence: na polích směrem k Benešovu (KÜHN); loučka pod Koudelkovou skalkou.

V. beccabunga L. — Kořence: v potoce na Pastvisku.

V. dillenii CRANTZ — Kořence: mez u cesty k polím na Bělé.

V. hederifolia L. s. l. — Kořence: mez u cesty k polím na Bělé.

V. montana JUSL. — Kořence: vlhká paseka na svahu Mojetína k Bělé.

V. scutellata L. — Kořence: Pastvisko. Suchý: na břehu velkého rybníka.

V. serpyllifolia L. s. str. — Kořence: louka na S okraji obce; louka v údolí Bělé S od vsi u bývalé hájenky; vlhká paseka na svahu Mojetína k Bělé; louka u lesa při cestě do Horního Štěpánova. Pohora: na polích (KÜHN).

Viburnum opulus L. — Kořence: u lesa J od vsi; údolí Bělé pod Hradem.

Vicia dumetorum L. — Kořence: okraj lesa na J úpatí Hradu.

V. grandiflora SCOP. — Kořence: zplanělá na okraji pole u Dubiny.

V. hirsuta (L.) S. F. GRAY — Kořence: mez u silnice k Šebetovu; jako plevel na zahradě domu čp. 75; Šebetov: na polích (KÜHN).

V. sativa L. subsp. *nigra* (L.) EHRH. — Kořence: mez u silnice k Šebetovu. Šebetov: na okraji lesa SV od obce (KÜHN); jako plevel na polích (KÜHN). Na polích u Protivanova (KÜHN).

V. sepium L. — Kořence: paseka na svahu Mojetína k Bělé. Šebetov: v lese na Mojetíně.

V. sylvatica L. — Kořence: paseka na svahu Mojetína k Bělé. Šebetov: u kamenolomu nad Kapouňaty na Mojetíně. Knínice: mezi Mojetínem a Příhonem.

V. tenuifolia ROTH — Podle FORMÁNKA (1887–1897) ji nalezl SPITZNER u Protivanova. Sám jsem ji zde nesbíral.

V. tetrasperma (L.) SCHREBER — Kořence: paseka na svahu Mojetína k Bělé. Melkov: údolí Višňáku pod Vlčí skálou.

V. villosa ROTH subsp. *villosa* — Kořence: u plotů za humny, pravděpodobně zplanělá (často se pěstuje ve směskách).

Vincetoxicum hirundinaria MEDIC. — Boskovice: Zámecký kopec. F. ŠMARDA (1961) ji udává od Sudic a Knínice.

Viola canina L. subsp. *canina* — Kořence: u cesty za Skalkou.

V. c. subsp. montana (L.) HARTMAN — Kořence: v kamenici za humny.

V. palustris L. — Dostí hojná na rašelinných loukách u Kořence, Pavlova, Benešova, Horního Štěpánova, Suchého, Protivanova a Bukové. Od pramenů Úsobrnky u Horního Štěpánova ji udává též KAVKA (1961).

V. reichenbachiana JORDAN ex BOREAU — Kořence: Dubina; louky v údolí Bělé. Šebetov: Mojetín. F. ŠMARDA (1961) ji udává od Horního Štěpánova, NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1969) od Pílského dvora u Boskovic, dále od Žďárné a Protivanova.

V. riviniana REICHENB. — Kořence: Pastvisko; Skalka: v kamenici za humny; meze a louky S od vsi.

Viscaria vulgaris BERNH. — Kořence; meze S od vsi, též ve f. *albiflora* (SWEET) ROUY et FOUC. Okrouhlá; louky na Stádliskách. Boskovice: Šmelcovna (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1969); Vínohrádky.

Viscum album L. subsp. *abietis* (WIESB.) ABROMETT — Pohora; u myslivny na Karlově. Kořence; na svahu Mojetína k Bělé. Boskovice: „Pod Oborou“. Vesměs na jedlích.

V kulminační části Dražanské vrchoviny na kulmových horninách zhruba nad vrstevnicí 500 m dále běžně rostou tyto druhy:

Achillea millefolium s. str., *Aegopodium podagraria*, *Aethusa cynapium* s. str., *Agrostemma githago*, *Agrostis stolonifera* s. str., *A. tenuis* s. str., *Ajuga reptans*, *Alopecurus pratensis*, *Anagallis arvensis* f. *arvensis*, *Anthemis arvensis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Anthyllis vulneraria* s. l., *Arrhenatherum elatius*, *Bellis perennis*, *Betula pendula*, *Briza media*, *Calamagrostis epigeios*, *Caltha palustris* s. l., *Campanula patula*, *C. rapunculoides*, *C. rotundifolia* s. str., *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine pratensis*, *Centaurea cyanus*, *C. jacea* s. str., *Cerastium arvense*, *C. vulgatum*, *Chamaenerion angustifolium*, *Chelidonium majus*, *Chenopodium album*, *Cirsium arvense*, *C. palustre*, *C. vulgare* s. str., *Convolvulus arvensis*, *Corylus avellana*, *Cynosurus cristatus*, *Deschampsia caespitosa*, *D. flexuosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Echium vulgare*, *Equisetum arvense*, *Erigeron canadense*, *Erodium cicutarium*, *Erysimum cheiranthoides*, *Euphorbia esula*, *E. helioscopia*, *Euphrasia rostkoviana* s. str., *Festuca ovina* s. str., *F. rubra* s. str., *Fragaria vesca*, *Fumaria officinalis* s. str., *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea* s. str., *Heracleum sphondylium* s. l., *Hieracium silvaticum*, *Holcus lanatus*, *Hypericum perforatum* s. l., *Hypochoeris radicata*, *Juncus articulatus* s. str., *J. bufonius*, *Knautia arvensis* s. str., *Lamium album*, *L. purpureum*, *Lathyrus pratensis*, *Lemna minor*, *Leontodon autumnalis* s. str., *L. hispidus* subsp. *hispidus* i subsp. *hastilis*, *Leucanthemum vulgare* s. l., *Linaria vulgaris*, *Linum catharticum*, *Lolium perenne*, *Lotus corniculatus*, *Lucula albida*, *L. campestris*, *Lychnis flos-cuculi*, *Lycopodium clavatum*, *Malva neglecta*, *Matricaria matricarioides*, *Medicago lupulina* s. str., *Melandrium album*, *Mentha arvensis* s. l., *Myosotis arvensis* s. str., *Nardus stricta*, *Oralis acetosella*, *Phleum pratense* s. str., *Pimpinella saxifraga* s. str., *Plantago lanceolata* s. str., *P. major* s. str., *P. media*, *Poa nemoralis*, *P. pratensis* s. str., *Polygala vulgaris* s. str., *Polygonum aviculare* s. l., *P. lapathifolium* s. str., *Populus tremula*, *Potentilla anserina*, *P. argentea*, *P. erecta*, *Prunella vulgaris*, *Ranunculus acris* s. str., *R. auricomus* s. l., *R. repens*, *Raphanus raphanistrum*, *Rubus caesius*, *R. fruticosus* spec. aggr., *R. idaeus*, *Rumex acetosa*, *R. acetosella* s. str., *R. obtusifolius*, *Salix caprea*, *Sambucus nigra*, *S. racemosa*, *Sanguisorba officinalis*, *Scirpus sylvaticus*, *Scleranthus annuus* s. str., *Scrophularia nodosa*, *Sedum acre*, *S. maximum*, *Senecio vulgaris*, *Silene vulgaris* s. str., *Sonchus arvensis* s. str., *S. oleraceus*, *Sorbus aucuparia* s. str., *Stellaria media*, *Symphitum officinale* s. str., *Taraxacum officinale*, *Thlaspi arvense*, *Thymus pulegioides*, *Trifolium pratense* s. str., *T. repens* s. str., *Tussilago farfara*, *Urtica dioica*, *U. urens*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys*, *V. officinalis*, *V. persica*, *Vicia cracca*, *Viola arvensis*, *V. tricolor* s. str.

Souhrn

Ve svém příspěvku podávám úplný výčet rostlinných druhů, které jsem zjistil ve vymezeném území. Seznam obsahuje 513 taxonů s uvedenými lokalitami, z toho jeden (*Odontites rubra* subsp. *rothmaleri* U. SCHNEIDER) nový pro ČSSR. Naproti tomu údaj o výskytu *Crocus heuffelianus* se ukázal jako mylný a tento druh je třeba z květeny Dražanské vrchoviny vyškrtnout. Výskyt několika dalších druhů, uváděných z území jinými autory, se mi nepodařilo potvrdit. Výčet druhů uzavírá abecední seznam dalších 142 obecně rozšířených druhů bez udání lokalit.

Zusammenfassung

In unserem Beitrag geben wir eine vollständige Aufzählung der Pflanzensippen, die wir im untersuchten Gebiete festgestellt haben. Die Liste umfasst 513 Sippen mit angeführten Fundorten, eine davon (*Odontites rubra* subsp. *rothmaleri* U. SCHNEIDER) neu für die Tschechoslowakei. Dagegen wurde die Angabe über das Vorkommen von *Crocus heuffelianus* als falsch erwiesen und es ist nötig, dieses Taxon aus der Flora des Dražaner Plateaus zu streichen. Das Vorkommen einiger weiterer, von anderen Autoren aus dem Gebiet angegebener Pflanzensippen zu bestätigen, ist mir nicht gelungen. Die Aufzählung der Pflanzensippen wird durch ein alphabetisches Verzeichnis von weiteren 142 gemein verbreiteten Taxa ohne Lokalitätsangaben abgeschlossen.

Literatura

- FORMÁNEK E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1., 2. — Brno.
- HENDRYCH R. (1969): Verbreitungskarten einiger Samenpflanzen in der Tschechoslowakei II. — Acta Univ. Carolinae, Biol., Praha, 1969 : 171–178.
- KAVKA V. (1961): Příspěvek ke květeně okolí Prostějova. — Sborn. Vlastivěd. Muzea Prostějov, Odd. Přírodověd., 1961 : 85–91.
- KÜHN F. (1968): Vegetace okolí Moravské Třebové. — Vlastivěd. Listy, Muzeum Moravská Třebová, 1968/2 : 11–12.
- MÜLLER J. (1948): Nové rostliny pro povodí Svitavy. — Čs. Bot. Listy, Praha, 1 : 70–71.
- NEUHÄUSL R. et Z. NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ (1968–1969): Floristický materiál ke květeně Moravy I., II., III. — Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 3 : 147–160, 1968; 4 : 29–47 et 86–105, 1969.
- PODPĚRA J. (1914): Doplňky ku květeně moravské, Pars 1. — Čas. Mor. Muzea Zem., Brno, 14 : 414–428.
- ROTHMALER W. et al. (1963): Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband. Gefäßpflanzen. — Berlin.
- ŘEHOŘEK V. (1958): Rašelinné louky a vrchoviště pramenné oblasti říčky Bělé na Drahanské vysočině. — Ochr. Přír., Praha, 13 : 11–17.
- (1971): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny I. — Preslia, Praha, 43 : 261–270.
- SCHNEIDER U. (1963a): Melampyrum L. — In: ROTHMALER W. et al.: Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband. Gefäßpflanzen, p. 281–286. — Berlin.
- (1963b): Odontites Zinn. — In: ROTHMALER W. et al.: Exkursionsflora von Deutschland. Kritischer Ergänzungsband. Gefäßpflanzen, p. 292–293. — Berlin.
- SLAVÍK B. (1967): Poznámky k určování, sběru a rozšíření slézů (rod Malva) na území ČSSR. — Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 2 : 43–50.
- SPITZNER V. (1883): Květena okolí města Prostějova. — In: Program Čes. Vyšší Zemské Reálky Prostějov 1883. — Prostějov.
- (1885): Příspěvek ku květeně okolí města Prostějova. — In: Pátá (12.) Výr. Zpr. Slovansk. Zemské Vyšší Real. Školy Prostějov 1884–85. — Prostějov.
- (1886): Ostružiníky na Prostějovsku a Plumlovsku. — Čas. Vlasten. Muzea Olomouc 3 : 37 až 38.
- (1887a): Květena okresu prostějovského a plumlovského. — Prostějov. [114 p.]
- (1887b): Pflanzen des Drahaner Plateaus. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 37 : 407–408.
- (1888): Rubi des Drahaner Plateaus. — Österr. Bot. Zeitschr., Wien, 38 : 144–145.
- (1893): Ostružiny vysočiny Drahanské. — Prostějov. [29 p.]
- ŠMARD A. F. (1961): Příspěvek ke květeně horního povodí toku Svitavy a Třebůvky. — Preslia, Praha, 33 : 59–64.
- ŠMARD A. J. (1934): Květena Vinohrádku u Boskovic na Moravě. — Příroda, Brno, 27 : 40–41.
- (1936): Geobotanická studie z povodí Svatky a Svitavy. — Sborn. Klubu Přírodověd. Brno 18 (1935) : 3–18.
- (1951): Květena Boskovička. — In: Vlastivěd. Listy z Boskovička. — Boskovice. [4 p.]
- (1963): Údolí Luhy v Drahanské vysočině na Moravě. — Ochr. Přír., Praha, 18 : 20–21.
- ŠVESTKA F. (1933): O vertikálním rozšíření růže převislé (Rosa pendulina L.) v pozorovaných krajích Moravy a Slovenska. — Příroda, Brno, 26 : 163–165.
- TOVÁREK Z. (1966): Vrchoviště u Horního Štěpánova. — Malá Haná, Velké Opatovice, 2/3 : 9–13. [Rotaprint.]
- TUTIN T. G., V. H. HEYWOOD et al. [ed.] (1964 et 1968): Flora Europaea. Vol. 1 et Vol. 2. — London.

Došlo 5. února 1971
Recenzenti: J. Holub, M. Šmejkal